



Más ganas de beber en diarrea de terneros.

**científicamente
probado**

¿Por qué beben menos los terneros durante la diarrea?

Debido a que sufren de acidosis.

¿Qué es la acidosis?

Durante la diarrea los terneros no sólo pierden líquidos sino también búferes (sustancias tampón). Esto hace que los terneros se deshidraten y se sobre-acidifiquen.

¿Es tan peligrosa la acidosis?

La acidosis se presenta rápidamente en unas horas. Los terneros beben cada vez menos, van perdiendo líquidos y búferes, cada vez están más débiles, finalmente mueren.

¿Qué se puede hacer?

Dar un **Bi-PILL** inmediatamente al primer síntoma de diarrea. 1 píldora inmediatamente y 1 píldora después de cada una de las tres comidas siguientes. Tener siempre disponible **Bi-PILL**.

¿Qué se consigue con la **Bi-PILL**?

Amortiguar la acidosis en sangre y en rumen. Los terneros empiezan a beber otra vez.

¿De qué consiste la **Bi-PILL**?

Bicarbonato sódico: un búfer muy eficaz.


¿Qué es la **Bi-PILL** legalmente?

Pienso complementario mineral. Asegurado conforme a GMP+ FSA. Apto para granjas ecológicas.

¿Cuánto cuesta la diarrea en terneros?

Un caso de diarrea suave unos 108 €, un caso de diarrea grave unos 263 €: todo debido a los costos de tratamientos, más trabajo, más días de cría y muerte de terneros.

Para disminuir estos costos, dar **Bi-PILL**!



Bi-PILL. Científicamente probado.

Geishauser & Maag 2014: Züchtungskunde 86, 130–136.

Bi-PILL. La primera píldora de bicarbonato.