



La première pilule de calcium.

testé
scientifiquement

À quoi sert **Ca-PILL®**?

À l'approvisionnement en calcium immédiatement après le vêlage. Plus de calcium – moins de parésie de parturition (« fièvre de lait »).

Qu'y a-t-il de nouveau?

Ca-PILL® est la première pilule de calcium. Pas de chlorure de calcium – pas d'ulcère gastrique.

Qu'est-ce qui la rend plus naturelle?

Ca-PILL® est constituée d'acétate de calcium. L'acide acétique est un acide naturellement contenu dans la panse.

Quelle efficacité affiche **Ca-PILL®**?

Les études scientifiques ont montré que **Ca-PILL®** accroissait le taux de calcium dans le sang de 1 à 24 heures après l'administration.

À quelles vaches la donner?

À toutes les vaches dès le second vêlage. Le risque de parésie de parturition s'accroît avec l'âge.

Quand l'apporter?

2 pilules le jour du vêlage. Ensuite 2 pilules le jour suivant.

Quel est le statut juridique de **Ca-PILL®**?


Aliment complémentaire minéral.
Garanti GMP+ FSA.

La parésie de parturition comporte-t-elle des risques?

Il y a un risque accru de lésions musculaires dues à la position couchée prolongée, de blessures lors des tentatives de se lever et de réformes prématurées.

Quel est le coût d'une parésie de parturition?

Environ 350 € par cas. Les coûts découlent des traitements, du travail supplémentaire, de la perte de production laitière, de la baisse de fertilité, du risque accru de faiblesse de contractions, de rétention placentaire, de blessures aux trayons, de mammites, de cétose et de déplacement de la caillette.



Ca-PILL® accroît la teneur en calcium dans le sang.

Ca-PILL®. Testé scientifiquement.

Geishauer et al. 2008: Tierärztl. Prax. 36 G, 250-252.

Ca-PILL®. Plus naturel.