

NL - Handleiding Insectosec S 15 kg	2
BE - Handleiding Insectosec S 15 kg	3
DE - Handleiding Insectosec S 15 kg	4

Handleiding Insectosec S 15 kg NL

Lees voor gebruik altijd het etiket.

Werkingswijze: InsectoSec® S heeft een sterk uitdrogend effect op kruipend ongedierte. De insectenplagen en het ongedierte poedert zichzelf in door hun eigen bewegingen, door het contact hecht het silicaat zich op de schaal van het insect. Het krachtige absorptievermogen van silicaatstof leidt tot het drogen van insecten die dan snel afsterven. Volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis is resistentie tegen InsectoSec® S niet mogelijk.

Doelorganisme: Bloedluis (rode vogelmijt) (*Dermanyssus gallinae*) Adulten und Nimfen.

Toepassingsgebied: Het product wordt binnen gebruikt in pluimveeverblijven. Bespuiten van oppervlakken, scheuren en spleten en looproutes en schuilplaatsen van de insecten.

Toepassingsmethode: Spuiten:

Poeder moet worden gemengd met water om een oplossing van 16 % m/m te verkrijgen. De oplossing kan worden aangebracht met een sproeier van het rugzaktype. Het product moet vóór gebruik goed worden geschud, en ook tussen spuitbeurten door. Hanteer een spuitafstand van ongeveer 30-50 cm voor een gelijkmatige spuitlaag. De in eerste instantie natte laag droogt op en laat een gelijkmatig wit poederoppervlak achter. Met de vloeibare oplossing wordt voorkomen dat het poeder tijdens het aanbrengen omhoog komt en wordt de hechting verbeterd.

Toe te passen dosis: 50 g/m² - 250 ml verdund product/m². Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje. Verdunning (%): gebruikconcentratie: oplossing met 16% m/m, overeenkomend met 60 kg kiezelgoer in 300 l water. Frequentie: interval minimaal 7 dagen.

Het product kan preventief en curatief worden gebruikt tegen bloedluis:

1. Preventief: Aanbrengen in een schone en droge pluimveestall voordat de dieren arriveren. Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje
2. Curatief: Aanbrenging in een pluimveestall waar een plaag heerst: met de dieren buiten. Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje.

Met de vloeibare oplossing wordt voorkomen dat het poeder tijdens het aanbrengen omhoog komt en wordt de hechting verbeterd. Bespuit alle oppervlakken van het pluimveeverblijf, vooral langs looproutes van mijten en in kieren, spleten en holle ruimtes waar mijten kunnen zitten. Hanteer een spuitafstand van ongeveer 30-50 cm voor een gelijkmatige spuitlaag. Bedek de gehele installatie met een wit laagje vloeistof. De in eerste instantie natte laag droogt op en laat een gelijkmatig wit poederoppervlak achter. Het product wordt pas werkzaam wanneer het is opgedroogd. Niet aanbrengen met een lanssproeier.

Niet rechtstreeks aanbrengen op dieren; het is alleen bedoeld voor behandeling van de omgeving. Indien nodig, opnieuw aanbrengen na 7 dagen. Aanbrenging op natte ondergronden zal de werkzaamheid vertragen.

Voor gebruik in pluimveeverblijven:

Uitsluitend in lege dierverblijven gebruiken. Voer verwijderen vóór de behandeling. Voerplaats afdekken met plastic folie. Alle wateropslagtanks afdekken vóór de behandeling. Niet direct op ligstro spuiten.

Handleiding Insectosec S 15 kg BE

Lees voor gebruik altijd het etiket.

Werkingswijze: InsectoSec® S heeft een sterk uitdrogend effect op kruipend ongedierte. De insectenplagen en het ongedierte poedert zichzelf in door hun eigen bewegingen, door het contact hecht het silicaat zich op de schaal van het insect. Het krachtige absorptievermogen van silicaatstof leidt tot het drogen van insecten die dan snel afsterven. Volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis is resistentie tegen InsectoSec® S niet mogelijk.

Doelorganisme: Bloedluis (rode vogelmijt) (*Dermanyssus gallinae*) Adulten en Nimfen.

Toepassingsgebied: Het product wordt binnen gebruikt in pluimveeverblijven. Bespuiten van oppervlakken, scheuren en spleten en looproutes en schuilplaatsen van de insecten.

Toepassingsmethode: Spuiten: Poeder moet worden gemengd met water om een oplossing van 16 % m/m te verkrijgen. De oplossing kan worden aangebracht met een sproeier van het rugzaktype. Het product moet vóór gebruik goed worden geschud, en ook tussen spuitbeurten door. Hanteer een spuitafstand van ongeveer 30-50 cm voor een gelijkmatige spuitlaag. De in eerste instantie natte laag droogt op en laat een gelijkmatig wit poederoppervlak achter. Met de vloeibare oplossing wordt voorkomen dat het poeder tijdens het aanbrengen omhoog komt en wordt de hechting verbeterd.

Toe te passen dosis: 50 g/m² - 250 ml verdund product/m². Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje. Verdunning (%): gebruikconcentratie: oplossing met 16 % m/m, overeenkomend met 60 kg kiezelgoer in 300 l water. Frequentie: interval minimaal 7 dagen.

Het product kan preventief en curatief worden gebruikt tegen bloedluis:

1. Preventief: Aanbrengen in een schone en droge pluimveestal voordat de dieren arriveren. Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje.
2. Curatief: Aanbrenging in een pluimveestal waar een plaag heerst: met de dieren buiten. Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje.

Bespuit alle oppervlakken van het pluimveeverblijf, vooral langs looproutes van mijten en in kieren, spleten en holle ruimtes waar mijten kunnen zitten. Hanteer een spuitafstand van ongeveer 30-50 cm voor een gelijkmatige spuitlaag. Bedek de gehele installatie met een wit laagje vloeistof. De in eerste instantie natte laag droogt op en laat een gelijkmatig wit poederoppervlak achter. Het product wordt pas werkzaam wanneer het is opgedroogd. Niet aanbrengen met een lanssproeier.

Niet rechtstreeks aanbrengen op dieren; het is alleen bedoeld voor behandeling van de omgeving. Indien nodig, opnieuw aanbrengen na 7 dagen. Aanbrenging op natte ondergronden zal de werkzaamheid vertragen.

Voor gebruik in pluimveeverblijven: Uitsluitend in lege dierverblijven gebruiken. Voer verwijderen vóór de behandeling. Voerplaats afdekken met plastic folie. Alle wateropslagtanks afdekken vóór de behandeling. Niet direct op ligstro spuiten.

Anweisungen Insectosec S 15 kg DE

Lesen Sie vor Gebrauch immer das Etikett

Wirkungsweise: Der Wirkstoff führt zum Herauslösen von Kutikula fetten und zur Dehydrierung der Insekten. Schädlinge, wie zum Beispiel die rote Vogelmilbe stäuben sich als Folge ihrer Eigenaktivität selbst ein, wenn sie sich in den behandelten Flächen bewegen.

Zielorganismen: Rote Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*) Adulte und Nymphen

Das Produkt wird in Innenräumen von Geflügelställen verwendet. Besprühen von Oberflächen, Ritzen und Fugen, Laufwege und Versteckplätze von Insekten.

Aufwandmenge: 50 g/m² - 250 mL/m². Ausreichend Produkt aufsprühen, sodass sämtliche Oberflächen mit einem weißen Film bedeckt sind. Anwendungskonzentration: Lösung mit 16 % (w/w), entspricht 60 kg Kieselguhr in 300 L Wasser.

Anwendung: Das Pulver sollte mit Wasser gemischt werden, um eine 16 %ige Lösung (w/w) zu erhalten. Die Lösung kann mit einem Rückensprünger ausgebracht werden. Das Produkt sollte vor und zwischen den Anwendungen gut geschüttelt werden. Sprühabstand ca. 30-50 cm, um eine gleichmäßige Sprühschicht zu erzeugen. Der anfänglich nasse Film trocknet und hinterlässt eine gleichmäßige weiße Stauboberfläche.

Hinweise:

Das Produkt kann präventiv und kurativ gegen rote Hühnermilben eingesetzt werden.

1. Vorbeugend: Anwendung im sauberen und trockenen Geflügelstall vor dem Einstellen der Tiere.

2. Bekämpfend: Anwendung in Geflügelställen mit Befall – wobei sich die Tiere außerhalb des Geflügelstalls befinden.

Ausreichend Produkt auf die gesamte Anlage aufsprühen, sodass sämtliche Oberflächen nach Trocknung mit einem weißen Film bedeckt sind.

Mit der flüssigen Lösung wird eine Staubaufwirbelung während der Anwendung vermieden und die Haftung verbessert. Behandelt werden alle Oberflächen, insbesondere entlang der Laufwege der Milben, Ritzen, Fugen und Hohlräume der Geflügelställe, in denen sich Milben aufhalten können. Sprühabstand ca. 30-50 cm, um eine gleichmäßige Sprühschicht zu erzeugen.

Der anfänglich nasse Film trocknet und hinterlässt eine gleichmäßige weiße Stauboberfläche. Die Wirksamkeit des Produktes ist erst dann gegeben, wenn das Produkt trocken ist.

Nicht in Form von Flächensprühen mit einer Sprühlanze auftragen. Nicht zur direkten Behandlung an Tieren. Das Produkt ist nur für die Behandlung der Umgebung bestimmt. Falls erforderlich, nach 7 Tagen erneut auftragen. Die Anwendung auf nassen Oberflächen verzögert die Wirksamkeit.

Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen:

Nur zum Gebrauch in Bereichen, die für Säuglinge, Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere unzugänglich sind, oder unzugänglich für Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere ausbringen. Nicht in Gegenwart anderer Personen, insbesondere von Kindern oder Haustieren, anwenden. Die Entfernung des Produkts und der Abfälle sollte durch Nassreinigung erfolgen.

Bei Anwendung in Geflügelställen:

- Nur in leeren Ställen anwenden
- Futtermittel vor Anwendung entfernen
- Fütterungsbereiche mit Plastikfolie abdecken
- Alle Wasserspeichertanks vor der Anwendung abdecken
- Nicht direkt auf Schlafplätze sprühen