

# Protecta



**DIATOMIX**  
**TERRE DE DIATOMÉE**  
 Contre les poux rouges et  
 les insectes rampants  
**DIATOMEËËNAARDE**  
 Tegen bloedluizen en  
 kruipende insecten



**EFFICACITÉ LONGUE DURÉE**  
**DOELTREFFENDE & LANGE WERKING**

## 2 Kg



**Biocide prêt à l'emploi à propriété insecticide et acaricide à utiliser dans les élevages de volailles et autres bâtiments d'élevage, en milieu domestique ainsi que dans le secteur de l'industrie de transformation tel que boulangeries ou moulins de broyage. Autorisé pour lutter le pou rouge de l'oiseau (*Dermanyssus gallinae*), la puce du chat (*Ctenocephalides felis*) et insectes rampants comme les fourmis (*Lasius niger*), les cafards, les puces et les cloportes.**

#### DOSES ET MODE D'EMPLOI

**Contre les fourmis, les blattes, les puces, les cloportes :** A l'aide du flacon à poudrer, appliquer 30 à 50g par m<sup>2</sup> dans les zones fréquentées par les insectes : bords des fenêtres, bas de portes, derrière les placards, fissures, sous éviers, baignoires, plinthes et tout l'environnement des animaux domestiques (litière, corbeille, cage...). Renouveler l'application après dispersion de la poudre ou si elle a pris l'humidité.

**Cages et poulailler :** Contre les poux rouges. Elevage en cages (30g par m<sup>2</sup>) ou en volières (50g par m<sup>2</sup>). 2 à 3 applications nécessaires et espacées de 8 jours. Appliquer la poudre sur les perchoirs et tout endroit utilisé comme refuge par les poux (fentes, fissures et les recoins). Traiter aussi les fentes et les fissures, les espaces vides, les chemins empruntés par les insectes et tout autre emplacement où les poux rouges peuvent entrer ou se cacher. Ne pas appliquer directement sur les volailles.

Rendre les perchoirs et tout endroit apprécié comme refuge par le parasite, tel que fente et fissure, accessible, et appliquer la poudre. S'assurer que la couche poudreuse soit répartie le plus uniformément possible et soit bien visible. Renouveler le traitement si nécessaire.

**Technique d'application pour barrière :** A l'aide d'un flacon de pulvérisation manuelle. Couper la pointe de l'orifice d'application. Tout en orientant l'orifice vers le bas, exercer une légère pression sur le flacon et diffuser la poudre sur les trajets ainsi que les endroits refuges des insectes tels que fentes et fissures, ou appliquer en barrière de poudre.

**Technique d'application par saupoudrage :** Éviter les courants d'air jusqu'à ce que la poussière se soit déposée.

#### INDICATION

Il est recommandé de procéder régulièrement à un contrôle des zones susceptibles d'être infestées pour prévenir toute infestation. Après un traitement réussi, ne pas éliminer la couche de produit, celle-ci pouvant assurer un contrôle préventif à long-terme. En cas d'une nouvelle infestation, le traitement peut être renouvelé.

#### ELIMINATION & STOCKAGE

L'élimination dans les eaux usées est déconseillée. Prêter attention aux réglementations locales et nationales. Prêter attention aux réglementations locales et nationales. Vider complètement les contenants. Les matériaux d'emballage non contaminés peuvent être recyclés. Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine fermé. Stocker dans un endroit sec. Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement UE n° 2018/848.

Biocide - Insecticide/Acaricide (TP/PT 18)

Stuifpoeder - Poudre pour poudrage (DP)

Matières actives / Werkzame stoffen:

Kieselguhr (CAS 61790-53-2) : 99.9% w/w

Geraniol (CAS 106-24-1) : 0.1% w/w

Pour usage Grand Public (non professionnel) et usage professionnel /

Voor breed publiek (niet-professioneel) en professioneel gebruik

Numéro d'autorisation / Toelatingsnummer : BE : BE-REG-01683

LU: 104/22/L

Détenteur de l'autorisation et distributeur / Toelatingshouder en verdelers :

ARMOSA SA/NV 1, Rue des Tuilliers - 4480 Hermalle-sous-Huy

Tél. : +32(0)85 519 519 - info-be@armosa.eu

UFI : T71W-AFC4-8X31-7QQ3

Centre antipoisons / Antigifcentrum : 070 245 245

**Gebruikskaar biocide met insectenverdelgende en mijtendoden-de eigenschappen, om te gebruiken in pluimveekwekerijen en andere gebouwen waar dieren gekweekt worden, in de huishoudelijke omgeving en in de sector van de verwerking van grondstoffen zoals bakkerijen of molens. Toegelaten ter bestrijding van bloedluis (*Dermanyssus gallinae*), kattenvlooiën (*Ctenocephalides felis*) en kruipende insecten zoals mieren (*Lasius niger*), kakkerlakken en pissebedden.**

#### DOSERING EN GEBRUIKSAANWIJZING

**Mieren, kakkerlakken, vlooiën, pissebedden :** Met behulp van de poederdoos, 30 tot 50 g per m<sup>2</sup> aanbrengen in de zones die geregeld door de insecten bezocht worden: de randen van de ramen, onder deuren, achter wandkasten, in barsten, onder gootstenen, badkuipen, plinten en de hele omgeving van huisdieren (stro, mand, kooi...). Telkens opnieuw strooien nadat het poeder verdwenen is of nat is geworden.

**Kooien en kippennetjes tegen bloedluizen.** Vogelkooien (30 g per m<sup>2</sup>) of volières (50 g per m<sup>2</sup>). Twee of zelfs drie toepassingen zijn vereist, telkens met acht dagen ertussen. Breng het poeder aan op de stokken en op elke plaats die gebruikt wordt als schuilplaats door de luizen (spletten, barsten en uithoeken). Behandel ook kieren en spletten, holle ruimtes, looproutes en alle andere plekken waar de vogelmijten kunnen schuilen of naar binnen kunnen gaan. Niet rechtstreeks op pluimvee aanbrengen.

Zorg ervoor dat de stokken en elke plaats die voor parasieten een schuilplaats is, zoals scheuren en spletten, toegankelijk zijn en breng het poeder aan. Zorg ervoor dat de poederlaag zo gelijkmatig mogelijk verdeeld is en goed zichtbaar is. Breng indien nodig opnieuw aan.

**Aanbrengen via een barrière:** Met behulp van een fles voor handmatige verstuiving. Snijd de punt van de opening van de verpakking (verstuiver). Richt de opening naar onder, oefen lichte druk uit op het flesje DIATOMIX en verspreid het poeder op de trajecten en de schuilplaatsen van insecten, zoals spletten en scheuren, of zorg voor een poederbarrière.

**Aanbrengen via bestrooiing:** Vermijd tocht tot het poeder is neergezet.

#### INDICATIE

Er wordt aangeraden om regelmatig de zones die geïnfesteerd kunnen raken te controleren om een aantasting te vermijden. Verwijder de poederlaag niet na een geslaagde behandeling. Deze kan op lange termijn voor een preventieve controle zorgen. In het geval van een nieuwe aantasting kan de behandeling worden herhaald.

#### OPSLAG & VERWIJDERING

Afvoer naar het riool wordt ontraden. De verpakking helemaal legen. Neem officiële lokale en nationale voorschriften in acht. Niet verontreinigde verpakkingen kunnen gerecycled worden. Product gesloten en alleen in de originele verpakking bewaren. Op een droge plaats bewaren. Toepasbaar in de biologische landbouw volgens EU Verordening 2018/848.

#### DANGERS ET CONSEILS DE PRUDENCE

EUH208 Contient du geraniol. Peut produire une réaction allergique.

EUH208 Bevat geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH208 Enthält geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Inhoud/Contenu : 2 kg

Numéro de lot / Date d'expiration : voir emballage  
Lotnummer / Vervaldatum : zie verpakking

IN-DIA-00126 - PA-LAB-03126 - MAJMR240823

Distribué par / verdeeld door :

ARMOSA SA  
Rue des Tuilliers 1,  
4480 Engis, Belgium,  
+32 85 519 519  
info-be@armosa.eu  
www.protectanature.com

