

2304851

Larvenol

5 kg

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

LARVENOL contiene S-metopreno como sustancia activa, inhibidora del crecimiento de los insectos o IGR contra moscas y mosquitos. Actúa en el estadio larvario por lo que impide la evolución del insecto a su etapa adulta principalmente de las especies tales como Aedes, Anopheles, Culex y Ocherotatus de los lugares tratados y también de mosca doméstica.

MODO DE EMPLEO:

El producto debe ser extendido sobre la superficie del estiércol, ya sea con una taza de medir, o con un dispositivo apropiado según la siguiente dosificación:

LUGAR DE APUCACIÓN	PLAGA	DOSIS	Comentarios
Granjas de cerdos	Mosca doméstica	25-30 g/m ² (*)	Suelo: Aplicar el tercer día después de la introducción de ganado nuevo. Es necesario repetir el tratamiento cada vez que se retire el estiércol. Capas: Aplicar en cada nueva capa y repetir el tratamiento cada 8-10 cm.
Granjas avícolas			Jaulas: Tratar el estiércol acumulado (en una capa de 10 cm de grueso) por debajo de las jaulas. Capas: Ver instrucciones de las granjas de cerdos.
Establo de ganado			Ver instrucciones de las granjas de cerdos para cada uso.

(*) Aplicar la dosis en una capa de 10 cm de grueso de estiércol.

En el modo de empleo contra los mosquitos, se aplicará zonas cubiertas de aguas. Para lograr la máxima eficacia, iniciar el tratamiento antes de la entrada de la temporada de mosquitos, tan pronto como aparecen las primeras larvas. Revise el sitio de reproducción de antemano por el tamaño de la superficie del agua y la profundidad del agua, y aplicar las dosis necesarias por hectárea dada en la tabla de abajo por un difusor gránulo montado en equipos de mano o vehículo terrestre. Si es necesario, repetir el tratamiento cada 21 días.

LARVENOL (kg/ha)		
Tipo de sitio de reproducción	Sitio de reproducción/ profundidad del agua	
	<30 cm	>30 cm
Limpia	2	3
Parcialmente contaminada	3	4
Altamente contaminada	4	5

Los gránulos comienzan a liberar el ingrediente activo tan pronto se entra en contacto con el agua, por lo que se ha de asegurar que los gránulos dispersos están cubiertos por agua. No aplique los gránulos en zonas de aguas naturales (arroyos, ríos, etc ...). El producto debe ser aplicado, ya sea con una taza de medir, o con un dispositivo apropiado según la siguiente dosificación:

Área a tratar	3 kg LARVENOL /ha		4 kg LARVENOL /ha	
	peso	volumen	peso	volumen
10 m ²	3 g	2 ml	4 g	2.5 ml
100 m ²	30 g	20 ml	40 g	25 ml

Debido a las características del producto (sólido granulado) no es necesario retirar el ganado

durante el tratamiento y por lo tanto no se requiere establecer un plazo de seguridad. Sin embargo el contacto directo de los animales con el producto debe ser evitado. No aplique el gránulo cerca del lugar de alimentación o el lugar para beber para evitar que los animales puedan consumir el producto.

INDICACIONES DE PELIGRO: H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH208: Contiene Copolímero de ácido polietilenglicol 12-hidroxiesteárico. Puede provocar una reacción alérgica.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102 Mantener fuera del alcance de los niños P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: Medidas básicas de actuación: En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. Si es necesario traslade al accidentado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático.

Producto inscrito en el registro Oficial de Productos Zoosanitarios con N° : 03659-P
Composición :
S-Metopreno : 0.4%
Excipientes y disolventes c.s.p. 100%
USO ENTORNO GANADEROS. Uso exclusivo por personal especializado

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
Teléfono : 91 562 04 20



Passion for Farming



Distribuidor
LODI S.A.
Parc d'Activites des Quatre Routes. 35390 - Le Grand Fougeray. France.
TLF: (+02) 990 848 59

Titular (Responsable de comercialización)
KAELTIA Compliance Services S.L
Avd. Argentina, N°132, Pta.100
33202 Gijón (Asturias).
TEL: 984 391 044

 **Schippers Agrícola S.L.**
Ctra. Montmeló, 76 - Pol. Ind.
Can Català 08403 Granollers
(Barcelona)
935 689 128

MS Schippers

MS Agro Pest Control