



1

Wenn Sie mit der Insektenbekämpfung beginnen, sollten Sie mit einem möglichst Fliegen-freien Stall beginnen.



2

Um fliegende Insekten zu bekämpfen, verwenden Sie einen Vernebler oder ein Hand-/Rückensprühgerät und sprühen Sie 75ml Flüssigkeit pro 100m³.



3

Entfernen Sie Fliegenbrutplätze (Güllekrusten in der Grube), indem Sie 2kg pro 100m³ Gülleverbesserer in reichlich Wasser auflösen und den Grubeninhalt damit behandeln.



4

Beginnen Sie mit der Larvenbekämpfung mit MS Madentod. Mischen Sie es mit Wasser (Dosierung: 250g pro 10m²) und gießen/sprühen Sie es über die Spalten.



5

Wiederholen Sie die Larvenbekämpfung mit MS Madentod in Kalenderwoche 18 (29. April bis 5. Mai)



6

Beginnen Sie mit der Behandlung der adulten Fliegen. Tragen Sie MS Thia-Fly auf die gelben Streichplatten auf.



7

Wiederholen Sie die Larvenbehandlung mit MS Madentod in Kalenderwoche 24 (10. bis 26. Juni) und Woche 30 (22. bis 28. Juli).



8

Genießen Sie einen fliegenfreien Stall!