

20 KG

2305484

MS

MADENDOOD PLUS

Til indendørs bekæmpelse af stuefluer (larver af *Musca domestica*) i stalde. Må kun anvendes af professionelle brugere.

20 g/kg cyromazin

Læs først vedlagte brugsanvisning.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Udgå udledning til miljøet.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser. Vandopløseligt granulat.

Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer eller foder.

Brugsanvisning

MS Madendood Plus påføres ved at hælde det fortyndede produkt ved hjælp af en vandkande. Fortynding (%): Til fremstilling af brugsopløsningen

fortyndes 25 g biocidprodukt i 1 liter vand for at behandle 1 m².

Dosis:

Anvend 25 g biocidprodukt/m² = 0,5 g aktivstof/m²; dette svarer til 1 liter brugsopløsning per m²

Antal og tidspunkt for behandling:

Stalde til malkekøer og små drøvtyggere:

maksimum (maks.) 5 behandlinger per år.

Stalde til slagtekvæg: maks. 5 behandlinger per år.

Stalde til grise: maks. 1 behandling per år.

Stalde til høns og kyllinger: maks. 1 behandling per år.

Salde til andet fjerkræ (kalkuner, ænder, gæs):

maks. 5 behandlinger per år.

Stalde til kaniner: maks. 5 behandlinger per år.

Hvis yderligere behandlinger per år er nødvendige for en dyrekategori grundet gentagne angreb, skal alternative produkter med et andet aktivstof benyttes.

Genanvendelse i tilfælde af flere anvendelser:

Mindst 6 uger og op til flere måneder

mellem anvendelser.

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden

anvendelse og følg de givne instruktioner.

Ikke godkendt til anvendelse i stalde til slagtekvæg.

Fortynd granulatet i vand (25 g biocidprodukt i 1 liter vand til behandling af 1 m²). Kun påføring med vandkande er tilladt.

En reduktion i fluebestanden kan observeres fra 2 uger efter påføring af produktet.

Faciliteter til kvæg og små drøvtyggere (f.eks. får og geder)

Dybstrøelse: Udfør behandlingen inden for de første

par dage (op til tre dage) efter påbegyndelsen af en opdrætscyklus eller inden for de første tre dage efter fjernelse af gødning, når opbygningen af nyt ynglemateriale er startet. Brug behandlingen langs

vægge, kanter og spilddområder omkring foder- og drikkeanordninger samt hvor gødning ophobes. Flueynglepladser vil sandsynligvis være der, hvor gødning ikke er komprimeret, især langs vægge eller hegn, da begrænset udvikling af fluelarver forekommer i veltrådt strøelse.

Spaltegulv: Behandl hele gulvarealet inden for de første par dage (op til 3 dage) efter rengøring af gødningsgraven, men først efter at ny gødning er begyndt at hobe sig op igen.

I tilfælde af små drøvtyggere (f.eks. får og geder), der holdes på blød strøelse: larver kan findes på hele overfladen af boksen; derfor er påføring af produktet på hele overfladen nødvendig. Påfør i hjørner eller omkring drikke- og fodertrug hvis det er nødvendigt.

Svinefaciliteter

Alt-ind, alt-ud system: Udfør behandlingen inden for de første par dage (op til 3 dage) efter

rengøring

af gødningsgraven, men først efter at ny gødning begynder at hobe sig op.

Spaltegulv: Behandl hele gulvarealet inden for de første par dage (op til 3 dage) efter fjernelse af gødning, men først efter at ny gødning begynder at hobe sig op.

Dybstrøelse: Udfør behandlingen inden for de første par dage (op til 3 dage) efter fjernelse af gødning, men først efter at ny gødning begynder at hobe sig op. Brug behandlingen langs vægge, kanter og spilddområder omkring foder- og drikkeanordninger samt hvor gødning ophobes. Flueynglepladser vil sandsynligvis være der, hvor gødning ikke er komprimeret, især langs vægge eller hegn, da begrænset udvikling af fluelarver forekommer i veltrådt strøelse.

Høns- og kyllingefaciliteter (ægglæggere, slagtekylinger, avlsdyr)

Dyb gødningsgrave, spaltegulv, drift med ophobning af gødning på gulvet: Udfør behandlingen af hele gødningsområdet inden for de første par dage (op til 3 dage) efter fjernelse af gødning, men først efter at gødning begynder at hobe sig op.

Strøelsesdrift: Påfør på de fugtige steder hvor larver

udvikler sig, såsom områder omkring drikke- og foderanordninger, eller på steder, hvor der opstår vandlækager (fald af kondensvand, lækage fra vandør osv.).

Drift med gødningsfjernessystemer: Fjern gødningen uden for driften med intervaller, der er tilstrækkeligt hyppige til at undgå udvikling af larver. Spild af gødning på gulvet eller ophobning af gødning i hjørner kan forekomme og fremme udviklingen af larver. Udfør behandlingen ved at hælde brugsopløsningen på disse steder.

Andet fjerkræ (kalkuner, ænder, gæs)

Strøelse: Påfør brugsopløsningen på de fugtige områder hvor larver kan udvikle sig såsom områderne omkring drikke- og foderanordninger eller steder, hvor der opstår lækager af vand (kondensvand, lækage fra vandør osv.).

Spaltegulv: Påfør brugsopløsningen på hele gødningsområdet inden for de første par dage (op til 3 dage) efter fjernelse af gødning, men først efter

at ny gødning begynder at hobe sig op. Gentag påføringen, når tykkelsen af gødningslaget stiger med 10 cm.

Kaninfaciliteter

Dyb gødningsgrave, drift med ophobning af gødning på gulvet: Påfør brugsopløsningen på hele gødningsområdet inden for de første par dage (op til 3 dage) efter fjernelse af gødning, men først efter at gødning begynder at hobe sig op. Gentag påføringen, når tykkelsen af gødningslaget stiger med 10 cm.

Drift med mekaniske fjernessystemer: Fjern gødning uden for driften med intervaller, der er tilstrækkelige til at undgå udvikling af larver. Spild af gødning på gulvet eller ophobning af gødning i hjørner kan forekomme og fremme udviklingen af larver. Udfør behandlingen ved at hælde brugsopløsningen på disse punkter.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet

Udled ikke biocidproduktet eller den fortyndede opløsning af biocidproduktet i kloaksystemet eller vand.

Fugt fast materiale omhyggeligt for at forhindre, at det blæses væk.

Opsamlers mekanisk i egnet beholder til bortskaffelse.

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

Førstehjælpsinstruktioner

VED KONTAKT MED HUDEN: vask huden med vand.

Ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Ved symptomer skyld med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette

kan gøres let. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTÆGSELSE: ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge

Bortskaffelse

Rester af biocidproduktet skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale og regionale bestemmelser.

Opbevar biocidprodukter i originale beholdere. Må ikke blandes med andet affald.

Resistens foranstaltninger

Følgende generelle forholdsregler vedrørende resistenshåndtering skal anvendes:

· Hvis der er mistanke om resistensudvikling, er det

nødvendigt at skifte til et alternativt produkt, med et aktivstof med anden virkemåde.

· Brug produkter med forskellige virkemåder på skift for at forebygge forekomst af resistens mod aktivstoffer, og undgå hyppig gentagen brug af samme aktivstof.

· Det anbefales at supplere behandling i

husdyrsfaciliteter med et middel imod voksne fluer.

· Anvendelsen af biocidprodukter kan kombineres med andre sanitære foranstaltninger (f.eks. hyppig fjernelse af gødning) eller ikke-kemiske bekæmpelsesmidler (f.eks. brug af parasitoider hvor dette er muligt) i et integreret program til fluebekæmpelse.

Risikoreducerende foranstaltninger

Brug en applikator (f.eks. måleske eller bæger) til blanding og påfyldning.

Følgende risikoreducerende foranstaltninger skal anvendes, uden at det berører arbejdsgivernes anvendelse af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning inden for arbejdsmiljø- og sikkerhed.

a) Brug kemikalieresistente nitrilhandsker (EN 374).

b) Brug egnet sikkerhedsfodtøj mod kemikalier (EN 13832 eller tilsvarende), når produktet anvendes.

c) Ved efterfølgende håndtering af behandlet gødning

anbefales det at bære kemikalieresistente nitrilhandsker, beskyttelses- hældragt (EN 13034, minimum type 6 eller tilsvarende) og egnet sikkerhedsfodtøj (EN 13832).

Må ikke bruges direkte på dyr

Behandl ikke foder, drikke- og fodertrug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke i områder, der er tilgængelige for offentligheden.

Anvend ikke i avlsstationer eller andre avlsområder

for kyllinger.

Brug ikke i stalde, hvor eksponering til et rensningsanlæg eller direkte udledning til overfladevand ikke kan forhindres.

Reg.nr.: EU-0032480-0000

Elanco Animal Health Inc.

Mattenstrasse 24A

CH-4058 Basel

Elanco

YL243060D 100057

25 LV 10

The
Schippers
Group

Europe:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Download app!
Scan this product



2305484