

MS MADENDOOD

MS LARVAKILL

UFI : CSRD-KHV9-AW37-D7WW

25 LV 06

Download app!
Scan this product



2307831

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

UNITED KINGDOM

Insecticide for professional use to control the larvae of house fly, lesser house fly and stable fly in animal husbandry situations such as treatment of deep litter/ dung in poultry, pig, dairy, calf, rabbit units, goat sheds, fur farms and stables. Also for the treatment of rubbish bins in the food sector.

2% W/W CYROMAZINE (CAS 66215-27-8) – SOLUBLE GRANULE (SG) FORMULATION

Directions for use: Application schedules

Cattle facilities

Deep litter: treat eggs and spillage areas around feeders and drinkers and where manure accumulates. In calve hutches placed outside, treat the whole surface body. Apply MS MADENDOOD by spraying or watering approximately 3 days after dung removal and repeat treatment after each removal or when fly larvae are found.
Slatted floor: treat entire floor area immediately after cleaning out the dung pit, repeat treatment after each removal or when fly larvae are found.

Swine facilities

All-in, all-out system : Apply MS MADENDOOD preferably by scattering immediately after cleaning and prior to the installation of the pigs.
Slatted floors : treat entire floor area immediately after cleaning out the dung pit, repeat treatment after each removal or when fly larvae are found.
Deep litter : Apply MS MADENDOOD by spraying or watering approximately 3 days after dung removal and repeat treatment after each removal or when fly larvae are found. Treat entire dung surface and wet spot around feeders and drinkers.

Poultry facilities

Apply MS MADENDOOD by spraying or watering in the entire dung area approximately 1 week after manure removal. Repeat treatment after each removal or when fly larvae are found.
Other units : MS MADENDOOD can also be used in sheep

and goat sheds, rabbits farms, zoological gardens. Mink and fox farms in the same manner.

Dry scattering

Apply MS MADENDOOD directly and evenly on the fly breeding sites. Use dry scattering only in case of wet or liquid manure.

Spraying: Thoroughly mix the indicated quantity of MS MADENDOOD with the corresponding volume of water. Apply on fly breeding sites with a knapsack sprayer or with an automatic spray equipment.

IMPORTANT:

MS MADENDOOD is applied only on fly breeding sites. It is not intended for application to fly resting sites (walls, ceilings, etc.) as it has no effect on adult flies. Not to be used on manure intended for the production of mushroom compost.

Applications should be made to moist areas where houseflies are breeding.

In deep pit poultry houses, with vertical multi-tiered cages with automatic scrapers, more effective distribution of MS MADENDOOD can be achieved by applying a series of reduced doses over a period of 3 weeks. Apply 25g MS MADENDOOD dissolved in 1 or more litres of water, 3 times weekly on alternative weekdays for a 21 day period, ie a total of 9 applications in a treatment cycle.

Strains of some fly species are resistant to insecticides. Where flies resistant to products containing cyromazine occur, MAGGTOS GR is unlikely to give satisfactory control. Repeat treatments are likely to result in lower levels of control.

If resistance to MS MADENDOOD is suspected this should be reported to the manufacturer and advice sought on appropriate control measures to help prevent the further development of spread of resistance.

Use MAGGTOS GR as part of an integrated pest management approach, including appropriate non-chemical control measures. Fly populations should be monitored and product applications appropriately targeted.

This product should not be used continuously against houseflies in intensive applications/refuse/waste treatment. If sustained treatment using an insecticide is required,

Application	Dose rate	Treated area
Dry scattering	500g	20m ²
Spraying (Directly onto muck)	500g/ 5L of water	20m ²
Spraying (indirectly – through slatted floor units)	500g/ 5L of water	20m ²

alternative with products with different active ingredients and a different control method (such as space sprays or baits) as part of a treatment cycle to reduce the risk of resistance developing.

Treatment interval

The recommended treatment interval depends on management and housing systems as well as on climatic conditions. It can vary from 2-3 weeks up to several months. Animals can be present during applications. Often, 6 weeks intervals suffice.

Last time of application

Apply a maximum of 25g of product onto manure 21 days prior to spreading onto grass or arable land. Maximum number of treatments must not be exceeded : calf manure/slurry – 6 per year ; pig manure/slurry – 3 per year ; poultry manure slurry – a maximum total dose of 50g of product per square metre of manure/slurry per year.

USE PRECAUTIONS:

- The COSHH (Control of Substances Hazardous To Health) Regulations 2002 (as amended) apply to the use of this product at work.
- Avoid excessive contamination of coveralls.
- DO NOT CONTAMINATE FOODSTUFFS, EATING UTENSILS OF FOOD CONTACT SURFACES.
- This material and its container must be disposed in a safe way.
- UNPROTECTED PERSONS AND ANIMALS SHOULD BE KEPT AWAY FROM TREATED AREAS UNTIL SURFACES ARE DRY.

- DO NOT APPLY DIRECTLY TO LIVESTOCK AND POULTRY.
- EXCLUDE ALL PERSONS AND ANIMALS DURING TREATMENT.
- COVER ALL WATER STORAGE TANKS before application.
- HAZARDOUS TO BEES.
- Protect milk machinery and milk containers from contamination.
- WASH HANDS AND EXPOSED SKIN before meals and after use.
- KEEP IN A SAFE PLACE.
- COLLECT EGGS AND REMOVE FEED, EXPOSED WATER AND MILK BEFORE APPLICATION.

STATUTORY CONDITIONS OF APPROVAL RELATING TO USE

FOR USE ONLY AS AN INSECTICIDE FOR USE ONLY BY PROFESSIONAL OPERATORS

Dose: See Section « DIRECTIONS FOR USE » for details on dose rate READ ALL PRECAUTIONS BEFORE USE.
HSE Nr 9657 Users must comply in full with all their legal responsibilities under the Control of Pesticides Regulations 1986 (as amended), including complying with all conditions of Approval

To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use.

Biocide PT 18 (insecticide)

Authorization holder

ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis – Belgium

This product is approved under Control of Pesticides Regulations 1986 (as amended) for use as directed. RED ALL PRECAUTIONS BEFORE USE – HSE n°9553 – USE ONLY IN ACCORDANCE WITH THE DIRECTIONS ON THE LABEL

Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
United Kingdom
Tel: 1733592049

Registration number
HSE-9657

ÁREA PRINCIPAL

- Insecticida contra larvas de moscas
- Granulado adecuado para esparcir, o para disolver y verter o rociar
- Uso ganadero
- Composición:
Ciomazina: 2% CAS 66215-27-8
Excipientes csp: 98%
- Número de inscripción en el Registro: 02810-P
- Lote y Fecha de caducidad: ver marcaje
- Titular: ARMOSA TECH SA., Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium, www.belagri.com, Tel. +32 85 519 519
- Responsable de la comercialización:
Schippers Agrícola SL

ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

Símbolo: Ninguno

Frases de riesgo: Ninguna

Consejos de prudencia:

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso
- No respirar los vapores/aerosoles
- Evítese en contacto con los ojos y la piel
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta)

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidentes:

La intoxicación puede provocar:

- Irritación de los ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
 - Náuseas, vómitos.
 - Dermatitis de contacto y sensibilización.
- Primeros auxilios:
- En contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. NO o olvide retirar las lentillas.
 - En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, sin frotar.
 - Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELÉFONO 91 562 04 20.

ÁREA DE APLICACIONES Y USOS

Finalidad del producto: Larvicida. Regulador de crecimiento de insectos para el control de larvas de mosca mediante tratamiento tópico de lugares de cría.

Características: MS MADENDOOD es una formulación granulada adecuado para esparcir, o para disolver y verter o rociar.

Usos autorizados: Es un insecticida para uso profesional contra las larvas de moscas domésticas (*Musca domestica* y *Stomoxys calcitrans*) mediante aplicación en el suelo en explotaciones avícolas más pequeñas, explotaciones de engorde y de cría de cerdos más pequeñas, explotaciones de vacuno de leche y de cría de terneros más pequeñas, cobertizos de ovejas y cabras, cuadras de caballos, granjas de conejos, parques zoológicos y vertederos y contenedores de basura.

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.

Modo de empleo: MS MADENDOOD se aplica mediante dispersión en seco o en disolución mediante vertido o rociado de una disolución a una dosis de 25 g de MS MADENDOOD por m² directamente sobre el estiércol o sobre otros lugares de cría de moscas, de acuerdo con las siguientes dosis:

Metodo de aplicación	Tasa de dilución	Dosis de aplicación
Dispersión en seco	-	500g/20 m ²
Pulverización	500g/5L	20 m ²
Riego	500g/15L	20 m ²

Usualmente, de dos a tres tratamientos a intervalos de dos semanas son suficientes. Se recomienda el uso simultáneo de un adulticida, con el fin de controlar la afluencia de moscas adultas

Titular del producto referenciado

ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis – Belgium

Biocida, producto tipo 18 (insecticida)

MS MADENDOOD contient de la cyromazine, un régulateur de croissance spécifique contre les larves de la mouche domestique (*Musca domestica*). Il est sans effet sur les mouches adultes.

Granulés solubles (SG), insecticide (biocide TP 18)

Matière active : Cyromazine 2 g/kg (2% m/m, CAS 66215-27-8)

UTILISATION

Toutes productions animales : destruction des larves (tous stades larvaires) de mouches et de mouchérons dans le fumier, le lisier, la litière, les fosses et les préfossees. Pour un usage grand public et professionnel dans les étables et autres bâtiments d'élevage.

MODES ET DOSE D'EMPLOI

Le dosage est de 250 g de MS MADENDOOD pour 10 m² de surface à traiter. Le produit peut être appliqué selon le degré d'humidité des déjections :

- en épandage à sec : 250 g pour 10 m² directement sur la surface

Répéter le traitement toutes les 8 semaines. Des recommandations plus spécifiques sont données dans les exemples de traitement ci-dessous.

EXEMPLES DE TRAITEMENT

MS MADENDOOD s'applique aux endroits où se développent les larves de mouches :

- dans les étables bovines et les écuries, traiter une bande d'environ 50 cm le long des murs, à côté et sous les installations.

En cas de fumure liquide, les granulés de MS MADENDOOD peuvent être épandus directement. Le premier traitement devra intervenir 1 à 3 jours après l'enlèvement du fumier.

- dans les étables bovines à caillebotis et les porcheries à caillebotis intégral, épandre uniformément les granulés sur la totalité de la surface. Le premier traitement interviendra après la vidange des fosses.
- dans les porcheries à caillebotis partiel, le traitement se limite aux surfaces couvertes par les caillebotis ainsi que les zones périphériques des auges et des aires de repos.
- dans les poulaillers avec fosse à déjections, épandre directement les granulés si le lisier est liquide ou humide.
- dans les poulaillers avec déjections sèches, traiter l'ensemble de la surface. Le premier traitement devra intervenir une semaine environ après l'enlèvement du fumier.

PRECAUTIONS :

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P405 - Garder sous clef.

Ne pas appliquer directement sur les animaux.

Appliquer le produit uniquement dans des étables vides. Dans les exploitations laitières, couvrir soigneusement les fourrages, les dispositifs d'alimentation et les abreuvoirs ainsi que les machines à traire et les attaches pour animaux. Les animaux peuvent réentrer dans les bâtiments dans la journée après application.

Appliquer seulement aux endroits hors de portée des animaux.

Ne doit pas être appliqué sur le corps de l'animal et ne doit pas être mélangé avec des agents blanchissants.

Ne pas jeter dans les égouts ou les cours d'eau. Nettoyer le matériel à l'eau en rejetant l'eau de nettoyage sur les zones traitées.

L'emballage partiellement vide doit être rapporté au point de vente ou remis à un centre de collecte pour déchets spéciaux. L'emballage vide doit être éliminé avec les déchets urbains et ne peut pas être réutilisé.

Premiers secours :

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Centre antipoison de Paris : tél. 01 40 05 48 48

Stockage:

Stocker dans les contenants d'origine hermétiquement fermés dans un endroit bien ventilé sec et frais. Inaccessible et isolées des denrées alimentaires, des boissons et des matières premières d'origine animale pour les enfants et les animaux domestiques.

Numéro de lot/date d'expiration : voir emballage

Détenteur d'autorisation

ARMOSA TECH SA

Rue des Tuilliers 1

4480 Engis – Belgium

MS Madendood- Contre les larves de mouches et de moucheron dans les locaux d'élevage.

Insecticide contre les larves de mouches dans le fumier, le lisier, la litière, les fosses et les préfosse. Réservé à l'usage professionnel. MS Madendood contient de la cyromazine (CAS 66215-27-8), un régulateur de croissance spécifique contre les larves des différentes espèces de mouches. Il est sans effet sur les mouches adultes.

Composition

Granulés solubles (SG) à base de 20 g/kg Cyromazine (CAS 66215-27-8) (2%).

Mode et dose d'emploi

250 g de MS Madendood suffisent pour 10 m² de surface à traiter. Le produit peut être appliqué selon de degré d'humidité des déjections:

En épandage à sec: 250 g pour 10 m² directement sur la surface;

Au pulvérisateur: 250 g pour 10 m² dans 1 à 4 litres d'eau chaude.

À l'arrosoir: 250 g pour 10 m² dans 4 à 10 litres d'eau chaude.

Traiter deux fois les surfaces à un intervalle de 15 jours. Ensuite renouveler toutes les 6 semaines ou dès que l'épaisseur de la litière a augmenté de plus de 10 cm. Dernière application: 21 jours avant d'épandre le fumier sur les terres arables ou les prairies. Le produit peut être appliqué en présence des animaux à condition d'éviter le contact direct avec ceux-ci pendant le traitement (ne pas asperger les animaux, les abreuvoirs ou les mangeoires). Enlever les oeufs, la nourriture, l'eau ou le lait avec l'application.

Exemples de traitement

MS Madendood s'applique aux endroits où se développent les larves de mouches:

dans les étables à bovins sur litière profonde: traiter une bande d'environ 50 cm le long des murs, à côté et sous les installations à l'arrosoir ou avec un pulvérisateur (si présence de caillebotis, épandre uniformément les

granulés secs sur la totalité de cette surface. Les étables à veaux et les coins veaux seront traités tous les 15 jours. dans les porcheries à caillebotis intégral: épandre uniformément les granulés sur la totalité de la surface.

En cas de caillebotis partiel, traiter les surfaces couvertes par les caillebotis ainsi que les zones périphériques des aires de repos et sous les auges de l'arrosoir. Premier traitement: avant la rentrée des animaux et après l'enlèvement du fumier ou lisier.

dans les poulaillers avec fosse à déjections: épandre directement les granulés si le lisier est liquide ou humide. dans les poulaillers avec déjections sèches: il faut traiter par arrosage ou pulvérisation l'ensemble de la surface. Premier traitement: une semaine environs après l'enlèvement du fumier. Renouveler avant que l'épaisseur de la nouvelle couche ne dépasse 10 cm. sur les tas de fumier, il faut traiter à l'arrosoir.

Precautions

P102 Tenir hors de portée des enfants. P260 Ne pas respirer les aérosols. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

CENTRE ANTI-POISON: 070/245.245

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Eviter que le produit, la reste de la bouillie ou l'eau de rinçage polluent les eaux de surface et souterraines. Les surplus non utilisés sont à remettre à un centre agréé en traitement de déchets. Ce produit correspond à toutes les obligations légales. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou autres effets nuisibles directs ou indirects pouvant résulter du transport du stockage, de l'emploi et mode d'application de nos produits.

Détenteur de l'autorisation:

ARMOSA TECH SA
Z.I. de Hermalle/Huy, 1 rue des Tuiliers,
B-4480 Engis - Belgique

MS Madendood - Tegen de maden van stalvliegen en van mestvliegjes in stallen

Insecticide tegen vliegenlarven in mest, drijfmest en mestputten. Enkel voor professioneel gebruik. MS Madendood bevat cyromazine, een groeiregulator die specifiek werkzaam is tegen de larven van verschillende vliegensoorten. MS Madendood vertoont geen enkele werking tegen volwassen vliegen.

Samenstelling

Wateroplosbaar granulaat (SG) op basis van 20 g/kg (2%) Cyromazine (CAS 66215-27-8).

Gebruiksaanwijzing - Dosis

250 g MS Madendood per 10 m² te behandelen oppervlakte.

De toepassingswijze kan aangepast worden naargelang de droogtegraad van de uitwerpselen.

Droog uitstrooien: de korrels over het oppervlak strooien à 250 g per 10 m²,

Met een rug-of andere spuit: 250 g MS Madendood oplossen in 1 tot 4 liter lauwwarm water per 10 m² mest;

Met een gieter: 250 g MS Madendood oplossen in 10 l lauwwarm water per 10 m² mest.

De oppervlakken tweemaal behandelen met 14 dagen tussentijd. Vervolgens om de zes weken de behandeling herhalen of als de mestlaag met 10 cm is toegepast worden, maar er mag geen direct contact met de dieren zijn tijdens de toepassing. (Niet rechtstreeks op de dieren toepassen, ook niet op de drink- of voederbakken). Voor gebruik de eieren, veevoeders, water en melk verwijderen.

Voorbeelden van behandeling

In runderstallen met dikke strooisellaag: een strook van ongeveer 50 cm langs de wanden, onder en naast de installaties, waar de dieren het stro niet fijntrappen, behandelen met spuit of gieter. In stallen met roosters de korrels droog over de gehele oppervlakte verspreiden. Kalvermeststallen en kalverboxen om de 15 dagen behandelen.

In varkensstallen: in stallen met een volledig rooster de

korrels gelijkmatig over het hele oppervlak verspreiden. In stallen met een gedeeltelijk rooster de korrels droog over de gehele oppervlakte verspreiden. Kalvermeststallen en kalverboxen om de 15 dagen behandelen.

In kippenstallen met mestputten: de korrels droog verspreiden indien de mest vloeibaar of zeer vochtig is.

In kippenstallen met droge mest: behandelen met een gieter of spuit. Eerste behandeling ongeveer een week na verwijdering van de mest. De behandeling herhalen voor de mest met 10 cm aandikt.

Mesthopen: zullen met de gieter behandeld worden.

Voorzorgsmaatregelen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P260 Spuitnevel niet inademen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. ANTIGIFCENTRUM: 070/245.245

Lege verpakkingen en overschotten

De lege verpakking binnenbrengen bij de daartoe voorziene ophaalpunten. Vijvers, waterlopen, grachten of enig ander oppervlakte- of ondergronds water niet vervuilen met product, productoplossing of met spoelwater. Eventuele productoverschotten bij een erkende verwerker of verwerker bezorgen. Dit product beantwoordt aan alle eisen door de wet gesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van onze producten.

ARMOSA TECH SA

Rue des Tuiliers 1
4480 Engis - Belgium

Biocide, PT/TP 18 (insecticide)

Schippers BV

Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Centre antipoisons / Antigifcentrum : 070 245 245

Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder :

ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 14480 Engis

MS MADENDOOD enthält Cyromazin, ein spezifischer wachstumsregulierender Stoff, der gegen Larven diverser Arten von Fliegen wirkt. Es ist wirkungslos bei erwachsenen Fliegen.

Granulate
Wirkstoff: Cyromazin (CAS 66215-27-8) 20 g/kg

Anwendungsbereich

Jede Stätte, an der Viehzucht betrieben wird: Zerstörung von Fliegen- und Mückenlarven im Dung, in der Gülle und in der Einstreu, sowie in Sickergruben und Vorflutern.

Anwendungsform und Dosierung

Die Dosierung beträgt 250 g MS MADENDOOD auf 10 m² zu behandelnde Fläche. Das Produkt ist gemäß dem Feuchtigkeitsgrad des Dungs anzuwenden:

- Streuen: 250 g auf 10 m² direkt auf die Oberfläche
- Zerstäuben: 250 g auf 10 m² in 1 bis 4 Liter Wasser;
- Gießen: 250 g auf 10 m² in 10 Liter Wasser.

Anwendung alle 6 Wochen wiederholen. Nähere Empfehlungen werden in den folgenden Anwendungsbeispielen gegeben.

Anwendungsbeispiele

MS MADENDOOD kommt in den Bereichen zum Einsatz, in denen sich Fliegenlarven entwickeln, wie:

- in Kuh- und Pferdeställen, einen Streifen von etwa 50 cm Breite entlang der Wände, seitlich und unter den Ständen mit einer Giesskanne oder einem geeigneten Zerstäuber behandeln.
- Bei Flüssigdung kann das MS MADENDOOD-Granulat direkt angebracht werden. Die erste Behandlung sollte 1 bis 3 Tage nach dem Ausmisten erfolgen.
- in komplett mit Gitterrosten versehenen Kuh- oder Schweineställen: Granulat gleichmäßig auf der gesamten Fläche verteilen. Erste Behandlung nach Leerung der Güllegruben.
- in Schweineställen mit teilweise verlegten Gitterrosten beschränkt sich die Behandlung auf die Flächen, die von den Rosten bedeckt werden, sowie auf die Randbereiche der Futtertröge und der Ruhebereiche.
- in Hühnerställen mit Flüssigentmistung: Granulat direkt anbringen, sobald der Dung feucht oder flüssig ist.
- in Hühnerställen mit Trockenentmistung muss die

gesamte Fläche mit Gieß- oder Zerstäubegerät behandelt werden. Die erste Behandlung sollte etwa eine Woche nach dem Ausmisten erfolgen.

Precautions:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Nicht direkt auf Tiere auftragen.

Nur in leeren Stallungen auftragen. In Milchviehbetrieben sind Futter, Tränke, Fütterungssysteme und Melkmaschinen abzudecken.

Außerhalb der Reichweite der Tiere auftragen.
Nicht mit Bleichmitteln mischen

Teilentleerte(r) Verpackung der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben.
Entleerte(r) Verpackung mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

Lagerung:

Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden, an einem gut belüfteten Ort, kühl und trocken lagern. Für Kinder und Haustiere unzugänglich und getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.

Chargennummer/expiry date: siehe Verpackung

Zulassungsinhaber

IFR Associés
9 Rue du Mont-Blanc
1211 Genève

Biozid, PT 18 (Insektizid)

MS MADENDOOD contient de la cyromazine, un régulateur de croissance spécifique contre les larves des différentes espèces de mouches. Il est sans effet sur les mouches adultes.

Granulés solubles :
Matière active : Cyromazine (CAS 66215-27-8) 2 g/kg

Utilisateurs professionnels

UTILISATION

Toutes productions animales : destruction des larves de mouches et de mouchérons dans le fumier, le lisier, la litière, les fosses et les préfossees.

MODES ET DOSE D'EMPLOI

Le dosage est de 250 g de MS MADENDOOD pour 10 m² de surface à traiter. Le produit peut être appliqué selon le degré d'humidité des déjections :

- en épandage à sec : 250 g pour 10 m² directement sur la surface
- au pulvérisateur : 250 g pour 10 m² dans 1 à 4 litres d'eau
- à l'arrosoir : 250 g pour 10 m² dans 10 litres d'eau.

Répéter le traitement toutes les 6 semaines. Des recommandations plus spécifiques sont données dans les exemples de traitement ci-dessous.

EXEMPLES DE TRAITEMENT

MS MADENDOOD s'applique aux endroits où se développent les larves de mouches :

- dans les étables bovines et les écuries, traiter une bande d'environ 50 cm le long des murs, à côté et sous les installations avec un arrosoir ou un pulvérisateur adapté.
- En cas de fumure liquide, les granulés de MS MADENDOOD peuvent être épanchés directement. Le premier traitement devra intervenir 1 à 3 jours après l'enlèvement du fumier.
- dans les étables bovines à caillebotis et les porcheries à caillebotis intégral, épandre uniformément les granulés sur la totalité de la surface. Le premier traitement interviendra après la vidange des fosses.
- dans les porcheries à caillebotis partiel, le traitement se limite aux surfaces couvertes par les caillebotis ainsi que les zones périphériques des auges et des aires de repos.
- dans les poulaillers avec fosse à déjections, épandre

directement les granulés si le lisier est liquide ou humide.

- dans les poulaillers avec déjections sèches, il est nécessaire de traiter par arrosage ou pulvérisation l'ensemble de la surface. Le premier traitement devra intervenir une semaine environ après l'enlèvement du fumier.

Précautions :

P102 Tenir hors de portée des enfants
P103 Lire l'étiquette avant utilisation
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P273 Eviter le rejet dans l'environnement
P405 Garder sous clef

Ne pas appliquer directement sur les animaux.
Appliquer le produit uniquement dans des étables vides. Dans les exploitations laitières, couvrir soigneusement les fourrages, les dispositifs d'alimentation et les abreuvoirs ainsi que les machines à traire et les attaches pour animaux. Appliquer seulement aux endroits hors de portée des animaux.
Ne doit pas être mélangé avec des agents blanchissants.

L'emballage partiellement vide doit être rapporté au point de vente ou remis à un centre de collecte pour déchets spéciaux. L'emballage vide doit être éliminé avec les déchets urbains.

Stockage:

Stocker dans les contenants d'origine hermétiquement fermés dans un endroit bien ventilé sec et frais. Inaccessible et isolées des denrées alimentaires, des boissons et des matières premières d'origine animale pour les enfants et les animaux domestiques.

Numéro de lot/date d'expiration: voir l'emballage

Détenteur d'autorisation

IFR Associés
9 Rue du Mont-Blanc
1211 Genève

Biocide, TP 18 (insecticide)

Schippers Export BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Zulassung/Autorisation:
CHZN3524

Produkt przeznaczony do zwalczania larw much w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie, w oborniku i ściółce oraz w śmietnikach. Eliminacja owadów zachodzi stopniowo i staje się widoczna po dwóch tygodniach po zastosowaniu. Stosować tylko na oborniku lub innych miejscach hodowlanych. Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza zasięgiem zwierząt.

Substancje czynne: N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina/cyromazyna 2g/100g Stosowanie: Obory, chlewnie: Produkt rozprowadzić poprzez spryskiwanie lub polewanie w miejscach gdzie znajduje się obornik, w pobliżu karminków i poidel, na całą powierzchnię ściółki. Po trzech dniach usunąć obornik z martwymi larwami much i ponownie zastosować produkt. Proces powtarzać do momentu, kiedy nie zauważalne będą larwy much w oborniku.

Fermy: Produkt stosować poprzez polewanie lub spryskiwanie obornika,

zabieg powtórzyć po tygodniu od usunięcia obornika z martwymi larwami much.

Dawkowanie: 250g produktu na 10m² obornika.

Polewanie: 250g rozpuścić w 7,5l ciepłej wody, Wystarcza na 10m² powierzchni.

Rozpylanie: 250g rozpuścić w 2,5l ciepłej wody. Wystarcza na 10m² powierzchni. Powtórzyć zabieg na oborniku po 15 dniach. Ostatecznie powtórzyć zabieg po raz trzeci, ponownie po 15 dniach. Rozsypany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Przechowywanie produktu: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w suchym i bezpiecznym miejscu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.

Środki ostrożności: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą: zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą z mydłem.

W kontakcie z oczami: przemywać wodą utrzymując powieki otwarte. Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza.

Przypadkowe spożycie: nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub skontaktować

się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Postępowanie z odpadami produktu: Niewykorzystany produkt oraz resztki produktu umieścić w szczelnym pojemniku. Odpadowy produkt oraz opakowanie przekazać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

Produkt do użytku profesjonalnego!
Postać produktu: granulat
Numer serii:
Data ważności:
Numer pozwolenia: 6028/14
Podmiot odpowiedzialny: ARMOSA
TECH SA Rue des Tuiliers 1 4480
ENGIS, Belgia Tel. : 0032 85 519 519

Putukatõrjevahend kärbsevastsetele sõnnikus ja sodis.

Sisaldab: 2% Tsüromasiin (CAS 66215-27-8)

Kasutamine: MS MADENDOOD toote näol on tegemist veeslahustuvate graanulitega, mida võib sõnnikule nii kuivalt puistata kui pihustada.

Sügava sodi korral töödelge servasid, toidu- ja joogikünade ümber olevaid alasid ning piirkondi, kuhu sõnnikut koguneb. Restpõrandal töödelge kogu põrandapinda.

Kasutamise sagedus**Veiselaudad**

Sügav sodi: Töödelge servasid, toidu- ja joogikünade ümber olevaid alasid, ning piirkondi, kuhu sõnnikut koguneb. Õues asuvates vasikaaedikutes töödelge kogu piirkonda. Kasutage MS MADENDOOD tõrjevahendit kas pihustamise või kastmise teel umbes 3 päeva pärast sõnniku eemaldamist ja korra protseduuri pärast iga sõnniku eemaldamist või kui näete kärbsevastseid. Restpõrand: Töödelge kogu põrandapinda kohe pärast sõnnikuala tühjendamist, korra protseduuri pärast iga tühjendamist või kui näete kärbsevastseid.

Sealaudad

All-in-all-outsüsteem: Kandke MS MADENDOOD

soovitatavalt töödeldavale pinnale kohe pärast puhastamist ja enne sigade lauta laskmist. Restpõrand: Töödelge kogu põrandapinda kohe pärast sõnnikuala tühjendamist, korra protseduuri pärast iga tühjendamist või kui näete kärbsevastseid. Sügav sodi: Kasutage MS MADENDOOD tõrjevahendit kas pihustamise või kastmise teel umbes 3 päeva pärast sõnniku eemaldamist ja korra protseduuri pärast iga sõnniku eemaldamist või kui näete kärbsevastseid. Töödelge kogu sõnnikuala ja niiskeid alasid toidu- ja joogikünade ümbruses.

Kanalad

Kasutage MS MADENDOOD tõrjevahendit kas pihustamise või kastmise teel umbes 1 nädal pärast sõnniku eemaldamist. Korra protseduuri pärast iga sõnniku eemaldamist või kui näete kärbsevastseid.

Muud rajatised

Kandke MS MADENDOOD tõrjevahendit kärbeste paljunemispikadesse 1-3 päeva pärast paljunemist soodustava mustuse kogunemist. Järgmine tõrje peaks toimuma 2 nädala pärast.

Doos: 250g MS MADENDOOD 10 m2 sõnniku kohta.

Kastmine: 250g lahustada 10 liitris leiges vees.

Pihustamine: 250g lahustada 1 kuni 4 liitris leiges vees.

Korra sõnniku töötlemist 15 päeva pärast.

Lõpuks korra protseduuri veelkord 15 päeva hiljem.

Tähtis: MS MADENDOOD toimib kasvuregulaatorina ja mõjutab kärbsevastsete arenguprotsessi. See ei tapa täiskasvanud kärbeid. Täiskasvanud kärbeste arvu vähenemine toimub järk-järgult ning on märgatav üks või kaks nädalat pärast piirkonna töötlemist. Kandke tõrjevahendit ainult sõnnikule või muudesse paljunemist soodustavatesse piirkondadesse.

Ohutusnõuded:

P102 – Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

P103 – Enne kasutamist lugege infolehte.

P270 – Ärge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamise ajal.

P273 – Vältige tootesattumist looduskeskkonda.

P405 – Ladustage lukustatud kohas.

Vältige tootesattumist toidu- ja joogikünadesse. Ladustage tihedalt suletud originaalpakendis lastele ja loomadele kättesaamatud kohas, hästi õhutatud lukustatud paigas. Pärast tööd peske kehaosi, kuhu toodet võis sattuda ning vahetage riided.

Informatsioon arstile

Mingite erimeetmete rakendamine ei ole vajalik.

Tühi pakend: Hävitage pakend ja utiliseerige see vastavalt kohalikele seadustele. Pakendit ei tohi mitte mingil juhul muul otstarbel

taaskasutada. Vältige tühjade pakendite sattumist tiikidesse, vooluveekogudesse ja kraavidesse.

Partii number: vaata pakendilt
Parim enne: vaata pakendilt

Loa omanik:

ARMOSA TECH SA
rue des Tuiliers 1 à
B-4480 ENGIS, Belgia
Tel 0032 85 519 519

Biotiid, PT18 (insektitsiid)

MS MADENDOOD, granulės

Paskirtis - 18 produktų tipas. Musių lervoms gyvulininkystės patalpose naikinti. Neskirtas naudoti buitėje ar visuomeninėse patalpose ir kaip augalų apsaugos priemonė.

Veikioji medžiaga- ciromazinas (CAS Nr. 66215-27-8; EB Nr. 266-257-8)- 2 %.

Naudojimas

Skirtas tik profesionaliam naudojimui. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite produkto etiketę, instrukciją ir saugos duomenų lapą.

MS MADENDOOD yra tirpios granulės. 250 g produkto pakanka 1 O m2 mėšlo.

Naudojimo būdai*Galvijų patalpos*

Gilus kraikas: naudoti aplink šėryklas ir girdyklas bei vietas, kuriose kaupiasi mėšlas, ir sudrėkusiose vietose. Veršiamuosi skirtuose narvuose, laikomuose lauke, naudoti visam paviršiui. Naudoti MS MADENDOOD purškiant arba laistant praėjus maždaug 3 dienoms po mėšlo išvalymo, pakartotinai naudoti po kiekvieno mėšlo išvalymo arba pastebėjus atsiradusių musių lervų .

Grotelinės grindys: naudoti visam grindų paviršiui iš kaito po mėšlo surinkimo duobės išvalymo, pakartotinai naudoti po kiekvieno išvalymo arba pastebėjus atsiradusių musių lervų .

Kiaulių patalpos

Srautinės sistemos: geriausia MS MADENDOOD naudoti išbarstant iš karto po valymo ir prieš kiaulių perkėlimą .

Grotelinės grindys: naudoti visam grindų paviršiui iš kaito po mėšlo surinkimo duobės išvalymo, pakartotinai naudoti po kiekvieno išvalymo arba pastebėjus atsiradusių musių lervų .

Gilus kraikas: naudoti MS MADENDOOD purškiant arba laistant praėjus maždaug 3 dienoms po mėšlo pašalinimo, pakartotinai naudoti po kiekvieno išvalymo arba pastebėjus atsiradusių musių lervų .

Paukščių patalpos

Naudoti MS MADENDOOD purškiant ar laistant visą mėšlo paviršių praėjus maždaug savaite nuo mėšlo išvalymo. Pakartotinai naudoti po kiekvieno išvalymo arba pastebėjus atsiradusių musių lervų .

Kitos patalpos

MS MADENDOOD taip pat galima naudoti avitl ir ožkų garduose, triušių fermose, zoologijos soduose, audinių bei lapių fermose tokiu pačiu būdu.

Sausas išbarstymas: naudoti MS MADENDOOD tolygiai paskirstant tiesiogiai musių veisimosi vietose. Naudoti sauso išbarstymo būdą tik esant drėgnam ar skystam mėšlui .

Purškimas: gerai išmaišyti nurodytą MS MADENDOOD kiekį su nurodytame kiekyje vandens.

Purkšti ant musitl lervų veisimosi vietų kompresiniu purkštuvu ar naudojant automatinę purškimo įrangą.

Laistymas: gerai išmaišyti nurodytą MS MADENDOOD kiekį su nurodytame kiekyje vandens.

Tolygiai laistyti musių lervų veisimosi vietas laistytuvu.

Svarbu: MS MADENDOOD yra naudojamas tik musių lervt! veisimosi vietose. Jis nėra skirtas

naudoti musių buvimo vietoms (sienoms, luboms ir kt.) ir neturi jokio poveikio suaugusioms musėms.

Neskirtas naudoti kaip augalų apsaugos priemonė, buitėje ar visuomeninėse patalpose. Būtina užtikrinti, kad produktas nebus pasiektas ir suėstas gyvūnų, nepateks pašarus, ar geriamajį vandenį.

Naudoti tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Naudojimo būdas	Dozė	Naudojimo plotas
Sausas barstymas	500 g produkto	20 m ²
Purški mas	500 g produkto 15 l vandens	20 m ²
Laistymas	500 g produkto 15 l vandens	20 m ²

Naudojimo dažnumas.

Rekomenduojamas naudojimo dažnumas priklauso nuo valdymo ir gyvulių laikymo sistemų, taip pat nuo aplinkos sąlygų. Laikas tarp naudojimų gali trukti nuo 2-3 savaičių iki keleto mėnesių. Gyvūnai gali būti patalpoje naudojimo metu. Įprastai pakanka naudoti kas 6 savaites.

Pirmosios pagalbos priemonės.

Įkvėpus. Užtikrinkite kvėpavimą šviežiu oru. Patekus ant odos, odą nuplaukite švelniu muilu

ir vandeniui.

Patekus į akis. Nedelsiant praskalaukite dideliu kiekiu vandens.

Prarijus kreipkitės medicininės pagalbos (kai įmanoma, parodykite etiketę).

Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel.:+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378. www.tox.lt

Atsargumo frazės

P 102 -Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Pl 03- Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

P270- Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P273- Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P405 -Laikyti užrakintą.

Laikymo sąlygos.

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas vaikams ir gyvūnams neprieinamose vietose, gerai ventiliuojamose užrakintose patalpose. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, vandens ir lietaus.

Atliekų tvarkymas. Neišpilkite likusių mišinių į tvenkinius, upelius ar nuotekų sistemas. Produkto likučius ir jo pakuotę reikia sunaikinti pagal šalies reikalavimus. Šią medžiagą ir jos tarą išmeskite į pavočių ar specialiųjų atliekų konteinerį. Visada laikykite vietinių taisyklių ir reikalavimų.

Autorizacijos liudijimo turėtojas ir gamintojas "ARMOSA TECH SA" Rue des Tuiliers, 1 B-4480 Engis, Belgij

Schippers Export BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos Nr.

LT/ABPV/2021/0194

MS MADENDOOD enthält Cyromazin, ein spezifischer wachstumsregulierender Stoff, der gegen Larven diverser Arten von Fliegen wirkt. Es ist wirkungslos bei erwachsenen Fliegen.

Granulate

Wirkstoff: Cyromazin (CAS 66215-27-8) 20 g/kg

Anwendungsbereich

Jede Stätte, an der Viehzucht betrieben wird: Zerstörung von Fliegen- und Mückenlarven im Dung, in der Gülle und in der Einstreu, sowie in Sickergruben und Vorflutern.

Anwendungsform und Dosierung

Die Dosierung beträgt 250 g MS MADENDOOD auf 10 m² zu behandelnde Fläche. Das Produkt ist gemäß dem Feuchtigkeitsgrad des Dungs anzuwenden:

- Streuen: 250 g auf 10 m² direkt auf die Oberfläche
- Zerstäuben: 250 g auf 10 m² in 1 bis 4 Liter Wasser;
- Gießen: 250 g auf 10 m² in 10 Liter Wasser.

Anwendung alle 6 Wochen wiederholen. Nähere Empfehlungen werden in den folgenden Anwendungsbeispielen gegeben.

Anwendungsbeispiele

MS MADENDOOD kommt in den Bereichen zum Einsatz, in denen sich Fliegenlarven entwickeln, wie:

- in Kuh- und Pferdeställen, einen Streifen von etwa 50 cm Breite entlang der Wände,

seitlich und unter den Ständen mit einer Giesskanne oder einem geeigneten Zerstäuber behandeln.

- Bei Flüssigdung kann das MS MADENDOOD-Granulat direkt angebracht werden. Die erste Behandlung sollte 1 bis 3 Tage nach dem Ausmisten erfolgen.
- in komplett mit Gitterrosten versehenen Kuh- oder Schweineställen: Granulat gleichmäßig auf der gesamten Fläche verteilen. Erste Behandlung nach Leerung der Güllegruben.
- in Schweineställen mit teilweise verlegten Gitterrosten beschränkt sich die Behandlung auf die Flächen, die von den Rosten bedeckt werden, sowie auf die Randbereiche der Futtertröge und der Ruhebereiche.
- in Hühnerställen mit Flüssigentmistung: Granulat direkt anbringen, sobald der Dung feucht oder flüssig ist.
- in Hühnerställen mit Trockenentmistung muss die gesamte Fläche mit Gieß- oder Zerstäubegerät behandelt werden. Die erste Behandlung sollte etwa eine Woche nach dem Ausmisten erfolgen.

Precautions:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht direkt auf Tiere auftragen.

Nur in leeren Stallungen auftragen. In Milchviehbetrieben sind Futter, Tränke, Fütterungssysteme und Melkmaschinen abzudecken.

Außerhalb der Reichweite der Tiere auftragen. Nicht mit Bleichmitteln mischen

Teilentleerte(r) Verpackung der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben. Entleerte(r) Verpackung mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

Lagerung:

Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden, an einem gut belüfteten Ort, kühl und trocken lagern. Für Kinder und Haustiere unzugänglich und getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.

Chargennummer/expiry date: siehe Verpackung

Zulassungsinhaber

ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis, Belgium

Biozid, PT 18 (Insektizid)

Schippers GmbH

Kölner Straße 62
47647 Kerken
Deutschland
Tel: 02833-92360

Registrationsnummer
N-19997

IRELAND

Insecticide for professional use to control the larvae of house fly, lesser house fly and stable fly in animal husbandry situations such as treatment of deep litter/ dung in poultry, pig, dairy, calf, rabbit units, goat sheds, fur farms and stables. Also for the treatment of rubbish bins in the food sector.

2% W/W CYROMAZINE (CAS 66215-27-8) – SOLUBLE GRANULE (SG) FORMULATION

Directions for use: Application schedules

Cattle facilities

Deep litter: treat eggs and spillage areas around feeders and drinkers and where manure accumulates. In calve hutches placed outside, treat the whole surface body. Apply MS MADENDOOD by spraying or watering approximately 3 days after dung removal and repeat treatment after each removal or when fly larvae are found.

Slatted floor: treat entire floor area immediately after cleaning out the dung pit, repeat treatment after each removal or when fly larvae are found.

Swine facilities

All-in, all-out system : Apply MS MADENDOOD preferably by scattering immediately after cleaning and prior to the installation of the pigs.

Slatted floors : treat entire floor area immediately after cleaning out the dung pit, repeat treatment after each removal or when fly larvae are found.

Deep litter : Apply MS MADENDOOD by spraying or watering approximately 3 days after dung removal and repeat treatment after each removal or when fly larvae are found. Treat entire dung surface and wet spot around feeders and drinkers.

Poultry facilities

Apply MS MADENDOOD by spraying or watering in the entire dung area approximately 1 week after manure removal. Repeat treatment after each removal or when

fly larvae are found.

Other units : MS MADENDOOD can also be used in sheep and goat sheds, rabbits farms, zoological gardens. Mink and fox farms in the same manner.

Dry scattering

Apply MS MADENDOOD directly and evenly on the fly breeding sites. Use dry scattering only in case of wet or liquid manure.

Spraying: Thoroughly mix the indicated quantity of MS MADENDOOD with the corresponding volume of water. Apply on fly breeding sites with a knapsack sprayer or with an automatic spray equipment.

IMPORTANT:

MS MADENDOOD is applied only on fly breeding sites. It is not intended for application to fly resting sites (walls, ceilings, etc.) as it has no effect on adult flies. Not to be used on manure intended for the production of mushroom compost.

Applications should be made to moist areas where houseflies are breeding.

In deep pit poultry houses, with vertical multi-tiered cages with automatic scrapers, more effective distribution of MS MADENDOOD can be achieved by applying a series of reduced doses over a period of 3 weeks. Apply 25g MS MADENDOOD dissolved in 1 or more litres of water, 3 times weekly on alternative weekdays for a 21 day period, ie a total of 9 applications in a treatment cycle.

Strains of some fly species are resistant to insecticides. Where flies resistant to products containing cyromazine occur, MAGGTOS GR is unlikely to give satisfactory control. Repeat treatments are likely to result in lower levels of control.

If resistance to MS MADENDOOD is suspected this should be reported to the manufacturer and advice sought on appropriate control measures to help prevent the further development of spread of resistance.

Use MAGGTOS GR as part of an integrated pest management approach, including appropriate non-chemical control measures. Fly populations should be monitored and product applications appropriately

targeted.

This product should not be used continuously against houseflies in intensive applications/refuse/waste treatment. If sustained treatment using an insecticide is required, alternative with products with different active ingredients and a different control method (such as space sprays or baits) as part of a treatment cycle to reduce the risk of resistance developing.

Application	Dose rate	Treated area
Dry scattering	500g	20m ²
Spraying (Directly onto muck)	500g/ 5L of water	20m ²
Spraying (indirectly – through slatted floor units)	500g/ 5L of water	20m ²

Treatment interval

The recommended treatment interval depends on management and housing systems as well as on climatic conditions. It can vary from 2-3 weeks up to several months. Animals can be present during applications. Often, 6 weeks intervals suffice.

Last time of application

Apply a maximum of 25g of product onto manure 21 days prior to spreading onto grass or arable land. Maximum number of treatments must not be exceeded : calf manure/slurry – 6 per year ; pig manure/slurry – 3 per year ; poultry manure slurry – a maximum total dose of 50g of product per square metre of manure/slurry per year.

USE PRECAUTIONS:

- Avoid excessive contamination of coveralls.
- DO NOT CONTAMINATE FOODSTUFFS, EATING UTENSILS OF FOOD CONTACT SURFACES.
- This material and his container must be disposed in a safe way.
- UNPROTECTED PERSONS AND ANIMALS SHOULD BE

KEPT AWAY FROM TREATED AREAS UNTIL SURFACES ARE DRY.

- DO NOT APPLY DIRECTLY TO LIVESTOCK AND POULTRY.
- EXCLUDE ALL PERSONS AND ANIMALS DURING TREATMENT.
- COVER ALL WATER STORAGE TANKS before application.
- HAZARDOUS TO BEES.
- Protect milk machinery and milk containers from contamination.
- WASH HANDS AND EXPOSED SKIN before meals and after use.
- KEEP IN A SAFE PLACE.
- COLLECT EGGS AND REMOVE FEED, EXPOSED WATER AND MILK BEFORE APPLICATION.

STATUTORY CONDITIONS OF APPROVAL RELATING TO USE

FOR USE ONLY AS AN INSECTICIDE FOR USE ONLY BY PROFESSIONAL OPERATORS

Dose: See Section « DIRECTIONS FOR USE » for details on dose rate
READ ALL PRECAUTIONS BEFORE USE.

To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use.

Authorization holder

ARMOSA TECH SA
Rue des Tuilliers 1
4480 Engis – Belgium

USE ONLY IN ACCORDANCE WITH THE DIRECTIONS ON THE LABEL

Biocide, PT 18 (insecticide)

Schippers Export BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Registration number
9657

Aktivna supstanca

20g/kg Ciromazin (N-Ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin, CAS : 66215-27-8)

Insekticid u obliku vodorastvorljivih granula za suzbijanje larvi muva na stajnjacima i drugim mestima gde se životinje čuvaju prskanjem ili polivanjem. Dozvoljno za profesionalno korišćenje i opštu upotrebu.

Pre upotrebe pročitati uputstvo.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ciromazin je regulator rasta insekata. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina

Prskanje:

Snažno promešajte 500g MS LARVAKILL-a sa 5 litara tople (ne vrele) vode i primeniti na površini od 20 m2. Primena na mesta polaganja jaja, piljenja larvi lednom prskalicom.

Zalivanje:

Snažno promešajte 500g MS LARVAKILL-a sa 15 litara tople vode i primeniti na površini od 20 m2.. Primena jednakomernim zalivanjem kantom za zalivanje sa rešetkom po mestima polaganja jaja-piljenja larvi.

VAŽNO UPOZORENJE:

Primena MS LARVAKILL-a je jedino na mestima polaganja jaja-piljenja larvi. Nije namenjen za aplikaciju na mestima sletanja i odmaranja odraslih jedinki-adulta (zidovi, plafoni i sl.), nema efekta na odrasle oblike muva.

Interval tretiranja

Preporučeni interval tretiranja zavisi od vrste i oblika prostorija i njihovog održavanja kao i od klimatskih uslova. Može da varira od prskanja na 2-3 nedelje do

nekoliko meseci .

Vreme tretmana dato je u preporuci ispod teksta.

Preporuka za tretmane

FARME GOVEDA

Duboka legla larvi: Tretirati ivice i prelivne oblasti oko hranilice i pojilice i mesta gde se stajnjak akumulira. Prostorije za telenje, koje su izdvojene, tretirati celu površinu. Nanesite MS LARVAKILL prskanjem ili zalivanjem otprilike 3 dana posle uklanjanja izmeta i ponovite tretman kada god se larve muva spaze.

Pod sa rešetkom - kanalom: Tretirajte celu površinu odmah nakon čišćenja od balege jamu, ponovite tretman kada se larve muva spaze.

FARME SVINJA

Zatvoreni i otvoreni sistemi gajenja:

Nanesite MS LARVAKILL prskanjem ili zalivanjem odmah nakon čišćenja i pre ubacivanja svinja. Podovi sa rešetkom: Tretirajte celu površinu odmah nakon čišćenja od balege takođe i jamu, ponovite tretman kada se larve muva spaze.

Duboka legla larvi: Nanesite MS LARVAKILL prskanjem ili zalivanjem otprilike 3 dana posle uklanjanja izmeta i ponovite tretman kada se larve muva spaze. Tretirajte celu površinu balege i vlažne mrlje oko hranilice i pojilice.

ŽIVINARSKJE FARME:

Nanesite MS LARVAKILL prskanjem ili zalivanjem celu površinu balege oko 1 nedelju dana posle uklanjanja stajnjaka. Ponovite tretman kada se larve muva spaze.

OSTALI OBJEKTI ZA ČUVANJE I DRŽANJE ŽIVOTINJA:

Primena MS LARVAKILL na legla muva 1-3 dana po

opažanju povećanja količine jaja muva.

Drugi tretman izvesti 2 - 3 nedelje iza prvog.

MERE PREDOSTROŽNOSTI - PROČITATI SVE MERE PREDOSTROŽNOSTI PRE UPOTREBE

Bezbedonosna predostrožnost:

- Držati pod ključem i van domašaja dece.
- Držati odvojeno od hrane , pića i hrane za životinje.
- Prilikom primene ne jesti, ne piti i ne pušiti. Zaštiti i pokriti sve posude za hranu i za vodu prilikom primene.
- Ne prskati pribor za hranu ili površine na koje se hrana odlaže. Ne primenjivati direktno na životinje, po stoci ili živini.
- Ne zagađivati vodotokove prilikom primene.
- Po završetku tretmana, oprati izložene delove tela i presvući se u čistu odeću.
- U slučaju kontakta sredstva sa očima, dobro isprati sa puno vode i potražiti pomoć lekara pokazati im ovo uputstvo ili bocu sa etiketom.
- U slučaju kontakta sa kožom, skinuti odmah svu kontaminiranu odeću i oprati se odmah sa dosta vode i sapuna.
- Sa neutrošenim količinama biocidnog proizvoda postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
- Čuvati u originalnoj ambalaži na prohladnom i provetrenom mestu. Nakon upotrebe dobro zatvoriti ambalažu.

Uslovi skladištenja:

- Skladištiti u originalnim dobro zatvorenim posudama, van domašaja dece, životinja u prostoru sa dobrom ventilacijom pod ključem.
- Zaštiti posude od direktnog sunčevog zračenja, vlage i kiše.
- **Odlaganje:**
- Ne prosipati preostalu količinu posle upotrebe u bare, potoke ili u sisteme za zalivanje.
- Isprazniti posude u potpunosti (na za to predviđenom mestu) probušiti i odložiti na bezbedan način.
- Uvek se pridržavati lokalnih propisa i zahteva.

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA, TELEFON (24 sata) 011 3608 440.

Sadržaj: 20 kg

Rok trajanja: 2 godine, ako je pravilno uskladišten i u originalnoj ambalaži

Broj rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Listu biocidnih proizvoda za dostavljanje dosijea:

532-01-280/2021-03 od 15.04.2024

Datum proizvodnje:

Proizvodi

ARMOSA SA

Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis

BELGIJA