

MS MAGGOTS GR

UFI : CSRD-KHV9-AW37-D7WW

24 LV 03

Download app!
Scan this product



2307838

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

Insetticida in granuli solubili per il controllo delle larve di mosche, mosconi e tafani che infestano allevamenti zootecnici ed ambienti civili.

2% W/W CYROMAZINA (CAS 66215-27-8) – GRANULO SOLUBILE (SG)

Istruzioni per l'uso:

MAGGOTS GR è un insetticida in granuli solubili a base di ciromazina, insetticida regolatore della crescita specifico per il controllo delle larve di tutte le specie di mosche. La sua modalità d'azione si esplica interferendo sul ciclo biologico della mosca e provocando di conseguenza la morte delle larve. MAGGOTS GR agisce unicamente sulle larve delle mosche e non sulle forme adulte, quindi deve essere impiegato esclusivamente nei luoghi di possibile riproduzione. Non è inteso per l'applicazione su (pareti, soffitti, ecc), in quanto non ha alcun effetto sulle mosche adulte.

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'impiego di MAGGOTS GR è previsto in tutti gli ambienti zootecnici (stalle, porcilaie, pollai, allevamenti in genere) normalmente frequentati dagli insetti, avendo cura di applicarlo nei luoghi di possibile riproduzione delle mosche (ad es. letamaie, concimaie, lettieri permanenti, depositi di materiali organici). MAGGOTS GR può efficacemente essere impiegato anche in altri luoghi ove esistono substrati idonei allo sviluppo larvale delle mosche (discariche, depositi di scarti alimentari o di lavorazione dei pellami, mezzi destinati alla raccolta o al trasporto di rifiuti urbani). Per uso professionale.

Allevamenti Bovini

Lettiera: Applicare il prodotto trattando i bordi e le aree intorno alle mangiatoie, abbeveratoi e dove si accumulano le deiezioni. Nelle aree di riposo poste all'esterno, trattare l'intero corpo di superficie. Applicare MAGGOTS GR bagnando o spruzzando 3 giorni dopo la rimozione delle deiezioni e ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca.

Pavimento grigliato: Trattare tutta la superficie subito dopo la pulizia della fossa del letame, ripetere il trattamento

dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca.

Allevamenti Suini

Sistema tutto dentro-tutto fuori:

Applicare MAGGOTS GR preferibilmente spargendolo subito dopo la pulizia e prima dell'installazione dei suini.

Pavimento grigliato: Trattare tutta la superficie subito dopo la pulizia della fossa del letame, ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca. **Lettiera:** Applicare MAGGOTS GR bagnando o spruzzando approssimativamente 3 giorni dopo la rimozione del letame e ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca. Trattare tutta la superficie sporca ed i punti umidi intorno a mangiatoie ed abbeveratoi.

Allevamenti di Pollame e specie minori

Applicare MAGGOTS GR bagnando o spruzzando l'intera area contaminata dallo sterco circa una settimana dopo la rimozione del letame. Ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca. Con le medesime modalità MAGGOTS GR può essere utilizzato anche in allevamenti di ovini, caprini, conigli, visoni, volpi ed in giardini zoologici.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Applicazione a secco: Applicare MAGGOTS GR direttamente e in modo uniforme sui luoghi di riproduzione delle mosche. Utilizzare l'applicazione a secco solo in caso di letame umido o liquido.

Applicazione a Spruzzo: Mescolare bene la quantità di MAGGOTS GR indicata con il corrispondente volume di acqua. Applicare sui luoghi di riproduzione delle mosche con uno spruzzatore a spalla o con un'apparecchiatura automatica a spruzzo.

Applicazione per bagnatura: Mescolare bene la quantità di MAGGOTS GR indicata con il corrispondente volume di acqua. Applicare in modo uniforme sui luoghi di riproduzione delle mosche con un annaffiatore.

Importante: MAGGOTS GR ha azione larvicida e si applica solo sui luoghi di riproduzione delle mosche.

Tipo di applicazione	Dose	Area Trattata
A secco	500g	20m ²
A spruzzo	500g/ 5L di acqua	20m ²
Per bagnatura	500g/ 5L di acqua	20m ²

INTERVALLI DI TRATTAMENTO

L'intervallo di trattamento raccomandato dipende dai sistemi di gestione dell'allevamento e dalle condizioni climatiche. L'intervallo tra i trattamenti può variare da 2-3 settimane fino a diversi mesi. Gli animali possono essere presenti durante le applicazioni. Normalmente sono sufficienti intervalli di 6 settimane.

Ultima applicazione: Applicare il prodotto sul letame 21 giorni prima della dispersione su pascoli o terra arabile. **Numero massimo di trattamenti:** letame di bovini 6 trattamenti all'anno; letame di suini 3 trattamenti all'anno; letame del pollame: non superare la dose massima di 50 g di prodotto per metro quadrato di letame all'anno.

ATTENZIONE

La ditta produttrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose che possono derivare da un uso improprio del formulato. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

Precauzioni d'uso: Indossare guanti e indumenti protettivi. Evitare la contaminazione eccessiva degli indumenti. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non impiegare direttamente sugli animali o sul pollame. Allontanare le persone non interessate durante il trattamento. Coprire tutti i serbatoi d'acqua ed abbeveratoi e rimuovere uova, mangimi e latte

prima del trattamento. Conservare in luogo sicuro. Non utilizzare su letame destinato alla produzione di funghi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
Ciromazina pura (CAS: 66215-27-8): 2g
Coformulanti q.b. a 100g.

Indicazioni di pericolo:

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 - Leggere l'etichetta prima dell'uso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P501 - Smaltire il prodotto/ recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione del Ministero della Salute N. 20204

Utilizzare biocidi e pesticidi in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Biocida PT 18 (insetticida)

Titolare dell'autorizzazione:

ARMOSA TECH
Rue des Tuiliers 1
4480 Hermalle-sous-Huy – Belgio

Lotto n° / Data di scadenza:

Schippers Italia Srl.

Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Numero di registrazione:
20204