

2309949

MS Madenkonzentrat

25 kg

Wachstumshemmer zur Bekämpfung von Fliegenlarven im Stall und in der Gülle.

Wirkstoff: Cyromazin

Gehalt: 50 %

Form: Pulver

Anwendungsart: MS Madenkonzentrat kann man Streuen, Gießen oder Sprühen.

Wirkung:

MS Madenkonzentrat ist ein Wachstumshemmer zur Bekämpfung von Fliegenlarven in der Gülle und anderen Brutplätzen. Das Mittel wird von den Larven mit der Nahrung aufgenommen. Die Folge ist eine Entwicklungsstörung der Larven, wobei der Häutungsprozess beeinträchtigt wird. Darum kann eine schnelle Wirkung des Mittels nicht erwartet werden. Das Mittel wird auf die Brutplätze der Fliegen aufgebracht und hat keinerlei Wirkung auf erwachsene Fliegen.

Kälber auf festem Boden mit Stroh:

Fliegenlarven entwickeln sich nicht dort, wo das Stroh durch die Tiere betreten wird. Darum kann der Stall mit einem etwa 50 cm breiten Streifen an den Wänden, um die Futtertröge etc. behandelt werden. Das Mittel sollte bei feuchter Gülle ausgestreut und bei trockenem Mist versprüht oder vergossen werden. **Achtung:** Wenn das Mittel auf trockenen Untergrund gestreut wird, kann es sich nicht genügend ausbreiten und seine Wirkung entfallen.

Schweine und Rindvieh auf Spalten und/oder festem Boden.

Die Spaltenböden durch Spritzen oder Gießen behandeln. Vor allem die Plätze, wo sich Latten oder Rohre an den Mauern befinden sowie, wenn möglich, die Unterseiten der Spalten behandeln. Ein 50 cm breiter Streifen an den Wänden und Futterplätzen sollte ebenfalls behandelt werden.

Geflügelställe (Batterien):

Die gesamte Mistoberfläche muss gleichmäßig behandelt werden. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die erste Verabreichung etwa eine Woche nach dem Ausmisten stattfindet, wobei die Mistlage nicht dicker als 10 cm sein darf. Die zweite Verabreichung sollte dann 14 Tage später folgen. Bei großem Aufkommen kann eine dritte Anwendung notwendig sein. Das Mittel durch Verspritzen oder Vergießen verabreichen.

Anwendungszeiten:

Vorbeugende Anwendungen sollten im Vorjahr oder 2 Tage nach der Säuberung des gesamten Stalls durchgeführt werden, wobei anhängig von der Infektionsmöglichkeit eine zweite und dritte Behandlung in Abständen von 14 Tagen durchgeführt werden kann. Bei Schweinen ist es ratsam, die erste Behandlung kurz vor dem Einbringen der Tiere in die Ställe oder bei erstem Fliegenbefall auszuführen.

Dosierung:

10 g MS Madenkonzentrat pro 10 m². Beim Verspritzen 1-4 Liter und beim Vergießen 10 Liter Wasser mit 10 g MS Madenkonzentrat pro 10 m² mischen.

Sicherheitsvorschriften:

Schädlich für Wasserorganismen (R51).
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut (R36/R37/38).
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S2).
Behälter trocken und dicht geschlossen halten (S7/8).
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten (S13).
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen (S20/21).
Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26).
Geeignete Schutzhandschuhe tragen (S37).
(Einweg-Untersuchungshandschuhe sind ausreichend)

Anmerkungen:

MS Madentodkonzentrat ist sehr leicht wasserlöslich. Da es Feuchtigkeit anzieht, sollte die Verpackung immer gut verschlossen sein und trocken aufbewahrt werden.
Zur Bekämpfung bereits vorhandener und einwandernder erwachsener Fliegen empfiehlt sich, MS Madentodkonzentrat mit einem spezifisch auf erwachsene Fliegen wirkendem Köder wie AVD-90 oder einem Spritzmittel wie MS Superperm zu kombinieren.
Insektizide können in Ihrer Wirksamkeit Schwankungen unterworfen sein, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat, insbesondere bedingt durch Veränderungen der Fliegenpopulationen aufgrund vorangegangener Behandlungen. Der Hersteller garantiert daher nur die spezifikationsgemäße Zusammensetzung dieses Produktes und lehnt jede Verantwortlichkeit für Schäden ab, die auf mangelnde Wirksamkeit, unsachgemäße Lagerung oder Anwendung zurückzuführen sind.

MS Maggot Concentrate

Growth regulator for the control of fly larvae in the stable and in liquid manure.

Active ingredient: Cyromazine

Contents: 50 %

Formulation: Powder

Type of application: MS Maggot Concentrate can be sprinkled, sprayed or poured.

Mode of action:

MS maggot concentrate is a growth inhibitor for the control of fly larvae in liquid manure and other breeding grounds. The product is ingested by the larvae with food. This results in abnormal larval development that affects the moulting process. The product can therefore not be expected to act quickly. The product is applied to the flies' breeding grounds and has no effect whatsoever on adult flies.

Calves on solid floors with straw fly larvae will not develop where animals step on the straw. The stable can therefore be treated by a strip along the walls about 50 cm wide around which feed troughs etc. are treated.

The product should be broadcast on soggy slurry and sprayed or poured on dry dung.

Attention: If the product is sprayed on a dry surface, it cannot spread sufficiently well to develop its activity.

Pigs and cattle on slotted and/or solid floors.

Treat slotted floors by spraying or pouring, especially those areas where slots or pipes are located along the walls. Treat the bottom of the slots as well, if possible. A 50 cm wide strip along the walls and the feeding sites should be treated as well.

Poultry hatches (battery cages):

The entire dung surface must be treated evenly. The best results are achieved by administering the first application about one week after mucking out; the dung layer must be no more than 10 cm thick. The second application should then follow 14 days later. If there is a large emergence, a third application may be necessary. Administer the product by spraying or pouring.

Application times:

Preventive applications should be carried out in the previous year or 2 days after cleaning the entire stable. A second and third treatment can be applied at 14-day intervals depending on the possibility of infection. For pigs, it is advisable to carry out the first treatment shortly before the animals are brought into the stables, or at the first sign of fly infestation.

Dosage:

10 g MS Maggot Concentrate per 10 m². For sprinkling, mix 1-4 litres, and for pouring, mix 10 litres of water with 10 g MS Maggot Concentrate per 10 m².

Safety regulations:

R51: Toxic to aquatic organisms.
R36/37/38: Irritating to eyes, respiratory system and skin.
(S2): Keep out of the reach of children.
S7/8: Keep container tightly closed and dry.
S13: Keep away from food, drink and animal foodstuffs.
S20/21: When using do not eat, drink or smoke.
S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S37: Wear suitable gloves (disposable examination gloves are sufficient).

Notes:

MS Maggot Concentrate is very soluble in water. Since it attracts moisture, the packaging should always be kept well closed and stored dry.
To combat adult flies that are already present and migrating in, it is recommended to combine MS Maggot Concentrate with bait that acts specifically on adult flies such as AVD-90, or a spray agent such as MS Superperm.
Insecticides can be subject to fluctuations in their effectiveness that the manufacturer has no influence on, in particular those that are attributable to changes in the fly population as the result of preceding treatments. The manufacturer therefore only guarantees that the composition of this product is according to specifications and refuses to accept any responsibility for damages resulting from the lack of effectiveness, improper storage or application.

Passion for Farming

MS Agro Pest Control



MS Schippers



Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel.: 0 28 33-92 36 0

Baua Reg.nr N-25890



Schippers Export BV
Rond Deel 12
5531 AH Bladel
The Netherlands
Tel.: +31(0)497-339774