

DE: Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise:

Achtung!
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen Vorschriften zuführen.

Anmerkungen

MS Madentodkonzentrat ist sehr leicht wasserlöslich. Da es Feuchtigkeit anzieht, sollte die Verpackung immer gut verschlossen sein und trocken aufbewahrt werden. Zur Bekämpfung bereits vorhandener und einwandernder erwachsener Fliegen empfiehlt sich, MS Madentodkonzentrat mit einem spezifisch auf erwachsene Fliegen wirkendem Köder zu kombinieren. Insektizide können in Ihrer Wirksamkeit Schwankungen unterworfen sein, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat, insbesondere bedingt durch Veränderungen der Fliegenpopulationen aufgrund vorangegangener Behandlungen. Der Hersteller garantiert daher nur die spezifikationsgemäße Zusammensetzung dieses Produktes und lehnt jede Verantwortlichkeit für Schäden ab, die auf mangelnde Wirksamkeit, unsachgemäße Lagerung oder Anwendung zurückzuführen sind.

DE: Wachstumshemmer zur Bekämpfung von Fliegenlarven im Stall und in der Gülle.

Wirkstoff: Cyromazin Gehalt: 50 % (CAS 66215-27-8)

Form: Pulver
Anwendungsart: MS Madenkonzentrat kann man Streuen, Gießen oder Sprühen.

Wirkung: MS Madenkonzentrat ist ein Wachstumshemmer zur Bekämpfung von Fliegenlarven in der Gülle und anderen Brutplätzen. Das Mittel wird von den Larven mit der Nahrung aufgenommen. Die Folge ist eine Entwicklungsstörung der Larven, wobei der Häutungsprozess beeinträchtigt wird. Darum kann eine schnelle Wirkung des Mittels nicht erwartet werden. Das Mittel wird auf die Brutplätze der Fliegen aufgebracht und hat keinerlei Wirkung auf erwachsene Fliegen.

Kälber auf festem Boden mit Stroh: Fliegenlarven entwickeln sich nicht dort, wo das Stroh durch die Tiere betreten wird. Darum kann der Stall mit einem etwa 50 cm breiten Streifen an den Wänden, um die Futtertröge etc. behandelt werden. Das Mittel sollte bei feuchter Gülle ausgestreut und bei trockenem Mist versprüht oder vergossen werden. Achtung: Wenn das Mittel auf trockenen Untergrund gestreut wird, kann es sich nicht genügend ausbreiten und seine Wirkung entfalten.

Schweine und Rindvieh auf Spalten und/oder festem Boden: Die Spaltenböden durch Spritzen oder Gießen behandeln. Vor allem die Plätze, wo sich Latten oder Rohre an den Mauern befinden sowie, wenn möglich, die Unterseiten der Spalten behandeln. Ein 50 cm breiter Streifen an den Wänden und Futterplätzen sollte ebenfalls behandelt werden.

Geflügelställe: Die gesamte Mistoberfläche muss gleichmäßig behandelt werden. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die erste Verabreichung etwa eine Woche nach dem Ausmisten stattfindet, wobei die Mistlage nicht dicker als 10 cm

zung dieses Produktes und lehnt jede Verantwortlichkeit für Schäden ab, die auf mangelnde Wirksamkeit, unsachgemäße Lagerung oder Anwendung zurückzuführen sind.

sein darf. Die zweite Verabreichung sollte dann 14 Tage später folgen. Bei großem Aufkommen kann eine dritte Anwendung notwendig sein. Das Mittel durch Verspritzen oder Vergießen verabreichen.

Anwendungszeiten Vorbeugende Anwendungen sollten im Vorjahr oder 2 Tage nach der Säuberung des gesamten Stalls durchgeführt werden, wobei anhängig von der Infektionsmöglichkeit eine zweite und dritte Behandlung in Abständen von 14 Tagen durchgeführt werden kann. Bei Schweinen ist es ratsam, die erste Behandlung kurz vor dem Einbringen der Tiere in die Ställe oder bei erstem Fliegenbefall auszuführen.

Dosierung 10 g MS Madenkonzentrat pro 10 m². Beim Verspritzen 1-4 Liter und beim Vergießen 10 Liter Wasser mit 10 g MS Madenkonzentrat pro 10 m² mischen.

Anmerkungen

MS Madentodkonzentrat ist sehr leicht wasserlöslich. Da es Feuchtigkeit anzieht, sollte die Verpackung immer gut verschlossen sein und trocken aufbewahrt werden. Zur Bekämpfung bereits vorhandener und einwandernder erwachsener Fliegen empfiehlt sich, MS Madentodkonzentrat mit einem spezifisch auf erwachsene Fliegen wirkendem Köder zu kombinieren. Insektizide können in Ihrer Wirksamkeit Schwankungen unterworfen sein, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat, insbesondere bedingt durch Veränderungen der Fliegenpopulationen aufgrund vorangegangener Behandlungen. Der Hersteller garantiert daher nur die spezifikationsgemäße Zusammensetzung dieses Produktes und lehnt jede Verantwortlichkeit für Schäden ab, die auf mangelnde Wirksamkeit, unsachgemäße Lagerung oder Anwendung zurückzuführen sind.

EN: Growth inhibitor for the prevention of fly maggots in the stable and in the slurry.

Active agent: Cyromazine Content: 50% (CAS 66215-27-8)
Form: Powder

EN: Hazard and precautionary statements:

Warning!
H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects. P273 - Avoid release to the environment. P391 - Collect spillage. P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local regulation.

Notes

MS Maggot Concentrate is highly water soluble. Since the product is hygroscopic, the package should always be kept well closed and stored in a dry place. In order to combat pre-existing and immigrating adult flies, it is recommended to combine MS Maggot Concentrate with bait acting specifically on adult flies. The potency of insecticides may vary. The manufacturer has no influence on their efficacy, which depends especially on changes of the fly population due to previous treatments. Thus, the manufacturer guarantees only the composition of this product in accordance with the specifications and cannot be held liable for any damages due to lack of efficacy resp. inappropriate storage or application.

Type of application: MS Maggot Concentrate may be sprinkled, poured, or sprayed.

Effect: MS Maggot Concentrate is a growth inhibitor for fly maggots in the slurry and at other breeding sites. It is ingested by the larvae together with the food, disrupting the development of the larval stages and affecting the molting process. Thus, this agent cannot be expected to act very rapidly. The product is applied to the breeding sites of the flies and does not affect adult flies.

Calves on straw-covered solid floors: Fly larvae do not develop wherever the animals are walking on the straw. Thus, the stable may be treated with a 50cm wide strip along the walls, around the feeding troughs etc. The product should be sprinkled onto moist slurry and sprayed or poured onto dry muck. Attention: If the product is sprinkled onto a dry substrate, it cannot spread sufficiently and will not take full effect.

Pigs and cattle on slatted flooring and/or solid flooring.

Slatted floors are to be treated by spraying or pouring. All points where slats or pipes are attached to the walls, as well as the undersides of the slats - if possible - should be treated particularly thoroughly. A 50cm wide section along the walls and the feeding locations should be treated as well.

Poultry houses: The entire muck surface ought to be treated evenly. The best results were obtained if the product was first applied about a week after mucking out the stables; the muck layer may be up to 10cm thick. The second application should be 14 days later. In case of heavy infestation, a third application may be required. Apply the product by spraying or pouring it onto the substrate.

Application times: Preventive treatments should be performed in the spring or 2 days after cleaning the entire stable. A second and third treatment may be performed at 14-day intervals, depending on the infection risk. With pigs, it is advisable



2309955

**Achtung
Warning**

to schedule the first treatment just before bringing the animals into the stables or at first appearance of flies.

Dosage: 10g MS Maggot Concentrate per 10m². In case of spray application, mix 1-4 litres of water and when pouring, mix 10 litres of water with 10g MS Maggot Concentrate per 10m².

Notes

MS Maggot Concentrate is highly water soluble. Since the product is hygroscopic, the package should always be kept well closed and stored in a dry place. In order to combat pre-existing and immigrating adult flies, it is recommended to combine MS Maggot Concentrate with bait acting specifically on adult flies. The potency of insecticides may vary. The manufacturer has no influence on their efficacy, which depends especially on changes of the fly population due to previous treatments. Thus, the manufacturer guarantees only the composition of this product in accordance with the specifications and cannot be held liable for any damages due to lack of efficacy resp. inappropriate storage or application.

22 LV 06

