

2309980

MS MADENDOOD

MS LARVAKILL

Made in Belgium

UFI : CSRD-KHV9-AW37-D7WW

26 LV 07

Download app!
Scan this product



2309980

MS Schippers

Scan QR Code
for manual



2% W/W CYROMAZINE – SOLUBLE GRA-NULE (SG) FORMULATION
Insecticide for professional use to control the larvae of house flies and stable flies in animal husbandry situations and fly breeding sites such as treatment of deep litter/ dung in dairy, beef cattle excluding veal calves and poultry.

H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P273: Avoid release to the environment.
P501: Dispose of container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulations.

Authorisation holder: Armosa Tech, Rue Des Tuilliers 1, B-4480 Engis, BELGIUM.
Marketing company: Lodi UK Limited, Unit 104, Potter Space, 7 Kidderminster Road, Cutnall Green, Droitwich, WR9 0N6
Tel: 01384 404242 E-mail: sales@lodi-uk.com www.lodi-uk.com. User category: For professional use. Field of use: Indoor use. The product is intended to be applied on surfaces in stables for dairy cattle, beef

cattle excluding veal calves, and poultry.
Application method: Dry scattering, Watering, Spraying. Dry scattering: The product is directly and evenly applied on fly breeding sites. This method of application is only used in case of wet or liquid manure and can therefore not be used in poultry farms.
Watering: The product is firstly mixed with water. It is then applied afterwards by watering on fly breeding site with a watering can. Spraying: The product is first mixed with water. It is then applied afterwards on fly breeding site with a knapsack sprayer. Target organism: Musca domestica (house fly), larvae, Stomoxys calcitrans (stable fly) larvae

Application rate & amp; frequency: Application Rate: 25 g/m² Number and timing of application: The recommended treatment interval depends on management and housing systems as well as on climatic conditions. It can vary from 2-3 weeks up to several months. Often, 6 weeks intervals will suffice.
The observed effect of the treatments will not be immediately due to working mechanism of the product.

The maximum number of treatments must not be exceeded:
• Dairy cattle: 4 treatments per year
• Beef cattle excluding veal calves: 4 treatments per year
• Poultry (chickens): 1 treatment per year
• Poultry (ducks, geese, and turkeys): 4 treatments per year
The application rate is the same for all application methods: 25 grams of product per m². However, depending on the treatment, dilution may be required before the application.

Applica-tion	Dilution	No dilution
Dry scattering	No dilution	250g product/ 10m 2
Spraying	250g product /2.5 L water	2.5L solu-tion/ 10m 2
Watering	250g product /7.5 L water	7.5L solu-tion/ 10m 2

Instructions for use,risk mitigation measures and storage conditions: see enclosed leaflet.

Use biocides safely and sustainably. It is illegal to use this product for uses or in a manner other than that prescribed on the label and leaflet. For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin (01 8092166), retain the label for reference
Net weight: 10kg/20kg
Batch number: See packaging
Expiry date: See packaging
UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WWv

Categorías de usuario: profesional, profesional especializado

Campo de uso

Uso en interiores. El producto está destinado a aplicarse en superficies de establos para vacas lecheras, vacuno de carne y aves de corral

Organismos diana:

- mosca común (Musca domestica)
- mosca de establos (Stomoxys calcitrans)

Método de aplicación:

- Esparcimiento en seco: el producto se aplica directa y uniformemente sobre los sitios de reproducción de moscas. Este método de aplicación solo se utiliza en caso de estiércol húmedo o líquido y, por lo tanto, no puede utilizarse en granjas avícolas.
- Riego: el producto se mezcla primero con agua. Después se aplica sobre los sitios de reproducción de moscas mediante riego con una regadera.
- Pulverización: el producto se mezcla primero con agua. Después se aplica sobre los sitios de reproducción de moscas con un pulverizador de mochila.

Dosis y frecuencias de aplicación:

Tasa de aplicación: 25g/m²

Número y frecuencia de aplicación:

El intervalo de tratamiento recomendado depende de los sistemas de gestión y alojamiento, así como de las condiciones climáticas. Puede variar de 2 – 3 semanas a varios meses. A menudo, bastará con intervalos de 6 semanas.

El efecto observado de los tratamientos no será inmediato debido al mecanismo de funcionamiento del producto. No debe superarse el número máximo de tratamientos:

- Ganado lechero: 4 tratamientos al año.
- Vacuno de carne, excluidos los terneros: 4 tratamientos al año.
- Aves de corral (pollos): 1 tratamiento al año.
- Aves de corral (patos, ocas y pavos): 4 tratamientos al año.

La dosis de aplicación es la misma para todos los métodos de aplicación: 25 gramos de producto por m². Sin embargo, dependiendo del tratamiento, puede que sea necesaria una dilución antes de la aplicación.

Descripción detallada:

- Esparcimiento en seco: El producto se aplica directa y uniformemente sobre los sitios de reproducción de moscas. Este método de aplicación solo se utiliza en caso de estiércol húmedo o líquido y, por lo tanto, no puede utilizarse en granjas avícolas.

Dilución: sin dilución. Dosis: 250 g de producto / 10 m².

- Riego: El producto se mezcla primero con agua. Después se aplica sobre los sitios de reproducción de moscas mediante riego con una regadera.

Dilución: 250 g de producto / 7,5 L de agua. Dosis: 7,5 L de disolución / 10 m².

- Pulverización : El producto se mezcla primero con agua.

Dilución: 250 g de producto / 2,5 L de agua. Dosis: 2,5 L de disolución / 10 m².

Instrucciones de uso, medidas de reducción de riesgos y condiciones de conservación: consulte el prospecto adjunto».

Clasificación del producto

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Número de teléfono de información toxicológica: +34 91 562 04 20

Sustancia activa:

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (Cyromazine) (CAS No. 66215-27-8) 2,02 % (m/m)

Biocida,PT18: Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Tipo de formulación: SG Granulado soluble en agua

Titular de la autorización:

ARMOSA TECH SA

Rue des Tuilliers, 1 4480 Engis Bélgica

Catégorie d'utilisateurs : Professionnels

Domaine d'utilisation: Produit destiné à être appliqué sur les surfaces dans les étables pour bovins, vaches laitières et volailles

Cibles: Musca domestica (mouche domestiques) : Larves Stomoxys calcitrans (mouche d'étable) : Larves

Méthodes d'application:

Utilisation en intérieur.

- Traitement de surface par pulvérisation Le produit est d'abord dissout dans l'eau, puis est appliqué sur le site de reproduction des mouches à l'aide d'un pulvérisateur à dos.
- Traitement de surface par arrosage Le produit est d'abord dissout dans l'eau, puis est appliqué sur le site de reproduction des mouches à l'aide d'un arrosoir.
- Traitement de surface par épandage à sec Le produit est appliqué directement et uniformément sur les sites de reproduction des mouches. Cette méthode d'application n'est utilisée qu'en cas de fumier humide ou liquide/lisier et ne peut donc pas être utilisée dans les élevages de volailles.

Dose:

Dose d'application: 25 g/m². L'intervalle de traitement recommandé dépend des pratiques de gestion, des locaux d'élevage L'intervalle de traitement recommandé dépend des systèmes de gestion et des systèmes de logement, ainsi que des conditions climatiques. Il peut varier de 2-3 semaines à plusieurs mois. Souvent, des intervalles de 6 semaines suffisent.

L'effet des traitements ne sera pas immédiat en raison du mode d'action du produit. Le nombre maximal de traitements ne doit pas dépasser :

- Vaches laitières : 4 traitements par an
- Bovins pour boucherie (à l'exclusion des veaux) : 4 traitements par an
- Volailles (poulets) : 1 traitement par an
- Volailles (canards, oies et dindes) : 4 traitements par an

La dose d'application est identique pour toutes les méthodes d'application : 25 g/m². Cependant, en fonction du traitement, une dilution pourrait être nécessaire avant l'application.

Méthode d'appli-cation	Dilution	Taux de dose
Épanda-ge à sec	Pas de dilution	250 g produit /10 m²
Pulvérisa-tion	250 g de produit /2,5 l d'eau	2,5 l de solution /10 m²
Arrosage	250 g de produit /7,5 l d'eau	7,5 l de solution /10 m²

Instructions d'utilisation, Précautions pour une utilisation en toute sécurité, instructions de premiers secours, instructions en vue d'une élimination du produit et de son emballage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide : Voir notice incluse.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P501: Éliminer le contenu/récipient, conformément à la réglementation.

Substance active : Cyromazine (CAS : 66215-27-8) 2% (m/m)
Type de produit : TP18 (Insecticide)
Type de formulation : SG (Granulé soluble dans l'eau)

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW
Anti-poison N°Tel : + 33 (0)1 45 42 59 59
Détenant de l'autorisation : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers 1, 4480, Engis - Belgique

FR- Insecticide contre les larves de mouches.

Le produit est destiné à être appliqué sur les surfaces d'étables pour bovins laitiers, bovins de boucherie à l'exclusion des veaux de boucherie, et volailles.

Organismes cibles:

- mouche domestique (*Musca domestica*)
- mouche d'étable (*Stomoxys calcitrans*)

Mode d'application:

250 g de Madendood suffisent pour 10 m² de surface à traiter. Le produit peut être appliqué de différentes manières selon le degré d'humidité des déjections.

- Épandage à sec : Le produit est appliqué directement (250 g produit /10 m² sans dilution)et uniformément sur les sites de reproduction des mouches. Cette méthode d'application n'est utilisée qu'en cas de fumier humide ou liquide et ne peut donc pas être utilisée dans les élevages de volailles.
- Arrosage : Le produit est d'abord mélangé avec de l'eau (250 g de produit dans 7,5 litres pour 10 m²). Il est ensuite appliqué en arrosant le site de reproduction des mouches à l'aide d'un arrosoir.
- Pulvérisation : Le produit est d'abord mélangé avec de l'eau (250 g de produit dans

2,5 litres pour 10 m²). Il est ensuite appliqué sur le site de reproduction des mouches à l'aide d'un pulvérisateur à dos.

Taux et fréquence d'applications:

Taux d'application: 25 g/m²

L'intervalle de traitement recommandé dépend des pratiques de gestion, des locaux d'élevage ainsi que des conditions climatiques. Il peut varier de 2 à 3 semaines à plusieurs mois. Des intervalles de 6 semaines seront souvent suffisants.

L'effet observé des traitements ne sera pas immédiat en raison du mécanisme d'action du produit.

Le nombre maximum de traitements ne doit pas être dépassé.

- Bovins laitiers : 4 traitements par an
- Bovins de boucherie à l'exclusion des veaux de boucherie : 4 traitements par an
- Volaille (poulets) : 1 traitement par an
- Volaille (canards, oies et dindes) : 4 traitements par an

Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Éliminer les matériaux ou les résidus solides conformément aux législations nationales. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des condi-

ons normales de stockage

- Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- Conserver le récipient fermé hors utilisation.
- Stocker dans un endroit sec et bien ventilé.
- Stocker à l'abri de la lumière.
- Durée de conservation : 5 ans.

ARMOSA TECH SA: Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgique
Biocide TP18 / PT18 : Insecticides
Type de formulation : SG Granulé soluble dans l'eau

Catégories d'utilisateur : professionnels

Substance active:

Cyromazine / N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (CAS No. 66215-27-8)
2,02 % (p/p)

UFI : CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Mentions de danger: H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence: P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P501: Éliminer le récipient et le contenu conformément à la réglementation régionale/nationale.

Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501: Behälter Übereinstimmung mit regionalen/ nationalen Vorschriften zuführen, Inhalt Übereinstimmung mit regionalen/ nationalen Vorschriften zuführen.

CENTRE ANTI-POISON / ANTIGIFCENTRUM: +32 70 245 245

CENTRE ANTIPOISON depuis le Luxembourg 8002 5500

nationalen Vorschriften zuführen.

CENTRE ANTI-POISON / ANTIGIFCENTRUM: +32 70 245 245

CENTRE ANTIPOISON depuis le Luxembourg 8002 5500

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Consignes d'utilisation, mesure de gestion des risques, indications relatives aux effets direct ou indirects, instructions de premiers secours et mesure pour protéger l'environnement : voir notice incluse

Schippers BV

Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Numéro d'autorisation
BE2025-0019

Centre antipoisons / Antigifcentrum : 070 245 245

Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder :
ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 14480 Engis

NL- Insecticide tegen vliegenlarven

Het product is bedoeld voor toepassing op oppervlakken in stallen voor melkvee, slachtvee met uitzondering van vleeskalveren, en pluimvee.

Doelorganismen:

- huisvlieg (*Musca domestica*)
- stalvlieg (*Stomoxys calcitrans*)

Toepassingsmethode:

250 g Madendood per 10 m² te behandelen oppervlakte. De toepassingswijze kan aangepast worden naargelang de droogtegraad van de uitwerpselen.

- Droog strooien (geen verdunning 250 g product/10 m²): Het product wordt rechtstreeks en gelijkmatig aangebracht op broedplaatsen van vliegen. Deze toepassingsmethode wordt alleen gebruikt in het geval van natte of vloeibare mest en kan daarom niet worden gebruikt in pluimveebedrijven.
- Gieten: Het product wordt eerst gemengd met water (250 g product in 7,5 liter voor 10 m²): Daarna wordt het toegepast door de broedplaats van vliegen te bewateren met een gieter.
- Spuiten: Het product wordt eerst gemengd met water (250 g product in 2,5 liter voor 10

m²): Daarna wordt het op de broedplaats van vliegen toegepast met een rugspruit.

Toepassingshoeveelheid en frequentie:

Dosering: 25 g/m²

Het aanbevolen behandelingsinterval hangt af van de beheers- en huisvestingssystemen en de klimaatomstandigheden. Dit kan variëren van 2-3 weken tot enkele maanden. Vaak zijn intervallen van 6 weken voldoende. Het waargenomen effect van de behandelingen zal niet onmiddellijk zijn vanwege het werkingsmechanisme van het product. Het maximumaantal behandelingen mag niet worden overschreden:

- Melkvee: 4 behandelingen per jaar
- Slachtvee, met uitzondering van vleeskalveren: 4 behandelingen per jaar
- Pluimvee (kippen): 1 behandeling per jaar
- Pluimvee (eenden, ganzen en kalkoenen): 4 behandelingen per jaar

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Materialen of vaste residuen afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpak-

king bewaren.

- Houder gesloten houden indien hij niet wordt gebruikt.
- Op een goed geventileerde en droge plaats bewaren.
- In het donker bewaren.
- Houdbaarheid 5 jaar.

ARMOSA TECH SA: Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgique
Biocide TP18 / PT18 : Insecticides
Formuleringstype: SG Wateroplosbaar granulaat

Gebruikerscategorieën: professionele gebruiker

Werkzame stof:

Cyromazine / N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (CAS No. 66215-27-8)
2,02 % (p/p)
UFI : CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Gevarenaanduidingen: H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen: P273: Voorkom lozing in het milieu. P501: Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met regionale,/nationale regelgeving.
Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für

Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501: Behälter Übereinstimmung mit regionalen/ nationalen Vorschriften zuführen, Inhalt Übereinstimmung mit regionalen/ nationalen Vorschriften zuführen.
CENTRE ANTI-POISON / ANTIGIFCENTRUM: +32 70 245 245
CENTRE ANTIPOISON depuis le Luxembourg 8002 5500

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Gebruiksaanwijzing, risicobeperken de maatregelen, bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen: zie bijgevoegde bijsluiter

CH - Catégorie d'utilisateurs : Professionnels

Domaine d'utilisation: Produit destiné à être appliqué sur les surfaces dans les étables pour bovins, vaches laitières et volailles
Cibles: Musca domestica (mouche domestiques) : Larves Stomoxys calcitrans (mouche d'étable) : Larves

Méthodes d'application:

Utilisation en intérieur.

- Traitement de surface par pulvérisation Le produit est d'abord dissout dans l'eau, puis est appliqué sur le site de reproduction des mouches à l'aide d'un pulvérisateur à dos.
- Traitement de surface par arrosage Le produit est d'abord dissout dans l'eau, puis est appliqué sur le site de reproduction des mouches à l'aide d'un arrosoir.
- Traitement de surface par épandage à sec Le produit est appliqué directement et uniformément sur les sites de reproduction des mouches. Cette méthode d'application n'est utilisée qu'en cas de fumier humide ou liquide/lisier et ne peut donc pas être utilisée dans les élevages de volailles.

Dose:

Dose d'application: 25 g/m². L'intervalle de traitement recommandé dépend des pratiques de gestion, des locaux d'élevage

L'intervalle de traitement recommandé dépend des systèmes de gestion et des systèmes de logement, ainsi que des conditions climatiques. Il peut varier de 2-3 semaines à plusieurs mois. Souvent, des intervalles de 6 semaines suffisent.

L'effet des traitements ne sera pas immédiat en raison du mode d'action du produit. Le nombre maximal de traitements ne doit pas dépasser :

- Vaches laitières : 4 traitements par an
- Bovins pour boucherie (à l'exclusion des veaux) : 4 traitements par an
- Volailles (poulets) : 1 traitement par an
- Volailles (canards, oies et dindes) : 4 traitements par an

La dose d'application est identique pour toutes les méthodes d'application : 25 g/m². Cependant, en fonction du traitement, une dilution pourrait être nécessaire avant l'application.

Méthode d'application	Dilution	Taux de dose
Épandage à sec	Pas de dilution	250 g produit /10 m ²
Pulvérisation	250 g de produit /2,5 l d'eau	2,5 l de solution /10 m ²
Arrosage	250 g de produit /7,5 l d'eau	7,5 l de solution /10 m ²

Instructions d'utilisation, Précautions pour une utilisation en toute sécurité, instructions de premiers secours, instructions en vue d'une élimination du produit et de son emballage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide : Voir notice incluse.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P501: Éliminer le contenu/récipient, conformément à la réglementation.

Substance active : Cyromazine (CAS : 66215-27-8) 2% (m/m)

Type de produit : TP18 (Insecticide)
Type de formulation : SG (Granulé soluble dans l'eau)

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

TOX INFO SUISSE: Tel. Nr. 145.

Détenteur de l'autorisation : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480, Engis - Belgique

DE - Anwenderkategorie: Berufsmäßige Verwender

Anwendungsbereich

Das Produkt ist für die Anwendung auf Oberflächen in Ställen für Milchvieh, Fleischrinder (ausgenommen Kälber) und Geflügel bestimmt.

Zielorganismen:

- Stubenfliege (*Musca domestica*)
- Wadenstecher (*Stomoxys calcitrans*)

Anwendungsmethode:

- **Trockenstreuung:** Das Produkt wird direkt und gleichmäßig auf die Fliegenbrutstätten aufgetragen. Diese Ausbringungsmethode wird nur bei Nass- oder Flüssigdung angewendet und kann daher nicht in Geflügelbetrieben verwendet werden.
- **Gießen:** Das Produkt wird zunächst mit Wasser gemischt. Anschließend wird es durch Gießen mit einer Gießkanne auf die Fliegenbrutstätten aufgebracht.
- **Sprühen:** Das Produkt wird zunächst mit Wasser gemischt. Anschließend wird es mit einer Rückenspritze auf die Fliegenbrutstätten aufgebracht.

Anwendungsmenge und Häufigkeit:

Anwendungsrate(n) und Häufigkeit Aufwandmenge: 25 g/m² Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Das empfohlene Behandlungsintervall hängt von den Management- und Haltungssystemen sowie von den klimatischen Bedingungen ab. Es kann von 2-3 Wochen bis zu mehreren Monaten variieren. Oft reicht ein Intervall von 6 Wochen aus. Die beobachtete Wirkung der Behandlungen wird aufgrund des Wirkmechanismus des Produkts nicht unmittelbar sein.

Die maximale Anzahl der Behandlungen darf nicht überschritten werden:

- Milchvieh: 4 Behandlungen pro Jahr
- Fleischrinder (ausgenommen Kälber): 4 Behandlungen pro Jahr
- Geflügel (Hühner): 1 Behandlung pro Jahr
- Geflügel (Enten, Gänse und Truthähne): 4 Behandlungen pro Jahr

Die Ausbringungsmenge ist für alle Anwendungsmethoden gleich: 25 Gramm des Produkts pro m². Abhängig von der Behandlung kann jedoch eine Verdünnung vor der Anwendung erforderlich sein.

Anwendungs-methode	Verdün-nung	Dosierung
Trocken-streuung	Keine Ver-dünnung	250 g Produkt /10 m ²
Sprühen	250 g Produkt/ 2,5 l Wasser	2,5 l Lösung /10 m ²
Gießen	250 g Produkt/ 7,5 l Wasser	7,5 l Lösung /10 m ²

Gebrauchsanweisung, Risikominderungsmaßnahmen, Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer, Erste-Hilfe-Anweisungen: : siehe beiliegende Gebrauchsanweisung

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501: Behälter/Inhalt Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

TOX INFO SUISSE: Tel. Nr. 145.

Wirkstoff: Cyromazine (CAS No. 66215-27-8) 2,02 % (w/w)

Biozid, PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Formulierungstyp: SG Wasserlösliches Granulat

Zulassungsinhaber:

ARMOSA TECH SA

Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien

Kasutajakategooriad: kutselised kasutajad
Kasutusala
kasutamine sisetingimustes

Toode on ette nähtud kasutamiseks piima-
karja, lihaveiste (v.a vasikate) ja kodulin-
dude lautade pindadel.

Sihtorganismid:

- toakärbes (Musca domestica)
- pistekärbsed (Stomoxys calcitrans)

Pealekandmismeetod:

- Kuivalt laiali puistamine: Toode kantakse otse ja ühtlaselt kärbeste pesitsuspaika-
dele. Seda kasutusviisi rakendatakse ainult
märja sõnniku või virtsa puhul ja seetõttu
ei saa seda kasutada linnufarmis.
- Kastmine: Toode segatakse esmalt veega.
Seejärel kanda peale kärbeste pesitsus-
paiga kastmise teel kastekannuga.
- Pritsimine: Toode segatakse esmalt
veega. Seejärel kanda see kärbeste pesits-
uspaika seljas kantava pritsiga.

Kasutusmäärad ja sagedus: Kasutusmäär:
25 g/m² Kasutamise arv ja ajastus: Soovi-
tatav töötlemisintervall sõltub nii haldus-ja
hoonesüsteemidest kui ka kliimatingimus-
test. See võib varieeruda 2–3 nädalast kuni

mitme kuuni. Sageli piisab 6-nädalastest
intervallidest. Töötluse mõju ei ole toote
toimemehhanismi tõttu kohe ilmne.

Töötluste maksimaalset arvu ei tohi
ületada:

- Piimakari: 4 töötlust aastas
- Lihaveised, välja arvatud vasikad: 4 tööt-
lust aastas
- Kodulinnud (kanad): 1 töötlus aastas
- Kodulinnud (pardid, haned ja kalkunid): 4
töötlust aastas

Kasutusmäär on kõikide kasutusviiside
puhul sama: 25 grammi toodet m² kohta.
Sõltuvalt töötlemisviisist võib siiski enne
pealekandmist olla vajalik lahjendamine.

Kasutus- meetod	Lahjen- damine	Annuse määr
Kuivalt laiali puistamine	Ei lahjen- data	250 g toode / 10 m ²
Pritsimine	250 g toode / 2,5 l vesi	2,5 l lahust / 10 m ²
Kastmine	250 g toode / 7,5 l vesi	7,5 l lahust / 10 m ²

**Kasutusjuhised,
Riskijuhtimismismeetmed,Esmaabi
juhised, Keskkonnakaitse meetmed : vt
kaasasolevat juhendit**

Ohtudeklaratsioonid
H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaaja-
line toime.
Tööohutuskäsud
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P501: Kõrvaldada mahuti/sisu kooskõlas
kohaldatavate kohalike eeskirjadega
ohtlike jäätmete
kogumiskohta.
UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW
Mürgistusteabekeskus: 16662

Aktiivne aine:
Tsüromasiin (CAS No. 66215-27-8) 2,02
massiprotsent
Biotsiidi,PT18: Insektitsiidid
Formulatsiooni tüüp: SG Vees lahustuv
graanul
Lubade omanik:
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgia

Naudotojų kategorija: profesionalus naudojimas Naudojimo sritis
 Produktas skirtas naudoti pieninių galvijų, mėsinių galvijų, išskyrus veršelius, ir naminių paukščių tvartuose.

Tiksliniai organizmai:

- naminė musė (*Musca domestica*)
- tikrosios musės (*Stomoxys calcitrans*)

Panaudojimo būdas:

- Sausas barstymas: Produktas tiesiogiai ir tolygiai naudojamas ant musių veisimosi vietų. Šis naudojimo būdas taikomas tik drėgnam arba skystam mėšlui, todėl jo negalima naudoti paukštininkystės ūkiuose.
- Laistymas: Pirmiausia produktas sumaišomas su vandeniu. Vėliau jis naudojamas laistytuvu laistant musių veisimosi vietą.
- Purškimas: Pirmiausia produktas sumaišomas su vandeniu. Po to jis purškiamas musių veisimosi vietoje kuprininiu purkštuvu.

Tinkami kiekiai ir dažnis:

Naudojimo kiekis: 25 g/m²

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Rekomenduojamas apdorojimo intervalas priklauso nuo valdymo ir laikymo sistemų bei klimato sąlygų. Jis gali trukti nuo 2–3

savaičių iki kelių mėnesių. Dažnai pakanka 6 savaičių intervalų. Dėl produkto veikimo mechanizmo pastebėtas apdorojimo poveikis pasireiškė ne iš karto.

Negalima viršyti maksimalaus apdorojimų skaičiaus:

- Pieniniai galvijai: 4 apdorojimai per metus
- Mėsiniai galvijai, išskyrus veršelius: 4 apdorojimai per metus
- Naminiai paukščiai (vištos): 1 apdorojimas per metus
- Naminiai paukščiai (antys, žąsys ir kalakutai): 4 apdorojimai per metus.

Naudojimo norma yra vienoda visiems naudojimo būdams: 25 gramai produkto vienam m². Tačiau, priklausomai nuo apdorojimo būdo, prieš naudojimą gali reikėti praskiesti.

Naudojimo instrukcijos, Naudojimo instrukcijos, Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką, Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos : skatinti pievienoto lietošanas instrukciju

Naudojimo būdas	Praskiedimas	Dozės norma
Sausas barstymas	Neskiesti	250 g produkto /10m ²
Purški mas	500 g produkto I 5 l vandens	2,5 l tirpalo /10m ²
Laistymas	500 g produkto I 15 l vandens	7,5 l tirpalo /10m ²

Produkto klasifikacija
 Pavojų pareiškimai
 H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 Apsaugos priemonių pareiškimai
 P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
 P501: talpyklą/turinį šalinti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą, laikantis vietos, regiono, nacionalinių ir (arba) tarptautinių taisyklių.

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Veiklioji medžiaga:

Ciromazinas / N-ciklopropil-1,3,5-triazino-2,4,6-triaminas (CAS Nr. 66215-27-8, EB Nr. 266-257- 8) 2,02 % (masės dalis)
 Biocidas, PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
 Formuliacijos tipas: SG Vandenyje tirpios granulės

Liudijimas išduotas:

ARMOSA TECH SA

Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis (Belgija)

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. PAP5031

Anwenderkategorie: Berufsmäßige Verwender

Anwendungsbereich

Das Produkt ist für die Anwendung auf Oberflächen in Ställen für Milchvieh, Fleischrinder (ausgenommen Kälber) und Geflügel bestimmt.

Zielorganismen:

- Stubenfliege (Musca domestica)
- Wadenstecher (Stomoxys calcitrans)

Anwendungsmethode:

- Trockenstreuung: Das Produkt wird direkt und gleichmäßig auf die Fliegenbrutstätten aufgetragen. Diese Ausbringungsmethode wird nur bei Nass- oder Flüssigdüngung angewendet und kann daher nicht in Geflügelbetrieben verwendet werden.
- Gießen: Das Produkt wird zunächst mit Wasser gemischt. Anschließend wird es durch Gießen mit einer Gießkanne auf die Fliegenbrutstätten aufgebracht.
- Sprühen: Das Produkt wird zunächst mit Wasser gemischt. Anschließend wird es mit einer Rückenspritze auf die Fliegenbrutstätten aufgebracht.

Anwendungsmenge und Häufigkeit:

Anwendungsrate(n) und Häufigkeit Aufwandmenge: 25 g/m² Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:
Das empfohlene Behandlungsintervall hängt von den Management- und Haltungssystemen sowie von den klimatischen Bedingungen ab. Es kann von 2-3 Wochen bis zu mehreren Monaten variieren. Oft reicht ein Intervall von 6 Wochen aus. Die beobachtete Wirkung der Behandlungen wird aufgrund des Wirkmechanismus des Produkts nicht unmittelbar sein.

Die maximale Anzahl der Behandlungen darf nicht überschritten werden:

- Milchvieh: 4 Behandlungen pro Jahr
- Fleischrinder (ausgenommen Kälber): 4 Behandlungen pro Jahr
- Geflügel (Hühner): 1 Behandlung pro Jahr
- Geflügel (Enten, Gänse und Truthähne): 4 Behandlungen pro Jahr

Die Ausbringungsmenge ist für alle Anwendungsmethoden gleich: 25 Gramm des Produkts pro m². Abhängig von der Behandlung kann jedoch eine Verdünnung vor der Anwendung erforderlich sein.

Anwendungs-methode	Verdün-nung	Dosierung
Trocken-streuung	Keine Ver-dünnung	250 g Produkt /10 m²
Sprühen	250 g Pro-dukt/ 2,5 l Wasser	2,5 l Lösung /10 m²
Gießen	250 g Pro-dukt/ 7,5 l Wasser	7,5 l Lösung /10 m²

Gebrauchsanweisung, Risikominderungsmaßnahmen, Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer, Erste-Hilfe-Anweisungen: : siehe beiliegende Gebrauchsanweisung

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501: Behälter/Inhalt Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Giftnotrufnummer: +49 30 19240
Wirkstoff: Cyromazine (CAS No. 66215-27-8) 2,02 % (w/w)
Biozid,PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Formulierungstyp: SG Wasserlösliches Granulat

Zulassungsinhaber:
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien

IRELAND

2% W/W CYROMAZINE – SOLUBLE GRANULE (SG) FORMULATION
Insecticide for professional use to control the larvae of house flies and stable flies in animal husbandry situations and fly breeding sites such as treatment of deep litter/dung in dairy, beef cattle excluding veal calves and poultry.

H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P273: Avoid release to the environment.
P501: Dispose of container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulations.

Authorisation No: IE/BPA 70635
Authorisation holder: Armosa Tech, Rue Des Tuilliers 1, B-4480 Engis, BELGIUM

User category: For professional use
Field of use: Indoor use. The product is intended to be applied on surfaces in stables for dairy cattle, beef cattle excluding veal calves, and poultry.
Application method: Dry scattering, Watering, Spraying
Dry scattering: The product is directly and evenly applied on fly breeding sites.

This method of application is only used in case of wet or liquid manure and can therefore not be used in poultry farms.
Watering: The product is firstly mixed with water. It is then applied afterwards by watering on fly breeding site with a watering can.
Spraying: The product is first mixed with water. It is then applied afterwards on fly breeding site with a knapsack sprayer.
Target organism: Musca domestica (house fly), larvae, Stomoxys calcitrans (stable fly) larvae

Application Rate: 25 g/m²
Number and timing of application:
The recommended treatment interval depends on management and housing systems as well as on climatic conditions. It can vary from 2-3 weeks up to several months. Often, 6 weeks intervals will suffice.

The observed effect of the treatments will not be immediately due to working mechanism of the product. The maximum number of treatments must not be exceeded:
• Dairy cattle: 4 treatments per year
• Beef cattle excluding veal calves: 4

treatments per year
• Poultry (chickens): 1 treatment per year
• Poultry (ducks, geese, and turkeys): 4 treatments per year
The application rate is the same for all application methods: 25 grams of product per m². However, depending on the treatment, dilution may be required before the application.

Applica- tion	Dilution	Treated area
Dry scat- tering	No dilution	250g product /10m ²
Spraying	250g pro- duct/ 2.5 L water	2.5L solu- tion /10m ²
Watering	250g pro- duct/ 7.5 L water	7.5L solu- tion /10m ²

Instructions for use,risk mitigation measures, first aid instructions and instructions for safe disposal of the product and its packaging : see enclosed leaflet.

Use biocides safely and sustainably. It is illegal to use this product for uses or in a manner other than that prescribed on the label.

For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin (01 8092166), retain the label for reference

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Aktivna supstanca

20g/kg Ciromazin (N-Ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin, CAS : 66215-27-8)

Insekticid u obliku vodorastvorljivih granula za suzbijanje larvi muva na stajnjacima i drugim mestima gde se životinje čuvaju prskanjem ili polivanjem. Dozvoljno za profesionalno korišćenje i opštu upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ciromazin je regulator rasta insekata. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina

Prskanje: Snažno promešajte 500g MS LARVAKILL-a sa 5 litara tople (ne vrele) vode i primeniti na površini od 20 m². Primena na mesta polaganja jaja, piljenja larvi leđnom prskalicom.

Zalivanje: Snažno promešajte 500g MS LARVAKILL-a sa 15 litara tople vode i primeniti na površini od 20 m².. Primena jednakomernim zalivanjem kantom za zalivanje sa rešetkom po mestima polaganja jaja-piljenja larvi.

VAŽNO UPOZORENJE: Primena MS LARVAKILL-a je jedino na mestima polaganja jaja-piljenja larvi. Nije namenjen

za aplikaciju na mestima sletanja i odmaranja odraslih jedinki-adulta (zidovi, plafoni i sl.), nema efekta na odrasle oblike muva.

Interval tretiranja: Preporučeni interval tretiranja zavisi od vrste i oblika prostorija i njihovog održavanja kao i od klimatskih uslova. Može da varira od prskanja na 2-3 nedelje do nekoliko meseci . Vreme tretmana dato je u preporuci ispod teksta.
Preporuka za tretmane. FARME GOVEDA

Duboka legla larvi: Tretirati ivice i prelivne oblasti oko hranilice i pojilice i mesta gde se stajnjak akumulira. Prostorije za telenje, koje su izdvojene, tretirati celu površinu. Nanesite MS LARVAKILL prskanjem ili zalivanjem otprilike 3 dana posle uklanjanja izmeta i ponovite tretman kada god se larve muva spaze.

Pod sa rešetkom - kanalom: Tretirajte celu površinu odmah nakon čišćenja od balege jamu, ponovite tretman kada se larve muva spaze.

FARME SVINJA

Zatvoreni i otvoreni sistemi gajenja: Nanesite MS LARVAKILL prskanjem ili zalivanjem odmah nakon čišćenja i pre

ubacivanja svinja. Podovi sa rešetkom: Tretirajte celu površinu odmah nakon čišćenja od balege takođe i jamu, ponovite tretman kada se larve muva spaze.

Duboka legla larvi: Nanesite MS LARVAKILL prskanjem ili zalivanjem otprilike 3 dana posle uklanjanja izmeta i ponovite tretman kada se larve muva spaze. Tretirajte celu površinu balege i vlažne mrlje oko hranilice i pojilice.

ŽIVINARSKIE FARME: Nanesite MS LARVAKILL prskanjem ili zalivanjem celu površinu balege oko 1 nedelju dana posle uklanjanja stajnjaka. Ponovite tretman kada se larve muva spaze.

OSTALI OBJEKTI ZA ČUVANJE I DRŽANJE ŽIVOTINJA: Primena MS LARVAKILL na legla muva 1-3 dana po opažanju povećanja količine jaja muva. Drugi tretman izvesti 2 - 3 nedelje iza prvog.

MERE PREDOSTROŽNOSTI - PROČITATI SVE MERE PREDOSTROŽNOSTI PRE UPOTREBE

Bezbedonosna predostrožnost:

- Držati pod ključem i van domašaja dece.
- Držati odvojeno od hrane , pića i hrane za životinje.

- Prilikom primene ne jesti, ne piti i ne pušiti. Zaštititi i pokriti sve posude za hranu i za vodu prilikom primene.
- Ne prskati pribor za hranu ili površine na koje se hrana odlaže. Ne primenjivati direktno na životinje, po stoci ili živini.
- Ne zagađivati vodotokove prilikom primene.
- Po završetku tretmana, oprati izložene delove tela i presvući se u čistu odeću.
- U slučaju kontakta sredstva sa očima, dobro isprati sa puno vode i potražiti pomoć lekara pokazati im ovo uputstvo ili bocu sa etiketom.
- U slučaju kontakta sa kožom, skinuti odmah svu kontaminiranu odeću i oprati se odmah sa dosta vode i sapuna.
- Sa neutrošenim količinama biocidnog proizvoda postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
- Čuvati u originalnoj ambalaži na prohladnom i provetrenom mestu. Nakon upotrebe dobro zatvoriti ambalažu.

Uslovi skladištenja:

- Skladištiti u originalnim dobro zatvorenim posudama, van domašaja dece, životinja u prostoru sa dobrom ventilacijom pod ključem.
- Zaštititi posude od direktnog sunčevog

zračenja, vlage i kiše.

- Odlaganje:
- Ne prosipati preostalu količinu posle upotrebe u bare, potoke ili u sisteme za zalivanje.
- Isprazniti posude u potpunosti (na za to predviđenom mestu) probušiti i odložiti na bezbedan način.
- Uvek se pridržavati lokalnih propisa i zahteva.

**U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI
SAVET OD NACIONALNOG CENTRA
ZA KONTROLU TROVANJA VMA,
TELEFON (24 sata) 011 3608 440.**

Sadržaj: 20 kg

**Rok trajanja: 2 godine, ako je
pravilno uskaldišten i u originalnoj
ambalaži**

**Broj rešenja o upisu biocidnog
proizvoda u Listu biocidnih
proizvoda za dostavljanje dosijea:
532-01-280/2021-03 od
15.04.2024**

Proizvodi
ARMOSA SA
Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis
BELGIJA

Käyttäjärühmä: ammattikäyttö

Käyttöalue

Valmiste on tarkoitettu lypsykarjan, lihakarjan vasikoita lukuun ottamatta, ja siipikarjan eläinsuojien pinnoille.
Kohdeeliöt:
• huonekärpäset (Musca domestica)
• pistokärpäset (Stomoxys calcitrans)

Levitystapa:

- Kuivasirottelu: Valmistetta levitetään suoraan ja tasaisesti kärpästen lisääntymispaikoille. Tätä levitysmenetelmää käytetään vain märälle tai nestemäiselle lannalle, eikä sitä siksi voi käyttää siipikarjatililla.
- Kastelu: Valmiste sekoitetaan ensin veteen. Sen jälkeen se levitetään kastelukannulla kastelemalla kärpästen lisääntymispaikka.
- Ruiskutus: Valmiste sekoitetaan ensin veteen. Sen jälkeen se levitetään kärpästen lisääntymispaikalle reppuruiskulla.

Annostus ja käyttöiheyys:

Käyttömäärä: 25 g/m² Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Suositeltu

käsittelyväli määräytyy hallinta- ja eläinsuojajärjestelmien sekä ilmasto-olosuhteiden mukaan. Se voi vaihdella 2–3 viikosta useisiin kuukausiin.

- Usein 6 viikon väli on riittävä. Käsittelyjen havaittu vaikutus ei tapahdu välittömästi johtuen tuotteen toimintamekanismista. Käsittelyjen enimmäismäärää ei saa ylittää:
- Lypsykarja: 4 käsittelykertaa vuodessa
 - Lihakarja vasikoita lukuun ottamatta: 4 käsittelykertaa vuodessa
 - Siipikarja (kanat): 1 käsittely vuodessa
 - Siipikarja (ankat, hanhet ja kalkkunat): 4 käsittelykertaa vuodessa

Annostelumäärä on sama kaikissa levitysmenetelemissä: 25 grammaa valmistetta per m². Käsittelystä riippuen laimennus voidaan kuitenkin tarvita ennen levitystä.

Annos- telutapa	Laimenta- minen	Annoste- lumäärä
Kuivasi- rottelu	Ei laimen- nusta	250 g valmistetta /10 m²
Ruisku- tus	250 g valmis- tetta /2,5 l vettä	2,5 l liuosta /10 m²
Kastelu	250 g valmis- tetta /7,5 l vettä	7,5 l liuosta /10 m²

Käyttöohjeet, Riskinhallintatoimet, Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi, Ensiapuohjeet, Ympäristöön kohdistuvat varotoimet, Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä, Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa : katso mukana oleva käyttöohje

H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501: Hävitä pakkaus/sisältö vaarallisen jätteen keräyspisteessä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten säännösten mukaisesti.
UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW
Myrkytystietokeskuksen puhelinnumero: +358 9 471 977
Vaikuttava aine: Cyromazine (CAS No. 66215-27-8) 2,02 % (w/w)
Biocidi, PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
Formulointityyppi: SG Vesiliukoinen rae
Hyväksynnän haltija: ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgia

CZ - Madendood GR je larvicid, používaný v živočišné výrobě k hubení larev much. Obsahuje silný růstový regulátor účinný na moucha domácí (Musca domestica) a bodalka stájová (Stomoxys calcitrans)

Oblast použití : použití ve vnitřních prostorách. Přípravek je určen k aplikaci na povrchy ve stájích pro mléčná plemena skotu, masná plemena skotu s výjimkou telat a drůbeže.

Metody aplikace

Suchý rozptyl: Přípravek se aplikuje přímo a rovnoměrně na lůhniště much. Tento způsob aplikace se používá pouze v případě mokrého nebo tekutého hnoje, a proto jej nelze použít v drůbežárnách. Polévání: Přípravek se nejprve smíchá s vodou. Následně se aplikuje poléváním lůhnišť much konví. Postřikování: Přípravek se nejprve smíchá s vodou. Poté se aplikuje na lůhniště much, pomocí batohového postřikovače.

Aplikační dávka a frekvence :

Aplikační dávka: 25 g/m²
Počet a načasování aplikace: Doporučený interval ošetření závisí na systému

chovu a ustájení a také na klimatických podmínkách. Může se pohybovat od 2-3 týdnů až po několik měsíců. Často postačí interval 6 týdnů. Pozorovaný účinek ošetření nebude okamžitý vzhledem k mechanismu fungování přípravku.

Nesmí být překročen maximální počet ošetření :

- Mléčná plemena skotu: 4 ošetření ročně
- Masná plemena skotu s výjimkou telat: 4 ošetření ročně
- Drůbež (kuřata): 1 ošetření ročně
- Drůbež (kachny, husy a krůty): 4 ošetření ročně

Aplikační dávka je pro všechny způsoby aplikace stejná: 25 gramů přípravku na m². V závislosti na způsobu ošetření však může být před aplikací nutné ředění.

Metoda aplikace	Ředění	Dávkování
Suchý rozptyl	Bez ředění	250 g přípravku /10 m²;
Postřikování	250 g přípravku / 2,5 l vody	2,5 l roztoku /10 m²
Polévání	250 g přípravku / 7,5 l vody	7,5 l roztoku /10 m²

Návod k použití, Opatření ke zmírnění rizik. Opatření pro bezpečné zacházení, Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí, Pokyny pro první pomoc, Pokyny pro první pomoc: viz příložený návod

Držitel povolení: ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers, 1 4480 Engis BE
Typ přípravku : PT18: Insekticidy
Složení přípravku : Cyromazine (CAS : 66215-27-8) 2.02% (w/w)
UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW
Typ složení : SG Ve vodě rozpustné granule
Kategorie uživatelů : profesionální uživatel

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501: Odstraňte obsah/ obal předáním oprávněné osobě.

Kategorija uporabnika: strokovnjak

Področje uporabe

Uporaba v zaprtih prostorih. Proizvod je namenjen uporabi na površinah v hlevih za mlečno govedo, mesno govedo brez telet in perutnino.

Ciljni organizmi:

- hišna muha (Musca domestica)
- hlevska muha (Stomoxys calcitrans)

Način uporabe:

- Suho razprševanje: Sredstvo se neposredno in enakomerno nanese na mesta razmnoževanja muh. Ta način nanašanja se uporablja le pri mokrem ali tekočem gnoju, zato ga ni mogoče uporabljati na perutninskih farmah.
- Polivanje: Proizvod se najprej zmeša z vodo. Nato ga nanesemo tako, da z zalivalko polijemo mesto razmnoževanja muh.
- Pršenje: Proizvod se najprej zmeša z vodo. Nato ga z nahrbtnim razpršilnikom nanesemo na mesto razmnoževanja muh.

Doza in frekvenca uporabe:

Odmerek: 25 g/m²
Število in časovni raspored uporabe:
Priporočeni interval obdelave je odvisen od sistemov upravljanja in reje ter podnebnih razmer. Interval se lahko razlikuje od 2–3 tedne do več mesecev. Pogosto je dovolj, če se izvaja v presledkih po 6 tednov. Opaženi učinek obdelave ne bo takojšen zaradi mehanizma delovanja proizvoda. Maksimalnega števila obdelav se ne sme preseči:
• Mlečno govedo: 4 obdelave na leto
• Mesno govedo, razen telet: 4 obdelave na leto
• Perutnina (piščanci): 1 obdelava na leto
• Perutnina (race, gosi in purani): 4 obdelave na leto
Pogostost nanosa je enaka za vse načine nanosa: 25 gramov proizvoda na m². Vendar pa bo odvisno od načina obdelave morda potrebno redčenje pred uporabo.

Metoda nanosa	Redčenje	Odmerek
Suho razprševanje	Brez redčenja	250 g proizvoda/10 m ²
Pršenje	250 g proizvoda /2,5 l vod	2,5 l raztopine/10 m ²
Polivanje 250 g /7,5 l	250 g proizvoda /7,5 l vod	7,5 l raztopine/10 m ²

Navodila za uporabo, Ukrepi za zmanjšanje tveganja, Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja, Okoljevarstveni ukrepi : glej priloženo navodilo

Izjave o nevarnosti H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Izjave o previdnostnih ukrepih P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P501: Odstraniti posodo/vsebino z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Telefonska številka za pomoč pri zastrupitvah: +386 41 635 500 Aktivna snov: Ciromazin (CAS No. 66215-27-8) 2,02 % (w/w) Biocid,PT18: Insekticidi Tip formulacije: SG Vodotopna zrnca, vodotopni kristali Imetnik dovoljenja: ARMOSA TECH SA Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgija

Madendood je larvicíd, používaný v živočíšnej výrobe na hubenie lariev múch. Obsahuje silný rastový regulátor účinný na múch (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*).

POKYNY NA POUŽITIE Kategória používateľov : odborník vnútorné použitie. Výrobok je určený na aplikáciu na povrchy v stajniach pre dojnice, hovädzí dobytok s výnimkou teliat a hydiny.

Aplikačné programy:

Spôsob: Suchý rozptyl, polievanie, postrek. Suchý rozptyl: Výrobok sa aplikuje priamo a rovnomerne na miesta rozmnožovania múch.

Tento spôsob aplikácie sa používa len v prípade vlhkého alebo tekutého hnoja, a preto sa nemôže používať na hydinárskych farmách.

Polievanie: Výrobok sa najprv zmieša s vodou. Následne sa aplikuje polievaním miesta rozmnožovania múch pomocou konvice.

Postrek: Výrobok sa najprv zmieša s vodou. Potom sa aplikuje na miesto rozmnožovania múch pomocou chrbtového postrekovača.

Aplikačná dávka:

25 g/m² Odporúčaný interval ošetrenia závisí od systému chovu a ustajnenia, ako aj od klimatických podmienok. Môže sa pohybovať od 2-3 týždňov až po niekoľko mesiacov. Často stačí interval 6 týždňov.

Pozorovaný účinok ošetrenia nebude okamžitý vzhľadom na pracovný mechanizmus výrobku. Nesmie sa prekročiť maximálny počet ošetrení:

- Dojnice: 4 ošetrenia ročne
- Hovädzí dobytok okrem teliat: 4 ošetrenia ročne
- Hydina (sliepky): 1 ošetrenie ročne
- Hydina (kačice, husi a morky): 4 ošetrenia ročne.

Aplikačná dávka je rovnaká pre všetky spôsoby aplikácie: 25 gramov výrobku na m². V závislosti od ošetrenia však môže byť pred aplikáciou potrebné zriedenie.

Aplikačná metóda	Riedenie	Množstvo dávky
Suchý rozptyl	Žiadne riedenie	250 g výrobku /10m ²
Postrek	250 g výrobku/ 2,5 L vody	2,5 L rozvodu /10m ²
Polievanie	250 g výrobku / 7,5 L vody	7,5 L rozvodu /10m ²

Návod na použitie, Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie, Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy, Pokyny pre prvú pomoc, Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie, Metódy a materiál na zabránenie šírenia a vyčistenie, Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu, Podmienky skladovania : pozri priložený leták

Madendood:

Držiteľ autorizácie : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers, 1 4480 Engis BE`.

Typ výrobku: PT18: Insekticídy

Zloženie produktu : Cyromazín (CAS : 66215-27-8) 2.02% (w/w) UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Typ úpravy: SG Granulát rozpustný vo vode

Kategória používateľov: Profesionálne odborník H412 : Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P273 : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 : Zneškodnite obsah z berného miesta nebezpečného alebo špeciálneho odpadu v súlade s miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a/alebo medzinárodnými predpismi. Distribuované spoločnosťou:

Číslo šarže a dátum spotreby: viď obal

Atzīmējiet projektu Madendood
Profesionāļiem : Profesionāļi (tostarp
lietotāji rūpniecības nozarē) ir apmācīti
profesionāļi, ja tas pieprasīts valsts tiesību
aktos.

Aktīvā viela:

Ciromazīns (CAS : 66215-27-8) 2.02% (w/w)
Produkta veids : PT18: Insekticīdi, akaricīdi
un produkti citu posmkāju kontrolei - SG
Ūdenī šķīstošas granulas Mērķa organismi:
Musca domestica (istabas muša) :
Attīstības stadija: kāpuri Stomoxys
calcitrans (sīvās mušas) : Attīstības stadija:
kāpuri

Deva: Lietošanas deva: 25 g/m² Lietošanai
nepieciešmais skaits un laiks: Ieteicamais
apstrādes intervāls ir atkarīgs no
apsaimniekošanas un turēšanas sistēmas,
kā arī no klimatiskajiem apstākļiem. Tas
var būt no 2–3 nedēļām līdz vairākiem
mēnešiem. Bieži vien pietiek ar 6 nedēļu
intervālu. Produkta darbības mehānisma
dēļ novērotā apstrādes iedarbība nebūs
ūlītēja.

Nedrīkst pārsniegt maksimālo apstrādes
reīžu skaitu:

- Piena lopī: 4 apstrādes gadā
- Gaļas liellopi, izņemot nobarojamus teļus: 4 apstrādes gadā
- Mājputni (cāļi): 1 apstrāde gadā
- Mājputni (pīles, zosis un tītari): 4 apstrādes gadā

Visām lietošanas metodēm lietošanas
deva ir nemainīga: 25 gramī produkta uz
m² Tomēr atkarībā no apstrādes veida
pirms lietošanas var būt nepieciešama
atšķaidīšana.

Lietošanas metode	Atšķai- dīšana	Deva
Izkliedēšana sausā veidā	Bez atšķai- dīšanas	250 g pro- dukta /10 m ²
Apsmid- zināšana	250 g pro- dukta /2,5 l ūdens	2,5 lšķiduma /10 m ²
Laistīšana	250 g pro- dukta /7,5 l ūdens	7,5 lšķiduma /10 m ²

**Instrukcijas, Riska mazināšanas
pasākumi, Individuālās drošības
pasākumi, aizsardzības līdzekļi un
procedūras ārkārtas situācijā, Vides
drošības pasākumi, Uzglabāšanas
apstākļi: skatīt pievienoto lietošanas
instrukciju**

Juridiskā informācija:

H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar
ilgstošām sekām.
P 273: Izvairieties no izplāšanās apkartējā
vidē. P 501: Atbrīvoties no satura/ tvertnes
bīstamo atkritumu vai speciālo atkritu
m u savākšanas vietā saskaņā ar vietēji
em, reģionālajiem, nacionalajiem un/vai
starptautiskajiem noteikumiem.

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW
Anti-indes Nē. Tel: +371 67032600

Atļaujas turētājs: ARMOSA TECH SA, Rue
des Tuiliers 1, 4480, Engis - Belgija

Brugerkategorier: professionel
Anvendelsesområde. Produktet er beregnet til at blive anvendt på overflader i stalde til malkekvæg, kødkvæg undtagen slagtekalve, og fjerkræ.

Målorganismer:

- husfluer (Musca domestica)
- staldfluer (Stomoxys calcitrans)

Anvendelsesmetode:

- Tørspredning: Produktet påføres direkte og jævnt på fluernes ynglesteder. Denne anvendelsesmetode bruges kun, når der er tale om våd eller flydende gødning, og kan derfor ikke bruges i fjerkræbedrifter.
- Vanding: Produktet blandes først med vand. Det påføres derefter ved vanding på fluernes ynglested med en vandkande.
- Sprøjtning: Produktet blandes først med vand. Det påføres derefter på fluernes ynglested med en rygsprøjte.

Anvendelsesrater og hyppighed:

Anvendeshyppighed: 25 g/m² Antal og timing af ansøgning: Det anbefalede behandlingsinterval afhænger af drifts- og opstaldningssystemer samt af klimatiske forhold. Det kan variere fra 2-3 uger op

til flere måneder. Ofte vil intervaller på 6 uger være tilstrækkeligt. Den observerede effekt af behandlingerne vil ikke være der øjeblikkeligt på grund af produktets virkningsmekanisme. Det maksimale antal behandlinger må ikke overskrides:

- Malkekvæg: 4 behandlinger om året
- Kødkvæg undtagen slagtekalve: 4 behandlinger om året
- Fjerkræ (kyllinger): 1 behandling om året
- Fjerkræ (ænder, gæs og kalkuner): 4 behandlinger om året

Anvendelsesmængden er den samme for alle anvendelsesmetoder: 25 gram produkt pr. m². Afhængigt af behandlingen kan der dog være behov for fortynding før påføringen.

Anvendelsesmetode	Fortynding	Dosering
Tørspredning	Ingen fortynding	250 g produkt /10 m ²
Sprøjtning	250 g produkt / 2,5 l vand	2,5 l opløsning /10 m ²
Vanding	250 g produkt / 7,5 l vand	7,5 l opløsning /10 m ²

Brugsanvisning, Risikoreducerende foranstaltninger, Anvisninger i førstehjælp, Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen , Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser : Se den vedlagte brugsanvisning

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: beholder/indhold bortskaffes indsamlingssted for farligt eller særligt affald i overensstemmelse med lokal, regional, national og/eller international lovgivning.
UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW
Giftlinjens telefonnummer: +45 82 12 12 12
Aktiv substans: Cyromazine (CAS No. 66215-27-8) 2,02 vægtprocent.
Biocid,PT18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr
Formuleringstype: SG Vandopløseligt granulat

Godkendelsesindehaverens navn og adresse :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien
www.armosa.eu

Gebruikerscategorie: professionele gebruiker

Toepassingsgebied

Het product is bedoeld voor toepassing op oppervlakken in stallen voor melkvee, rundvee met uitzondering van vleeskalveren, en voor pluimvee.

Doelorganismen:

- Huisvlieg (*Musca domestica*)
- Stalvlieg (*Stomoxys calcitrans*)

Toepassingsmethode:

- Droog strooien: Het product wordt rechtstreeks en gelijkmatig aangebracht op broedplaatsen van vliegen. Deze toepassingsmethode wordt alleen gebruikt in het geval van natte of vloeibare mest en kan daarom niet worden gebruikt in pluimveebedrijven.
- Gieten: Het product wordt eerst gemengd met water. Daarna wordt het toegepast door de broedplaats van vliegen te bewateren met een gieter.
- Spuiten: Het product wordt eerst gemengd met water. Daarna wordt het op de broedplaats van vliegen toegepast met een rugspuit.

Dosering en frequentie:

Aantal en timing van de toepassing: De aanbevolen tijd tussen behandelingen hangt af van de beheersen huis- vestingssystemen en de klimaatomstandigheden. Dit kan variëren van 2-3 weken tot enkele maanden. Vaak is 1 behandeling per 6 weken voldoende.

Het effect van de behandeling zal niet onmiddellijk worden waargenomen vanwege het werkingsmechanisme van het product. Het maximum aantal behandelingen mag niet worden overschreden:

- Melkvee: 4 behandelingen per jaar
- Rundvee, met uitzondering van vleeskalveren: 4 behandelingen per jaar
- Pluimvee (kippen): 1 behandeling per jaar
- Pluimvee (eenden, ganzen en kalkoenen): 4 behandelingen per jaar

De toepassingsdosering is hetzelfde voor alle toepassingsmethoden: 25 gram product per m². Afhankelijk van de behandeling kan echter verdunning nodig zijn vóór de toepassing.

Toepassingsmethode	Verdunning	Dosis
Droog strooien	Geen verdunning	250 g product /10 m ²
Spuiten	250 g product / 2,5 l water	2,5 l oplossing /10 m ²
Gieten	250 g product / 7,5 l water	7,5 l oplossing /10 m ²

Gebruiksaanwijzingen, risicobeperken de maatregelen, bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen, Instructies voor eerste hulp, Milieuvoorzorgsmaatregelen: zie bijgevoegde bijsluiter

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P501: verpakking afvoeren een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving., inhoud afvoeren een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving.
 UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW
 Antigifcentrum telefoonnummer: +31 30 274 8888
 Werkzame stof: Cyromazine / N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (CAS No. 66215-27-8) 2,02 % (m/m)
 Biocide, PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
 Formuleringstype: SG Wateroplosbaar granulaat
 Toelatingshouder: ARMOSA TECH SA
 Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis België

Produkt przeznaczony do zwalczania larw much w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie, w oborniku i ściółce oraz w śmietnikach. Eliminacja owadów zachodzi stopniowo i staje się widoczna po dwóch tygodniach po zastosowaniu. Stosować tylko na oborniku lub innych miejscach hodowlanych. Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza zasięgiem zwierząt.

Substancje czynne:

N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina/ cyromazyna 2g/100g

Stosowanie: Obory, chlewnie: Produkt rozprowadzić poprzez spryskiwanie lub polewanie w miejscach gdzie znajduje się obornik, w pobliżu karminków i poidel, na całą powierzchnię ściółki. Po trzech dniach usunąć obornik z martwymi larwami much i ponownie zastosować produkt. Proces powtarzać do momentu, kiedy nie zauważalne będą larwy much w oborniku.

Fermy: Produkt stosować poprzez polewanie lub spryskiwanie obornika, zabieg powtórzyć po tygodniu od usunięcia obornika z martwymi larwami much.

Dawkowanie: 250g produktu na 10m² obornika.

Polewanie: 250g rozpuścić w 7,5l ciepłej wody, Wystarcza na 10m² powierzchni.

Rozpylanie: 250g rozpuścić w 2,5l ciepłej wody. Wystarcza na 10m² powierzchni. Powtórzyć zabieg na oborniku po 15 dniach. Ostatecznie powtórzyć zabieg po raz trzeci, ponownie po 15 dniach. Rozsypany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w suchym i bezpiecznym miejscu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.

Środki ostrożności:

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi,

regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

Pierwsza pomoc:

W kontakcie ze skórą: zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą z mydłem.

W kontakcie z oczami: przemywać wodą utrzymując powieki otwarte. Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza.

Przypadkowe spożycie: nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Postępowanie z odpadami produktu:

Niewykorzystany produkt oraz resztki produktu umieścić w szczelnym pojemniku. Odpadowy produkt oraz opakowanie przekazać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

Produkt do użytku profesjonalnego!

Postać produktu: granulat

Data ważności:

Numer pozwolenia: 6028/14

Podmiot odpowiedzialny: ARMOSA TECH SA Rue des Tuiliers 1 4480 ENGIS, Belgia

Tel. : 0032 85 519 519