

Technische Fiche

(23.06.2021)

Sorkil® DB – haak zonder mantel

IDENTITEIT

PT14

Toelatingsnummer : BE2012-0018

Lokmiddel klaar voor gebruik (RB)

Gewaarborgde samenstelling: 0,005% difenacoum (CAS 56073-07-5).

TEL Antigifcentrum: 070 245 245.

Toelatingshouder : DENKA REGISTRATIONS SARL. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny 8, FR 59000 Lille ; TEL +33 320 15 24 42

GEBRUIK

Rodenticide bestemd voor professioneel gebruik. SORKIL® DB is een vochtbestendige paraffineblok ter bestrijding van RATTEN (*Rattus norvegicus* en *Rattus rattus*) en HUISMUIZEN (*Mus musculus*) zowel binnenshuis als buitenshuis rond gebouwen (privé, openbaar en landbouw).

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik 1_ - Huismuizen en/of ratten - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid- gebruik binnen

Doelorganisme: *Mus muscu/us*-Huismuis-*Rattus rattus*-zwarte rat-*Rattus norvegicus*-bruine rat-jonge en volwassen dieren. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.

Dosering en frequentie van de toepassing

- **Ratten:** 80 - 200 g / lokaaspunt met 15 meter afstand tussen de lokaaspunten
- **Muizen:** 25 - 30 g / lokaaspunt met 3 meter afstand tussen de lokaaspunten

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies: Verwijder het overgebleven product na de behandelingsperiode. Volg elke bijkomende instructies die voorzien is in de code van best gebruik.

Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Waar mogelijk, voor de behandeling mogelijke omstaanders (bv. gebruikers van te behandelende zone of omgeving) informeren over de knaagdieren controle campagne (in overeenstemming met de geldende code van goed gebruik, indien van toepassing).
- Voorzie preventieve controle maatregelen (bv. hollen dichtmaken, verwijder mogelijks voedsel en drank voor de knaagdieren zo ver mogelijk), dit bevordert de opname van het product en vermindert de kans op een nieuwe besmetting.

- Om het risico op secundaire vergiftiging te verminderen, zoek en verzamel op regelmatige tijdstippen de dode knaagdieren-kadavers, dit in lijn met de aanbevelingen die voorzien zijn in de code van best gebruik.
- Het product NIH gebruiken als permanent lokaasmiddel ter preventie van een besmetting of voor het vaststellen van knaagdieren-activiteit.
- Het product NIH gebruiken voor een behandeling met de "pulsed baiting technique".
- Wanneer lokaas in de buurt van water drainage systemen wordt ingezet, zorg er dan voor dat het product niet in contact komt met water.

Gebruik 2 - Muizen en/of ratten - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - gebruik buiten rond gebouwen.

Doelorganisme: Mus muscu/us-Huismuis-Rattus rattus-zwarte rat-Rattus norvegicus-bruine rat-jonge en volwassen dieren. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen. [onder bedekking en beveiligde plaatsen]

Dosering en frequentie van de toepassing

- **Ratten:** 80 - 200 g / lokaaspunt met 15 meter afstand tussen de lokaaspunten.
- **Muizen:** 25 - 30 g / lokaaspunt met 3 meter afstand tussen de lokaaspunten

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm het lokaas tegen verschillende weersomstandigheden. Plaats het lokaas niet in een gebied met overstromingsgevaar.
- Vervang het lokaas in lokaaspunten indien deze beschadigd zijn door water of besmeurd met vuil.
- Verwijder de resten van het product op het einde van de behandelingsperiode. - [Indien beschikbaar) Volg elke bijkomende instructie die voorgeschreven is in de relevante code voor beste praktijk.
- [Voor gebruik buiten, lokaaspunten moeten bedekt geplaatst worden op strategische plaatsen om het risico op blootstelling voor niet-doeldieren te beperken.]

Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Waar mogelijk, voor de behandeling mogelijke omstaanders (bv. gebruikers van de behandelende zone of omgeving) informeren over de knaagdieren controle-campagne (in overeenstemming met de geldende code van goed gebruik, indien van toepassing).
- Voorzie preventieve controlemaatregelen (bv. hopen dichtmaken, verwijder mogelijks voedsel en drank voor de knaagdieren zo ver mogelijk), dit bevordert de opname van het product en vermindert de kans op een nieuwe besmetting.
- Om het risico op secundaire vergiftiging te verminderen, zoek en verzamel op regelmatige tijdstippen de dode knaagdieren-kadavers, dit in lijn met de aanbevelingen die voorzien zijn in de code van best gebruik.
- Het product NIH gebruiken als permanent lokaasmiddel ter preventie van een besmetting of voor het vaststellen van knaagdieren activiteit.

- Het product NIH gebruiken voor een behandeling met de "pulsed baiting technique".
- Het product niet rechtstreeks in de nestopeningen plaatsen.
- Wanneer het lokaas geplaatst wordt in de buurt van oppervlaktewater {bv. rivieren, vijvers, plassen, kanalen, dijken, sloten, beken, grachten) of water drainagesystemen, zorg er dan voor dat het lokaas niet in contact komt met het water.

Gebruik 3 - Huismuis - professionals - gebruik binnen

Doelorganisme: Mus muscu/us-Huismuis-jonge en volwassen dieren - Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.

Dosering en frequentie van de toepassing: 25 tot 30 g lokaas per lokaasdoos. Indien meer dan een lokdoos nodig is, de minimum afstand 3 meter tussen de lokdozen respecteren.

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bij aanvang van de behandeling dient het lokaaspunt minstens om de 2 a 3 dagen bezocht te worden, daarna wekelijks, dit om te checken of het lokaas wordt opgenomen, de lokaasdozen nog intact zijn en om kadavers van dode knaagdieren te verwijderen. Indien nodig ook nieuw lokaas bijvullen.
- Volg elke bijkomende instructies die voorzien is in de code van best gebruik.

Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen: Wanneer lokaas in de buurt van water drainagesystemen wordt ingezet, zorg er dan voor dat het product niet in contact komt met water.

Gebruik 4 - Ratten - professionals - gebruik binnen

Doelorganisme: Rattus norvegicus-bruine rat-Rattus rattus-zwarte rat-jonge en volwassen dieren - Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.

Dosering en frequentie van de toepassing: 80 tot 200 g lokaas per lokaaspunt. Indien meer dan een lokdoos nodig is, de minimum afstand 15 meter tussen de lokdozen respecteren.

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bij aanvang van de behandeling dient het lokaaspunt minstens om de 5 a 7 dagen bezocht te worden, daarna wekelijks, dit om te checken of het lokaas wordt opgenomen, de lokaasdozen nog intact zijn en om kadavers van dode knaagdieren te verwijderen. Indien nodig ook nieuw lokaas bijvullen.
- [Indien beschikbaar] Volg elke bijkomende instructies die voorzien is in de code van best gebruik.

Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen: Wanneer lokaas in de buurt van water drainagesystemen wordt ingezet, zorg er dan voor dat het product niet in contact komt met water.

Gebruik 5 - Huismuis en/of ratten - professionals - gebruik buiten rond gebouwen

Doelorganisme: Mus muscu/us-Huismuis- Rattus norvegicusbruine rat- Rattus rattus-zwarte rat-jonge en volwassen dieren - Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.

Dosering en frequentie van de toepassing

- **Ratten:** 80 tot 200 g lokaas per lokaaspunt. Indien meer dan een lokdoos nodig is, de minimum afstand 15 meter tussen de lokdozen respecteren.
- **Muizen:** 25 tot 30 g lokaas per lokaaspunt. Indien meer dan een lokdoos nodig is, de minimum afstand 3 meter tussen de lokdozen respecteren.

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm het lokaas tegen verschillende weersomstandigheden (bv regen, sneeuw, etc.). Plaats het lokaas niet in een gebied met overstromingsgevaar. - Bij aanvang van de behandeling dient het lokaaspunt minstens (voor muizen om de 2 a 3 dagen)(voor ratten om de 5 a 7 dagen) bezocht te worden, daarna wekelijks, dit om te checken of het lokaas wordt opgenomen, de lokaasdozen nog intact zijn en om kadavers van dode knaagdieren te verwijderen. Indien nodig ook nieuw lokaas bijvullen.
- Vervang het lokaas in lokaaspunten indien deze beschadigd zijn door water of besmeurt met vuil.
- [Indien beschikbaar) Volg elke bijkomende instructie die voorgeschreven is in de relevante code voor beste praktijk.

Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Het product niet rechtstreeks in de nestopeningen plaatsen.
- Wanneer het lokaas geplaatst wordt in de buurt van oppervlaktewater {bv. rivieren, vijvers, plassen, kanalen, dijken, sloten, beken, grachten) of water drainage systemen, zorg er dan voor dat het lokaas niet in contact komt met het water.

Bewaring

Bewaar in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaar in de gesloten verpakking verwijdert van direct zonlicht. Bewaar buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren en hoevedieren. Houdbaarheid: 24 maanden.

Verpakking

Kartonnen doos van 10 kg (+/- 125 blokjes van 80 g met haak)

Bestemd voor

Professioneel gebruik

