

## BE

N° d'autorisation (Belgique): 2241P

A usage professionnel uniquement

| Organismes cibles      | Dose par poste d'appâtage | Usage                                | Distance minimale séparant deux postes |                    |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                        |                           |                                      | Fortes infestation                     | Faible infestation |
| Rats bruns, rats noirs | Jusqu'à 200g              | Intérieur et extérieur aux bâtiments | 4-5 mètres                             | 8 - 10 mètres      |
| Souris domestiques     | Jusqu'à 50g               |                                      | 1-1,5 mètres                           | 2-3 mètres         |

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lisez et respectez les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

## MESURES DE GESTION DE RISQUE :

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation (conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant).
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement (par exemple, au moins deux fois par semaine).
- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans procéder à une évaluation préalable du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.
- Ne pas utiliser d'appâts contenant des substances actives anticoagulantes en guise d'appâts permanents pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des

- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (plomber les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons édulcorés, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

- Les stations d'appât doivent être placées à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée précédemment (par exemple, parcs, sites de nidification, parcs d'engraisement, trous, terriers, etc.).

- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.

- Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «Target Special» ou «BE2013-0041»; «diféthionalone» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoisson [070 245 245]».

- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter.

en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.

organismes nuisibles.

- Ne pas nettoyer les postes d'appâtage à l'eau entre deux applications.

- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale [Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée].

- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

- Ne placer pas directement ce produit dans les terriers.

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité d'eaux de surface (par exemple, de rivières, de détroits, de cours d'eau, de digues ou de canaux d'irrigation) ou de systèmes d'évacuation des eaux, assurez-vous que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

## PREMIERS SECOURS :

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parlez avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les

## TARGET SPECIAL

- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.

- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés.

- Plomber le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.

- Portez des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (gants en latex ou équivalent, norme EN 374-1:2016).

- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.

- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.

- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable.

- Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

selles ou les urines peuvent être observées.

Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

En cas:

- d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;

- d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins

10 minutes;

- d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette.

Contactez un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

## INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION :

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale [L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont

- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

- Les postes d'appâtage doivent être inspectés pour les souris - au minimum tous les 2 à 3 jours au [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après le] début du traitement, puis au moins une fois par semaine

par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intactes et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin.

- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

## Extérieur (autour des bâtiments):

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée].


## RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.

Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

2405345

WAARSCHUWING



N° du lot: voir emballage

Date de production: voir emballage

Date limite d'utilisation: date de production + 2 ans

24 LV 11

Download app!  
Scan this product



## BE

Toelatingsnummer: 2241P

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

| Soort knaagdier          | Toepassingsgebied                                     | Dosis/lokaas-punt | Afstand tussen lokaasdozen                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Huismuis                 | Binnen                                                | 20 tot 50 g       | Grote plaag 1-1,5 meter<br>Geringe plaag 2-3 meter |
| Bruine rat<br>zwarte rat | Binnen, Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen | 100 tot 200 g     | 4-5 meter 8-10 meter                               |

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verpakkingspunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voor voortgang naar de behandeling een onderzoek uit in het geïnfecteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdiere actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdiere (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfecteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierepopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als

## VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstandigheden (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierebestrijdingscampagne (in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar).
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenstops (bijv. ten minste twee keer per week) de knaagdiere uit het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.
- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.
- Gebruik lokaas dat werkzame bloedverdunnende stoffen bevat niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdiereplagen of om knaagdiereactiviteit te monitoren.
- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.
- Met behulp van dit product zouden knaagdiere binnen 35 dagen gemiteneerd moeten zijn. In geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds

## TARGET SPECIAL

onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (hopen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Lokaasstations dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdiereactiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, overloopplaatsen, halen enz.).

Waar mogelijk moeten de lokaasstations aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.

- Lokaasstations moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen", "bevat een rodenticide", "Target Special '32-0041', 'dithialon' en 'in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum (070 245 245)".

- Wanneer het product in openbare

gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.

- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaasdist.

knaagdiereactiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

- Was de lokaasstations niet met water tussen behandelingsduren.

- Verwijder dode knaagdiere in overeenstemming met lokale verordeningen (Dode knaagdiere moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hietorse gespecialiseerde of vergunde onderneming).

- Knaagdiere kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdiere niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

- Dit product niet direct in de hopen toepassen.

- Wanneer lokaasstations dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssysteem worden geplaatst, zorg er voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

## EERSTE HULP MAATREGELEN

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvles. In

- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doelwijzen.

- Verwijder houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksoverwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

- Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (Latex handschoenen of equivalent, norm EN 374-1:2016).

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.

- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaasstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdiereactiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdiere zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als de beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

- Verwijder het resterende product aan het eind van de behandelperiode.

- Zakjes met het lokaas niet openen.

ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

Tegenlig: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste 10 minuten open houden.

- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond.

Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies innemen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

## INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijder ongetoetste lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale verordeningen (Dode knaagdiere en ongetoetste restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval).

- De lokaasstations dienen [voor muizen - aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen] [voor ratten - pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling] te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de

lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdiere te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

[Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

## Buiten rond gebouwen

Beschermt lokaas tegen weersomstandigheden (bijv. regen, sneeuw enz.). Plaats de lokaasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hietorse gespecialiseerde of vergunde onderneming).

## OPLSLAG

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren. Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

Lot N°: zie elders op de verpakking  
Productiedatum: zie elders op de verpakking  
Houdbaarheid: tot 2 jaar na productie

24 LV 11

Download app!  
Scan this product



2405345

Handelsbenaming/Nom commercial: Target Special  
Toelatingsnr. (België)/N° d'autorisation (Belgique): 2241P

Toelatingshouder/Détenteur d'autorisation: LIPHATECH  
S.A.S. - Bonnel - 47480 PONT-DU-CASSE - FRANKRIJK/  
FRANCE - tél. +33 (0)5 53 69 35 70  
Werkzame stof/Matière active: Difethialon/Diféthialone 25  
mg/kg (0.0025 %) (CAS 104653-34-1)

Aard van het preparaat/Formulation: RB - Lokmiddel (klaar  
voor gebruik)/RB - Appât (prêt à l'emploi)

Product type / Type de produit: PT 14 Rodenticiden/TP14  
Rodenticide

Categorieën gebruikers (Nederland): getrainde  
professionelen

Categorieën gebruikers (België) / Catégorie d'utilisateurs  
(Belgique): professionelen / professionnel

Doelorganisme/Organisme cible: Mus musculus  
(Huismuiss/Souris domestiques), Rattus norvegicus (Bruine  
rat/Rats bruns), Rattus rattus (Zwarte rat/Rat noir)

Toepassingsgebied (Nederland): Binnen; Buiten rond  
gebouwen en voedselopslagplaatsen (alleen rat)

Toepassingsgebied (België) / Usage (Belgique): Binnen,  
Buiten rond gebouwen / Intérieur, Extérieur autour des  
bâtiments.

#### BELGIË

H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij  
langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen,  
met langdurige gevolgen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van  
dit product.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming  
met de geldende nationale/regionale regelgeving.

#### BELGIQUE

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes  
(sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une  
exposition prolongée.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des  
effets néfastes à long terme

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce  
produit.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.

P501 - Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux  
réglementations nationales / régionales applicables.

#### BELGIEN

H373 - Kann die Organe schädigen (blut) bei längerer oder  
wiederholter Exposition.

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger  
Wirkung.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche  
Hilfe hinzuziehen.

P501 - Inhalt und Behälter im Einklang mit allen regionalen  
und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Belgische Antifocentrum: +32 (0)70/245.245 / Centre  
Antipoisons belge: +32 (0)70/245.245

Gevaarlijk voor dieren in het wild. / Dangereux pour la  
faune.

Gevaarlijk voor honden en katten / Dangereux pour les  
chiens et les chats.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar. /  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



24 LV 11

