

NL

Toelatingsnummer : NL-0001066-0000

Enkel voor opgeleide professionele gebruikers

Soort knaagdier	Toepassingsgebied	Dosis/lokaalspunt	Afstand tussen lokaalsonden	
			Grote plaag	Geringe plaag
Huismuur	Binnen	20 tot 50 g	1-15 meter	2-3 meter
Brune rat, zwarte rat	Binnen, buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen	100 tot 200 g	4-5 meter	8-10 meter

GEBRUIKSVORSCHRIFT

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkoopspunt, alvorens het product te gebruiken.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdiere (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfecteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierepopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaal lastiger maakt.
- Lokaalsonden dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdiereactiviteit is waargenomen (bijv. looppurten, voerplaatsen, holen, nesten, enz.).
- Waar mogelijk, moeten de lokaalsonden aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderjdieren en andere niet-doelddiersoorten.
- Verwijder houden van eten, drinken en diervoeder, alsmede van gebruiksvoerwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Voorafgaand aan het gebruik van rotidenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.
- Plaats lokaalsonden niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen.
- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelingsperiode.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfecteerde gebied om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdiere actief

RODETOX THIALON PASTA*, "Diethialon" en "Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum".

- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
- Maak de zakjes die het lokaal bevatten niet open.

Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen

- Vervang lokaal in lokaalsonden waar het lokaal werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- Bescherm lokaal tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...).
- Plaats de lokaalsonden in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- De toepassing ter bestrijding van bruine en zwarte ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het "Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen" door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-Rattenbeheersing.
- RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
- Verwijder ongetoetste lokaal en de verpakking aan het eind van de behandeling.

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holten dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Gebruik bloedverdunnende rotidenticiden niet als permanent lokaal (bijv. ter preventie van knaagdiereplagen of om knaagdiereactiviteit te detecteren).

- Uitsluitend gebruiken in verzegelde lokaalsonden

- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaal 4 tot 10 dagen duren tot bloed verdunnende rotidenticiden effectief zijn.

- Met behulp van dit product zouden knaagdiere binnen 35 dagen geïmuneerd moeten zijn. Gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog

steeds knaagdiereactiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.
- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.
- Gebruik met het oog op resistentiebestrijding geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rotidenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel.

- Reinig tussen het toepassen de lokaalsonden niet met water.

- Dode knaagdiere in plastic verpakking afvoeren naar gespecialiseerde afvalverzamelplaatsen (cf. Eural).

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpauzes de knaagdiere om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen van de desbetreffende best practice code geeft.

- Knaagdiere kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdiere niet met blote handen aan. drag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

- Gebruik het product niet als permanent lokaal ter preventie van knaagdiereplagen of om knaagdiereactiviteit te monitoren.

- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaalbehandelingen.

- Dit product niet direct in de holten toepassen.

- Wanneer lokaalsonden dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringsystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaal met water wordt voorkomen.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inname kan mogelijk met enige vertraging symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloedstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

- blootstelling via de huid: de huid met water en zeep wassen en vervolgens met water en zeep.
 - blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oospoelvoetstof of water; oogleden tenminste 10 minuten open houden;
 - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond.
- Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Bij elke controle en wanneer de opname van lokaal is gestopt, de resten van het lokaal verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar gespecialiseerde afvalverzamelplaatsen (cf. Eural). Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

OPSLAG

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.
- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

Lot N°: zie elders op de verpakking
Productiedatum: zie elders op de verpakking
Houdbaarheid: tot 4 jaar na productie



WAARSCHUWING

Nederland:

Schippers Bladel BV
 Rond Deel 12
 5531 AH Bladel (NL)
 Tel: 0497-339771

België:

Schippers BVBA
 Grents 114
 2370 Arendonk (B)
 Tel: 014-672356

25-10-2019/F



2405390

MS Schippers

Passion for Farming

2405390

MS RODETOX THIALON PASTE

5 kg

BE

N° d'autorisation (Belgique): BE2011-0012

A usage professionnel uniquement

Organismes cibles	Dose par poste d'appâtage	Usage	Distance minimale séparant deux postes	
			Forêt infestation	Faible infestation
Rats bruns, rats noirs,	Jusqu'à 200g	Intérieur et extérieur autour des bâtiments	4-5 mètres	8-10 mètres
Souris domestiques	Jusqu'à 50g		1-1,5 mètres	2-3 mètres

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.

- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.

- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population de rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (comblage des trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

- Les stations d'appât doivent être placées à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée précédemment (par exemple, parcs, sites de nidification, parcs d'enfaissement, trous, terriers, etc.).

- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.

- Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir; contient un rodenticide»; «MS RODETOX THIALON PASTA» ou «BE2011-0012»;

«délithalène» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison [070 245 245]».

- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.

- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.

- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés.

- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.

- Portez des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (Gants en Latex ou équivalent, norme EN 374-1:2016).

- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.

- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.

- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable.

- Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants; dans ce cas,

envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

- Les postes d'appâtage doivent être inspectés (pour les souris - au minimum tous les 2 à 3 jours au) [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin.

- (Le cas échéant) Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

Extérieur (autour des bâtiments):

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

MESURES DE GESTION DE RISQUE:

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation (conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant).

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement (par exemple, au moins deux fois par semaine).

- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.

- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans procéder à une évaluation préalable du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

- Ne pas utiliser d'appât contenant des substances actives anticoagulantes en guise d'appâts permanents pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En

cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

- Ne pas nettoyer les postes d'appâtage à l'eau entre deux applications.

- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale (Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée).

- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pincettes pour les éliminer.

- Ne placer pas directement ce produit dans les terriers.

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité d'eaux de surface (par exemple, de rivières, d'étangs, de cours d'eau, de digues ou de canaux d'irrigation) ou de systèmes d'évacuation des eaux, assurez-vous que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

PREMIERS SECOURS:

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

En cas:

- d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;

- d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes;

- d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-

lui le contenant du produit ou l'étiquette.

Contactez un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION:

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale (l'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée).

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

N° du lot: voir emballage
Date de production: voir emballage
Date limite d'utilisation: date de production + 4 ans

ATTENTION
ACHTUNG

25-10-2016/17

MS Schippers

Passion for Farming

Nederland:

Schippers Bladel BV

Rond Deel 12

5531 AH Bladel (NL)

Tel: 0497-339771

België:

Schippers BVBA

Grens 114

2370 Arendonk (B)

Tel: 014-672356



2405390

BE

Toelatingsnummer : BE2011-0012

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Doelorganismen	Dosis/lokaalpunt	Toepassingsgebied	Afstand tussen lokaalpunten	
			Grote plaag	Geringe plaag
Brumet rat, zwarte rat	tot 200g	Binnen en buiten rond gebouwen	4-5 meter	8-10 meter
Huismuur	tot 50g		1-1,5 meter	2-3 meter

GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkoopspunt, alvorens het product te gebruiken.

- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfecteerde gebied en een beoordeling per plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdiervoer aanwezig is, en om de waarschijnlijkheid oorzak en de ernst van de plaag te achterhalen.

- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdiervoer (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfecteerde gebied niet vast voor de behandeling. Schoon, aangezien dit de knaagdiervoer aantrekt maar verstopt en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holten dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Lokaalstations dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdiervoer is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).

- Waar mogelijk moeten de lokaalstations aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.

- Lokaalstations moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "MS RODETOX THALION

PASTA" of "BE2011-0012"; "difethalon" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum (0 70 2 45 2 45)".

- Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelingsperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.

- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleekt kan worden van de lokaalkaas.

- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderdieren en andere niet-doelsoorten.

- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder, alsmede gebruikvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

- Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (later handschoenen of equivalent, norm EN 374-1:2016).

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.

- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaalstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd

wordt en geen afname in knaagdiervoer wordt waargenomen, moet de waarschijnlijkheid oorzak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdiervoer zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunde rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunde rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelingsperiode.

- Zakjes met het lokaas niet openen.

- De lokaalstations dienen voor muizen - aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 a 3 dagen [voor ratten - pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling] te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaalstations intact zijn en om lijken van knaagdiervoer te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

[Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

Buiten rond gebouwen

Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden (bijv. regen, sneeuw enz.). Plaats de lokaalstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstandigheden (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdiervoerbijdragscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke goet practice code, indien beschikbaar].

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenopzoeken (bijv. ten minste twee keer per week) de knaagdiervoer om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.

- Gebruik lokaas dat werkzaam bloedverdunde stoffen bevat

niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdiervoer op om knaagdiervoer te monitoren.

- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunde rodenticiden effectief zijn.

- Met behulp van dit product zouden knaagdiervoer binnen 35 dagen geïmmineerd moeten zijn. In geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdiervoer waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

- Was de lokaalstations niet met water tussen behandelingen door.

- Verwijder de knaagdiervoer in overeenstemming met lokale verordeningen [Dode knaagdiervoer moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

- Knaagdiervoer kunnen ziekten bij zich dragen. Raak de knaagdiervoer niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

- Dit product niet direct in de hollen toepassen.

- Wanneer lokaalstations dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssytemen worden geplaatst, zorg er voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond.

- Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijder ongetoetste lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale verordeningen [De verpakking en (ongetoetste) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijk afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

OPSLAG

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren. Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

Lot N°: zie elders op de verpakking
Productiedatum: zie elders op de verpakking
Houdbaarheid: tot 4 jaar na productie



WAARSCHUWING

25-10-2010/IF



2405390

MS Schippers

Passion for Farming

Nederland:

Schippers Bladel BV
Rond Deel 12
5531 AH Bladel (NL)
Tel: 0497-339771

België:

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: 014-672356

Handelsbenaming/Nom commercial: MS RODETOX THIALON PASTA

Toelatingsnr. (Nederland): NL-0001066-0000

Toelatingsnr. (België)/N° d'autorisation (Belgique): BE2011-0012

Toelatingshouder/Détenteur d'autorisation: LIPHATECH S.A.S.
- Bonnel - 47480 PONT-DU-CASSE - FRANKRIJK/FRANCE -
tél. +33 (0)5 53 69 35 70

Werkzame stof/Matière active: Difethialon/Diféthialone 25 mg/kg (0.0025 %) (CAS 104653-34-1)

Aard van het preparaat/Formulation: RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)/RB - Appât (prêt à l'emploi)

Product type / Type de produit: PT 14 Rodenticiden/TP14 Rodenticide

Categorieën gebruikers (Nederland): getrainde professionals

Categorieën gebruikers (België) / Catégorie d'utilisateurs (Belgique): professionnels / professionnel

Doelorganisme/Organisme cible: Mus musculus (Huismuur/Souris domestiques), Rattus norvegicus (Bruine rat/Rats bruns), Rattus rattus (Zwarte rat/Rat noir)

Toepassingsgebied (Nederland): Binnen; Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen (alleen rat)

Toepassingsgebied (België) / Usage (Belgique): Binnen, Buiten rond gebouwen / Intérieur, Extérieur autour des bâtiments.

NEDERLAND

H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P501 - Inhoud naar /verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

BELGIË

H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.

BELGIQUE

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.

P501 - Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations nationales / régionales applicables.

BELGIEN

H373 - Kann die Organe schädigen (blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 - Inhalt und Behälter im Einklang mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Belgische Antigifcentrum: +32 (0)70/245.245 / Centre Antipoisons belge: +32 (0)70/245.245

Gevaarlijk voor dieren in het wild. / Dangereux pour la faune.
Gevaarlijk voor honden en katten / Dangereux pour les chiens et les chats.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar. / Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



ATTENTION
ACHTUNG
WAARSCHUWING