

NL

Toelatingsnummer : NL-0000714-0000

Enkel voor opgeleide professionele gebruikers

Soort knaagdier	Toepassingsgebied	Dosis/lokaalpunt	Afstand tussen lokaaldozen	
			Grote plaag	Geringe plaag
Huismuis	Binnen	20 tot 50 g	1-1,5 meter	2-3 meter
Bruine rat, zwarte rat	Binnen, Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen	100 tot 200 g	4-5 meter	8-10 meter

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdiereen (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteeerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierepopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaal lastiger maakt.

- Lokaal dozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdiereactiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

- Verwijder ongegeten lokaal en de verpakking aan het eind van de behandeling.
- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Gebruik bloedverdünnende rodenticiden niet als permanent lokaal (bijv. ter preventie van knaagdiereplagen of om knaagdiereactiviteit te detecteren).
- Uitsluitend gebruiken in verzegelde lokaal dozen.
- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaal 4 tot 10 dagen duren tot bloed verdünnende rodenticiden effectief zijn.
- Met behulp van dit product zouden knaagdiereen binnen 35 dagen geelimineerd moeten zijn. Gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdiereactiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.
- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.
- Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen

- Waar mogelijk moeten de lokaal dozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doel diersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.
- Plaats lokaal dozen niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen.
- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteeerde gebied om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdiereen actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Het lokaal dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaal doos.
- Draag chemisch bestendige handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (Latexhandschoenen of gelijkwaardig, norm EN 374-1: 2016).
- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.

verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.

- Reinig tussen het toepassen de lokaal dozen niet met water.

- Dode knaagdiereen in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamel punten (cf. Eural).

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdiereen om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

- Knaagdiereen kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdiereen niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

- Gebruik het product niet als permanent lokaal ter preventie van knaagdiereplagen of om knaagdiereactiviteit te monitoren.

- Gebruik het product niet in pulsed bathing lokaal behandelingen.

- Dit product niet direct in de holen toepassen.

- Wanneer lokaal dozen dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringsystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaal met water wordt voorkomen.

- Als de inname van het lokaal laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaal dozen naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaal formulering.
- Als het lokaal na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdiereactiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdiereen zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.
- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstandigheden (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierebestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].
- Lokaal dozen moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "MS RODETOX THIALON GRAIN MIX"; "Difethialon" en "Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum".
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden
- Maak de sachets die het lokaal bevatten niet open.
- Plaats het lokaal in het astatuatie met behulp van een doseeraapparaat. Stof te minimaliseren (bijvoorbeeld niet afnemen).

ERSTE HULP MAATREGELEN

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen blootstellingstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van: - blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water afspoelen.

- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.

- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond.

Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Bij elke controle en wanneer de inname van lokaal is gestopt, de resten van het lokaal verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamel punten (cf. Eural). Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

2406102

WAARSCHUWING

**Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen:**

- Vervang lokaal in lokaal dozen waar het lokaal werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- Bescherm lokaal tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaal dozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- De toepassing ter bestrijding van bruine en zwarte ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het 'Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen' door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM- Rattenbeheersing.

OPSLAG

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.
- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

Lot N°: zie elders op de verpakking
Productiedatum: zie elders op de verpakking
Houdbaarheid: tot 2 jaar na productie



BE

N° d'autorisation (Belgique): BE2013-0041

A usage professionnel uniquement

Organismes cibles	Dose par poste d'appâtage	Usage	Distance minimale séparant deux postes	
			Fortes infestation	Faibles infestation
Rats bruns, rats noirs	Jusqu'à 200g	Intérieur et extérieur autour des bâtiments	4-5 mètres	8 - 10 mètres
Souris domestiques	Jusqu'à 50g		1-1.5 mètres	2-3 mètres

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lisez et respectez les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

MESURES DE GESTION DE RISQUE :

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement (par exemple, au moins deux fois par semaine).
- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans procéder à une évaluation préalable du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.
- Ne pas utiliser d'appâts contenant des substances actives anticoagulantes en guise d'appâts permanents pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.
- Ne pas nettoyer les postes d'appâtage à l'eau entre deux applications.
- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale [Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée].

- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Les stations d'appât doivent être placées à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée précédemment (par exemple, parcs, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»;
- «MS RODETOX THIALON GRAIN MIX» ou «BE2013-0041»; «diféthialone» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison [070 245 245]».
- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.
- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.

- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pincettes pour les éliminer.
- Ne pas placer sans directement ce produit dans les terriers.
- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité d'eaux de surface (par exemple, de rivières, d'étangs, de cours d'eau, de digues ou de canaux d'irrigation) ou de systèmes d'évacuation des eaux, assurez-vous que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

PREMIERS SECOURS :

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.
- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.
- En cas:
 - d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;
 - d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes;
 - d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une

Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés.

- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- Portez des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (Gants en Latex ou équivalent, norme EN 374-1:2016).
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable.
- Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés [pour les souris - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5

personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION :

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale [L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée].

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

2406102

ATTENTION
ACHTUNG

à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin.

- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

Extérieur (autour des bâtiments) :

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

N° du lot: voir emballage

Date de production: voir emballage

Date limite d'utilisation: date de production + 2 ans



BE

Telatingsnummer : BE2013-0041
Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Soort knaagdier	Toepassings-gebied	Dosis/lok-aaspunt	Afstand tussen lokaaldozen	
			Grote plaag	Geringe plaag
Huismuis	Binnen	20 tot 50 g	1-1,5 meter	2-3 meter
Bruine rat, zwarte rat	Binnen, Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen	100 tot 200 g	4-5 meter	8-10 meter

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkoopspunt, alvorens het product te gebruiken.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteste gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaal lastiger maakt.
- Lokaaldozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

- Verwijder ongegeten lokaal en de verpakking aan het eind van de behandeling.
- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Gebruik bloedverdünnende rodenticiden niet als permanent lokaal (bijv. ter preventie van knaagdiervlagen of om knaagdiervlactiviteit te detecteren).
- Uitsluitend gebruiken in verzegelde lokaaldozen.
- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaal 4 tot 10 dagen duren tot bloed verdünnende rodenticiden effectief zijn.
- Met behulp van dit product zouden knaagdieren binnen 35 dagen geëlimineerd moeten zijn. Gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdiervlactiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.
- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.
- Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen

- Waar mogelijk moeten de lokaaldozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-dieldiersoorten.
- Verwijder houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.
- Plaats lokaaldozen niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen.
- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelingsperiode.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteste gebied om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Het lokaal dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaldoos.
- Draag chemisch bestendige handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (Latexhandschoenen of gelijkwaardig, norm EN 374-1: 2016).
- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.

verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie doet elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.
- Reinig tussen het toepassen van lokaaldozen niet met water.
- Dode knaagdieren in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamel punten (cf. Eural).
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.
- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Gebruik het product niet als permanent lokaal ter preventie van knaagdiervlagen of om knaagdiervlactiviteit te monitoren.
- Gebruik het product niet in pulsed bathing lokaalbehandelingen.
- Dit product niet direct in de holen toepassen.
- Wanneer lokaaldozen dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringsystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaal met water wordt voorkomen.

- Als de inname van het lokaal laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaldozen naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaalformulering.
- Als het lokaal na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdiervlactiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.
- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdiervlbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].
- Lokaaldozen moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "MS RODETOX THIALON GRAIN MIX"; "Difethalione" en "Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum".
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
- Maak de sachets die het lokaal bevatten niet open.
- Plaats het lokaal in het aasstation met behulp van een doseerapparaat. Stof te minimaliseren (bijvoorbeeld nat ademen).

ERSTE HULP MAATREGELEN

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen blootstellingstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.
Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.
In geval van: - blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water afspoelen.
- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond.
Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Bij elke controle en wanneer de inname van lokaal is gestopt, de resten van het lokaal verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamel punten (cf. Eural). Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

2406102

Waarschuwing

**Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen:**

- Vervang lokaal in lokaaldozen waar het lokaal werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- Bescherm lokaal tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaldozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- De toepassing ter bestrijding van bruine en zwarte ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het 'Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen' door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM- Rattenbeheersing.

OPSLAG

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.
- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

Lot N°: zie elders op de verpakking
Productiedatum: zie elders op de verpakking
Houdbaarheid: tot 2 jaar na productie



Handelsbenaming/Nom commercial:
MS RODETOX THIALON GRAIN MIX

Toelatingsnr. (Nederland): NL-0000714-0000
Toelatingsnr. (België)/N° d'autorisation (Belgique):
BE2013-0041

Toelatingshouder/Détenteur d'autorisation:
LIPHATECH S.A.S. - Bonnel - 47480 PONT-DU-
CASSE - FRANKRIJK/FRANCE - tél. +33 (0)5 53 69
35 70

Werkzame stof/Matière active: Difethialon/
Diféthialone 25 mg/kg (0.0025 %) (CAS 104653-
34-1)

Aard van het preparaat/Formulation: RB -
Lokmiddel (klaar voor gebruik)/RB - Appât (prêt
à l'emploi)

Product type / Type de produit: PT 14
Rodenticiden/TP14 Rodenticide

Categorieën gebruikers (Nederland): getrainde
professionelen

Categorieën gebruikers (België) / Catégorie
d'utilisateurs (Belgique): professionnels /
professionnel

Doelorganisme/Organisme cible: Mus musculus
(Huismuur/Souris domestiques), Rattus
norvegicus (Bruine rat/Rats bruns), Rattus rattus
(Zwarte rat/Rat noir)

Toepassingsgebied (Nederland): Binnen; Buiten
rond gebouwen en voedselopslagplaatsen (alleen
rat)

Toepassingsgebied (België) / Usage (Belgique):
Binnen, Buiten rond gebouwen / Intérieur,
Extérieur autour des bâtiments.

NEDERLAND

H373 - Kan schade aan organen (bloed)
veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.

H412 - Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P501 - Inhoud naar /verpakking afvoeren naar
een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval.

2406102

**ATTENTION
ACHTUNG
WAARSCHUWING**



BELGIË

H373 - Kan schade aan organen (bloed)
veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.

H412 - Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in
overeenstemming met de geldende nationale/
regionale regelgeving.

BELGIQUE

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les
organes (sang) à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.

P501 - Éliminer le contenu/réceptacle
conformément aux réglementations nationales /
régionales applicables.

BELGIEN

H373 - Kann die Organe schädigen (blut) bei
längerer oder wiederholter Exposition.

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen.

P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 - Inhalt und Behälter im Einklang mit allen
regionalen und nationalen Vorschriften der
Entsorgung zuführen.

Belgische Antigifcentrum: +32 (0)70/245.245 /
Centre Antipoisons belge: +32 (0)70/245.245

Gevaarlijk voor dieren in het wild. / Dangereux
pour la faune.

Gevaarlijk voor honden en katten / Dangereux
pour les chiens et les chats.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag
beschikbaar. / Fiche de données de sécurité
disponible sur demande.

