

2409534

RODETOX BRODI WHEAT

10 kg

NL: GEVAAR ! H360D - Kan het ongeboren kind schaden. H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen :
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 - Stof niet inademen. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen. P405 - Achter slot bewaren. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.

Biocide: PT 14 (rodenticide) ; RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Bevat : 0.005% w/w brodifacoum (CAS 56073-10-0) Kaliumsorbaat (CAS 24634-61-5) : 0.2%

DE: Gefahr ! H373 - Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition. H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

Sicherheitshinweise:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P260 Staub nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen Vorschriften, Sammelstelle zuführen.

Biozid: PT 14 (rodenticide)

Produktzusammensetzung : 0.005% w/w brodifacoum (CAS 56073-10-0) Kaliumsorbat (CAS 24634-61-5) : 0.2%

BE-NL: Gevaar ! H360D - Kan het ongeboren kind schaden. H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen :
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 - Stof niet inademen. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen. P405 - Achter slot bewaren. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale regelgeving.

Biocide: PT 14 (rodenticide)

Bevat : 0.005% p/p brodifacoum (CAS 56073-10-0) Kaliumsorbaat (CAS 24634-61-5) : 0.2%

BE-FR: Danger ! H360D - Peut nuire au fœtus. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Précautions :
P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 - Ne pas respirer les poussières. P280 - Porter des gants de protection. P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P405 - Garder sous clef. P501 - Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale.

Biocide: PT 14 (rodenticide)

Contient : 0.005% p/p brodifacoum (CAS 56073-10-0) Sorbate de potassium (CAS 24634-61-5) : 0.2%

FR: Attention ! H360D - Peut nuire au fœtus. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Précautions :
P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 - Ne pas respirer les poussières. P280 - Porter des gants de protection. P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P405 - Garder sous clef. P501 - Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale.

Biocide: PT 14 (rodenticide)

Contient : 0.005% p/p brodifacoum (CAS 56073-10-0) Sorbate de potassium (CAS 24634-61-5) : 0.2%

IT: PERICOLO ! H360D - Può provocare danni al feto. H373 - Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Precauzioni : P201 - Consultare le istruzioni speciali prima dell'uso. P202 - Utilizzare solo dopo aver letto e compreso tutte le precauzioni di sicurezza. P260 - Non respirare la polvere. P280 - Indossare guanti protettivi. P308+P313 - In caso di esposizione (potenziale): chiamare un medico. P314 - In caso di malessere consultare il medico. P405 - Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Biocida : PT 14 (rodenticida) ; RB - Attrattivo (pronto per l'uso)

Contiene : 0,005% p/p di brodifacoum (CAS 56073-10-0) Sorbato di potassio (CAS 24634-61-5): 0,2%.

ES: ¡PELIGRO! H360D - Puede dañar al feto. H373 - Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral).

Precauciones : P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P260 - No respirar el polvo. P280 - Llevar guantes de protección. P308+P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Consultar a un médico. P314 - Consultar a un médico en caso de malestar. P405 - Guardar bajo llave. P501 - Eliminar el contenido/ el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Biocida : PT 14 (rodenticida) ; RB - Atrayente (listo para usar)

Contiene : 0,005% p/p de brodifacoum (CAS 56073-10-0) Sorbato de potasio (CAS 24634-61-5) : 0,2%.

**Gevaar
Danger
Attention
Pericolo
Peligro**



NL Toelatingsnummer : NL-0005185-0000
Uitsluitend voor getrainde professionals

Dosering :
Kant-en-klaar lokaas, moet worden uitgelegd in manipulatiebestedigde lokaasdozen

Tegen muizen (Mus musculus), binnen : 20-30 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 2 meter te zijn.

Tegen bruine ratten (Rattus norvegicus) en zwarte ratten (Rattus rattus), binnen en buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen : 50-100 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 5 meter te zijn. Controleer regelmatig het verbruik van het lokaas en vervang ongeveerd of bedorven lokaas totdat het verbruik ophoudt. Herhaal de behandeling in situaties waar het duidelijk blijkt dat er een nieuwe plaag is (bv. verse sporen of uitwerpselen).

Belangrijk :
Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

- Gebruik van dit product is uitsluitend toegestaan als onderdeel van een IPM-systeem zoals omschreven in de laatste versie van het Handboek IPM Knaagdierbeheersing, door (agrarische) bedrijven en instellingen die gecertificeerd zijn voor IPMknaagdierbeheersing.

- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

Een product van :
ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers 1, 4480 Engis, Belgium, +32 85 519 519

DE Zulassungsnummer: DE-0004617-14
Nur für geschultes Fachpersonal

Dosierung:
Fertige Köder, die in manipulationssicheren Köderboxen auszuliegen sind

Hausmäuse (Mus musculus), Innenbereich und Außenbereich um Gebäude : 20-30g Köder pro Köderstation. Wenn mehr als eine Köderstation benötigt wird, sollte der Mindestabstand zwischen den Köderstationen 2 Meter betragen.

Wanderratten (Rattus norvegicus) und Dachratten (Rattus rattus), Innenbereich, Außenbereich um Gebäude, und Offenes Gelände und Mülldeponien: 50-100g Köder pro Köderstation. Wenn mehr als eine Köderstation benötigt wird, sollte der Mindestabstand zwischen den Köderstationen 5 Meter betragen.

Vergiftungsinformationszentrale
(Deutschland) Notrufnummer : +49 (0) 30 19240

Wichtig!
Lesen Sie vor dem Gebrauch die beiliegende Gebrauchsanweisung.

Zulassungsinhaber:
ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers 1, 4480 Engis, Belgium, +32 85 519 519

BE-NL Toelatingsnummer : BE2013-0034
Alleen voor professioneel gebruik
Ingeedeeld in het Gesloten Circuit

Dosering :
Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations

Tegen muizen (Mus musculus), binnen en buiten rond gebouwen : 20-30g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdoos 2 meter te zijn.

Tegen bruine ratten (Rattus norvegicus) en zwarte ratten (Rattus rattus), binnen en buiten rond gebouwen : 50-100g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdoos 5 meter te zijn.

Advies aan de arts : Belgisch Antificticentrum : 070 245 245

Belangrijk :
Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Een product van :
ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers 1, 4480 Engis, Belgium, +32 85 519 519

BE-FR Numéro d'autorisation : BE2013-0034
Alleen voor professioneel gebruik
Soumis au Circuit Restreint

Dosage :
Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées.

Contre souris (Mus musculus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 20-30g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 2 mètres.

Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 50-100g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 5 mètres.

Indications pour le médecin :
Centre Antipoisons (Belgique) : 070/245.245.

Important :
Lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe avant emploi.

Société responsable de la mise sur le marché :
ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers 1, 4480 Engis, Belgium, +32 85 519 519

FR Numéro d'autorisation : FR-2016-0038
Pour utilisateurs professionnels uniquement

Dosage :
Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées ou dans des points d'appâts couverts et protégés

Contre souris (Mus musculus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 20-30g d'appât par station d'appât, espaces d'un minimum de 2 mètres.

Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus), usage intérieur, extérieur autour des bâtiments, et zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries : 50-100g d'appât par station d'appât, espaces d'un minimum de 5 mètres.

Dosage du produit, précautions d'usage: voir emballage

Indications pour le médecin :
Centre antipoisons (France) : 01 45 42 59 59

Important :
Lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe avant emploi.

Société responsable de la mise sur le marché :
ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers 1, 4480 Engis, Belgium, +32 85 519 519

IT Numero di autorizzazione : IT/2023/00888/
MMS
Solo per professionisti qualificati

Dosaggio:
esca pronta per l'uso per impiego contenitori per esche a prova di manomissione.

Contro i topi (Mus musculus), al chiuso
20-30 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 2 metri l'uno dall'altro.

Contro i ratti bruni (Rattus norvegicus) e i ratti neri (Rattus rattus), all'interno e all'esterno degli edifici e delle aree di stoccaggio degli alimenti. 50-100 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro. Controllare regolarmente il consumo dell'esca e sostituire l'esca consumata o avariata finché il consumo non cessa. Ripetere il trattamento se si riscontrano indizi di una nuova infestazione.

Numero di emergenza: 06 4997 8000 (Centro Antivenefici di Roma)

Importante:
prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso allegate.

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione: ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers 1, 4480 Engis, Belgio, +32 85 519 519

Número de autorización : Sólo para profesionales formados

Dosificación : Cebo listo para usar, debe colocarse en cajas de cebo a prueba de manipulaciones

Contra los ratones (Mus musculus), en interiores: 20-30 g de cebo por caja de cebo. Si se necesita más de una caja de cebos, la distancia mínima entre ellas debe ser de 2 metros.

Contra la rata parda (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus), en el interior y en el exterior alrededor de los edificios y de las zonas de almacenamiento de alimentos: 50-100 g de cebo por caja de cebo. Si se necesita más de una caja de cebos, la distancia mínima entre ellas debe ser de 5 metros. Compruebe regularmente el consumo de cebo y sustituya el cebo comido o estropeado hasta que cese su consumo. Repetir el tratamiento en situaciones en las que sea evidente que hay una nueva infestación (por ejemplo, esporas o excrementos frescos).

Consejo para el médico:
Centro Nacional de Información sobre Intoxicaciones - Número de emergencia +31 30 274 88 88

Importante: Antes de utilizarlo, lea las instrucciones de uso adjuntas.

Un producto de : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuilliers 1, 4480 Engis, Belgica, +32 85 519 519

UFI : UTAC-2AoH-AN5E-MozC



Agro Pest Control

Agro Pest[®]Control
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert



2409534

25 LV 06