

NL
GEVAAR ! H360D - Kan het ongeboren kind schaden. H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen : P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 - Stof niet inademen. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen. P405 - Achter slot bewaren. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.

Biocide : PT 14 (rodenticide) ; RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Bevat : 0.005% w/w brodifacoum (CAS 56073-10-0) Kaliumsorbaat (CAS 24634-61-5) : 0.2%

Belangrijk : Vóór het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Toelatingsnummer : NL-0005185-0000
Uitsluitend voor getrainde professionals

BE-NL
GEVAAR ! H360D - Kan het ongeboren kind schaden. H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen : P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 - stof niet inademen. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen. P405 - Achter slot bewaren. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale regelgeving.

Advies aan de arts : Belgisch Antigifcentrum : 070 245 245

Biocide : PT 14 (rodenticide)

Bevat : 0.005% p/p brodifacoum (CAS 56073-10-0) Kaliumsorbaat (CAS 24634-61-5) : 0.2%

Belangrijk : Vóór het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Toelatingsnummer : BE2013-0034
Alleen voor professioneel gebruik
Ingedeeld in het Gesloten Circuit

BE-FR
Danger ! H360D - Peut nuire au fœtus. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Précautions : P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 - Ne pas respirer les poussières. P280 - Porter des gants de protection. P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale.

Indications pour le médecin : Centre Antipoisons (Belgique): 070/245.245.

Biocide : PT 14 (rodenticide)

Contient : 0.005% p/p brodifacoum (CAS 56073-10-0) Sorbate de potassium (CAS 24634-61-5) : 0.2%

Important : Lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe avant emploi.

Numéro d'autorisation : BE2013-0034
Pour utilisateurs professionnels uniquement
Soumis au Circuit Restreint

FR
Attention ! H360D - Peut nuire au fœtus. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Précautions : P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 - Ne pas respirer les poussières. P280 - Porter des gants de protection. P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale.

Indications pour le médecin : Centre antipoisons (France) : 01 45 42 59 59

Biocide : PT 14 (rodenticide)

Contient : 0.005% p/p brodifacoum (CAS 56073-10-0) Sorbate de potassium (CAS 24634-61-5) : 0.2%

Important : Lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe avant emploi.

Numéro d'autorisation : FR-2016-0038
Pour utilisateurs professionnels uniquement

ES
¡PELIGRO! H360D - Puede dañar al feto. H373 - Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral).

Precauciones : P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P260 - No respirar el polvo. P280 - Llevar guantes de protección. P308+P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Consultar a un médico. P314 - Consultar a un médico en caso de malestar. P405 - Guardar bajo llave. P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Consejos para el médico : Centro Nacional de Información sobre Intoxicaciones : Número de emergencia +31 30 274 88 88

Biocida : PT 14 (rodenticida) ; RB - Atrayente (listo para usar)

Contiene : 0,005% p/p de brodifacoum (CAS 56073-10-0) Sorbato de potasio (CAS 24634-61-5) : 0,2%.

Importante: Lea las instrucciones de uso adjuntas antes de utilizarlo.

Número de autorización :
Sólo para profesionales formados

IT
PERICOLO ! H360D: Può nuocere al feto. H373: Può provocare danni agli organi sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta orale.

Consigli di prudenza: P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260: Non respirare polvere. P280: Indossare guanti. P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico. P314: Consultare un medico in caso di malessere. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il recipiente in conformità della normativa in vigore.

Numero di emergenza: 06 4997 8000 (Centro Antiveneni di Roma)

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione: ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgio, +32 85 519 519

Prodotto biocida, Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

Tipo di formulazione: RB Esca (pronta per l'uso)

Principio attivo : 0.005% w/w brodifacoum (CAS 56073-10-0)

Numero di autorizzazione: IT/2023/00888/MRS
Categoria di utilizzatori : professionale



Gevaar
Danger
Attention
Pericolo
Peligro

Dosering : Kant-en-klaar lokaas, moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen

Tegen muizen (Mus musculus), binnen : 20-30 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 2 meter te zijn.

Tegen bruine ratten (Rattus norvegicus) en zwarte ratten (Rattus rattus), binnen en buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen : 50-100 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 5 meter te zijn. Controleer regelmatig het verbruik van het lokaas en vervang opgegeten of bedorven lokaas totdat het verbruik ophoudt. Herhaal de behandeling in situaties waar het duidelijk blijkt dat er een nieuwe plaag is (bv. verse sporen of uitwerpselen).

Dosering : Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations

Tegen muizen (Mus musculus), binnen en buiten rond gebouwen : 20-30g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 2 meter te zijn.

Tegen bruine ratten (Rattus norvegicus) en zwarte ratten (Rattus rattus), binnen en buiten rond gebouwen : 50-100g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 5 meter te zijn.

Dosage : Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées.

Contre souris (Mus musculus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 20-30g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 2 mètres.

Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 50-100g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 5 mètres.

Dosage : Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées ou dans des points d'appâts couverts et protégés

Contre souris (Mus musculus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 20-30g d'appât par station d'appât, espaces d'un minimum de 2 mètres.

Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus), usage intérieur, extérieur autour des bâtiments, et zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries : 50-100g d'appât par station d'appât, espaces d'un minimum de 5 mètres.

Dosage du produit, précautions d'usage: voir emballage

Dosificación : Cebo listo para usar, debe colocarse en cajas de cebo a prueba de manipulaciones

Contra los ratones (Mus musculus), en interiores: 20-30 g de cebo por caja de cebo. Si se necesita más de una caja de cebos, la distancia mínima entre ellas debe ser de 2 metros.

Contra la rata parda (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus), en el interior y en el exterior alrededor de los edificios y de las zonas de almacenamiento de alimentos: 50-100 g de cebo por caja de cebo. Si se necesita más de una caja de cebos, la distancia mínima entre ellas debe ser de 5 metros. Compruebe regularmente el consumo de cebo y sustituya el cebo comido o estropeado hasta que cese su consumo. Repetir el tratamiento en situaciones en las que sea evidente que hay una nueva infestación (por ejemplo, esporas o excrementos frescos).

Dosaggio: Esca pronta per l'uso per impiego contenitori per esche a prova di manomissione.

Topi (Mus musculus) all'interno d'edifici, all'aperto e intorno agli edifici : 20-30 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 2 metri l'uno dall'altro.

Ratti (ratto delle chiaviche Rattus norvegicus, ratto nero Rattus rattus), all'interno d'edifici, all'aperto e intorno agli edifici : 50-100 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro. Controllare regolarmente il consumo dell'esca e sostituire l'esca consumata o avviata finché il consumo non cessa. Ripetere il trattamento se si riscontrano indizi di una nuova infestazione.

