

2409540

MS RODETOX BRODI BLOCKS

5 kg e

**GEBRAUCHSFERTIGER BLOCKKÖDER ZUR BEKÄMPFUNG DER WANDERRATTE UND DER HAUSMAUS
NUR FÜR DIE ANWENDUNG IN UND UM GEBÄUDEN DURCH SACHKUNDIGE VERWENDER UND BERUFSMÄSSIGE
VERWENDER MIT SACHKUNDE. Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen**

ANGABEN FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Die Kriterien einer guten fachlichen Anwendung von Fraßködern bei der Nagetierbekämpfung sind einzuhalten. Gefährlich für Wildtiere.

PRODUKTINFORMATION

MS RODETOX BRODI BLOCKS ist ein gebrauchsfertiger Blockköder (25 g Blöcke) mit Brodifacoum zur Bekämpfung von Mäusen und Ratten (*Rattus Norvegicus* und *Mus Musculus* – Jungtiere und erwachsene Tiere), der schon nach einmaliger Aufnahme wirksam ist. Der Tod der Nager erfolgt wenige (3 – 5) Tage nach der Aufnahme, ohne dass ein Verdacht bei den anderen Nagern in der Kolonie entsteht. MS RODETOX BRODI BLOCKS enthält eine ausgewogene Mischung von für Nager attraktiven Zutaten und enthält auch den Bitterstoff Denatoniumbenzoat, um zu helfen, die versehentliche Aufnahme durch Menschen zu verhindern.

ANWENDUNG

Anwendungsbereich:

In und um Gebäuden

Gebrauchsanweisung: Köder in den unten angegebenen Aufwandmengen in Köderstationen auslegen. Nur in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht zugänglich sind, ist eine Köderauslegung ohne Köderstation zulässig. Bei der Auswahl des Rodentizids sollten Resistenzen bei den Zielorganismen in Betracht gezogen werden. Die allgemeinen Kriterien einer guten fachlichen Anwendung von Fraßködern bei der Nagetierbekämpfung mit Antikoagulantien müssen beachtet werden: siehe beiliegendes Merkblatt. **Aufwandmenge:** Berufsmäßiger Verwender mit Sachkunde und/oder sachkundiger Verwender Aufwandmenge für den Zielorganismus Hausmaus: Anwendung in und um Gebäuden

- Geringer Befall: bis 50 g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle im Abstand von 5 Metern - Starker Befall: bis 50 g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle im Abstand von 2 Metern Aufwandmenge für den Zielorganismus Wanderratte: Anwendung in und um Gebäuden
- Geringer Befall: bis 100 g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle im Abstand von 10 Metern
- Starker Befall: bis 100 g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle im Abstand von 5 Metern

ERSTE-HILFE-MAGNAHMEN

Das Produkt enthält Brodifacoum, ein Antikoagulant, das Blutungen hervorrufen kann. Der Beginn der Blutungen kann einige Tage nach der Exposition auftreten. Wenn es keine aktive Blutung gibt, sollte der INR (Prothrombinszeit) direkt und noch 48-72 Stunden nach der Exposition gemessen werden. Wenn die INR größer als 4 ist, 5-10 mg Vitamin K1 (Phytonadion) durch langsame intravenöse Injektion (100 µg/kg Körpergewicht für ein Kind) verabreichen. Die Behandlung mit Phytonadion (oral oder intravenös) kann für einige Wochen erforderlich sein. Berücksichtigen Sie den Rat der örtlichen Gifteinformationszentrale, insbesondere dann, wenn aktive Blutungen auftreten. **Gegenmittel: Vitamin K (unter ärztlicher Kontrolle).**

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Nagetiere können Krankheiten übertragen (z.B. Leptospirose). Bei der Handhabung/Entsorgen der Köder und Tierkadaver immer Schutzhandschuhe tragen. Hände und betroffene Hautpartien vor dem Essen und nach Arbeitsende mit viel Wasser und Seife waschen. Nachfolgende Schutzmaßnahmen sind umzusetzen, sofern sie nicht durch technische und / oder organisatorische Maßnahmen ersetzt werden können: Das Produkt darf ausschließlich von sachkundigen Verwendern und berufsmäßigen Verwendern mit Sachkunde angewendet werden. Es müssen geeignete Schutzhandschuhe (EN374) getragen werden.

Empfehlung: Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril für den einmaligen Gebrauch, Kat. 3, EN374, Schichtstärke mindestens 0,11 mm, Durchbruchzeit > 480 Minuten, z.B. Einmalschutzhandschuhe „Dermatril® 740“ der Firma KCL. Die Einmalschutzhandschuhe sind nach einmaligem Gebrauch zu entsorgen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN UND HALTBARKEIT

Das Produkt in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Das Produkt lichtgeschützt aufbewahren. Die Haltbarkeit des Produktes beträgt 24 Monate.

HINWEISE FÜR DIE SICHERE BESEITIGUNG DES PRODUKTES UND SEINER VERPACKUNG

Reste des Biozidprodukts sind unter Beachtung der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) und der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Biozidprodukt in Originalbehälter belassen. Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Nicht restentleerte Behälter sind der Chemikalie entsprechend zu behandeln.

BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.

MS RODETOX BRODI BLOCKS – Rodentizider gebrauchsfertiger Blockköder (Produkt Typ PT14)

Enthält:

Brodifacoum (CAS N° 56073-10-0), 0,05 g/kg (= 0,005%)

GEFAHRENHINWEISE H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H373 Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition. **SICHERHEITSHINWEISE** P280 Schutzhandschuhe tragen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Ergänzende Informationen:

ZULASSUNGSNUMMER: DE-0011491-14
EUH208 Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Inhaber der Zulassung/Lieferant: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Italien – Tel. +39 049 9597737

NUR FÜR GEWERBLICHE ANWENDER



ZULASSUNGSNUMMER: DE-0011491-14

04-08-2020/F

MS Schippers
Passion for farming

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

Europe:
Schippers Europe BV
Rond Deel 12
5531 AH Bladel (NL)
Tel: +31(0)497-339 779

Verw. bis:

Charge:

Inhalt: 5 Kg

Vertrieb durch:

Download app!
Scan this product



2409540