

2409544

MS RODETOX

Brodi Weizen

5 kg e

GEBRAUCHSFERTIGER WEIZENKÖDER ZUR BEKÄMPFUNG DER WANDERRATTE UND DER HAUSMAUS
NUR FÜR DIE ANWENDUNG IN UND UM GEBÄUDEN DURCH SACHKUNDIGE VERWENDER UND BERUFSMÄSSIGE
VERWENDER MIT SACHKUNDE **Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen**

WIRKSTOFF

Brodifacoum (CAS Nr. 56073-10-0) 0,05 g/kg (= 0,005%)

ANGABEN FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Unter Verschluss aufbewahren. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Die Kriterien einer guten fachlichen Anwendung von Fraßködern bei der Nagetierbekämpfung sind einzuhalten. Gefährlich für Wildtiere.

PRODUKTINFORMATION

MS RODETOX BRODI WEIZEN ist ein gebrauchsfertiger Weizenköder mit Brodifacoum zur Bekämpfung von Mäusen und Ratten (*Rattus Norvegicus* und *Mus Musculus* – Jungtiere und erwachsene Tiere), der schon nach einmaliger Aufnahme wirksam ist. Der Tod der Nager erfolgt wenige (3 – 5) Tage nach der Aufnahme, ohne dass ein Verdacht bei den anderen Nagern in der Kolonie entsteht. MS RODETOX BRODI WEIZEN enthält eine ausgewogene Mischung von für Nager attraktiven Zutaten und enthält auch den Bitterstoff Denatoniumbenzoat, um zu helfen, die versehentliche Aufnahme durch Menschen zu verhindern.

ANWENDUNG

Anwendungsbereich:

In und um Gebäuden

Gebrauchsanweisung:

Köder in den unten angegebenen Aufwandmengen in Köderstationen auslegen. Nur in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht zugänglich sind, ist eine Köderausslegung ohne Köderstation zulässig. Bei der Auswahl des Rodentizids sollten Resistenzen bei den Zielorganismen in Betracht gezogen werden. Die allgemeinen Kriterien einer guten fachlichen Anwendung von Fraßködern bei der Nagetierbekämpfung mit Antikoagulantien müssen beachtet werden; siehe beigefügtes Merkblatt.

Aufwandmenge:

Berufsmäßiger Verwender mit Sachkunde und/oder sachkundiger Verwender

Aufwandmenge für den Zielorganismus Hausmaus: Anwendung in und um Gebäuden

- Geringer Befall: bis 50 g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle im Abstand von 5 Metern

- Starker Befall: bis 50 g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle im Abstand von 2 Metern

Aufwandmenge für den Zielorganismus Wanderratte: Anwendung in und um Gebäuden

- Geringer Befall: bis 100 g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle im Abstand von 10 Metern

- Starker Befall: bis 100 g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle im Abstand von 5 Metern

ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Das Produkt enthält Brodifacoum, ein Antikoagulant, das Blutungen hervorrufen kann. Der Beginn der Blutungen kann einige Tage nach der Exposition auftreten. Wenn es keine aktive Blutung gibt, sollte der INR (Prothrombinzeit) direkt und nach 48-72 Stunden nach der Exposition gemessen werden. Wenn die INR größer als 4 ist, 5-10 mg Vitamin K1 (Phytomenadion) durch langsame intravenöse Injektion (100 µg/kg Körpergewicht für ein Kind) verabreichen. Die Behandlung mit Phytomenadion (oral oder intravenös) kann für einige Wochen erforderlich sein. Berücksichtigen Sie den Rat der örtlichen Gifteinformationszentrale, insbesondere dann, wenn aktive Blutungen auftreten. Gegenmittel: Vitamin K (unter ärztlicher Kontrolle).

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Nagetiere können Krankheiten übertragen (z.B. Leptospirose). Bei der Handhabung/Entsorgen der Köder und Tierkadaver immer Schutzhandschuhe tragen. Hände und betroffene Hautpartien vor dem Essen und nach Arbeitsende mit viel Wasser und Seife waschen. Nachfolgende Schutzmaßnahmen sind umzusetzen, sofern sie nicht durch technische und / oder organisatorische Maßnahmen ersetzt werden können:

Das Produkt darf ausschließlich von sachkundigen Verwendern und berufsmäßigen Verwendern mit Sachkunde angewendet werden. Es müssen geeignete Schutzhandschuhe (EN374) getragen werden. Empfehlung: Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril für den einmaligen Gebrauch, Kat. 3, EN374, Schichtstärke mindestens 0,11 mm, Durchbruchzeit > 480 Minuten, z.B. Einmalschutzhandschuhe „Dermatril® 740“ der Firma KCL. Die Einmalschutzhandschuhe sind nach einmaligem Gebrauch zu entsorgen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN UND HALTBARKEIT

Das Produkt in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Das Produkt lichtgeschützt aufbewahren.

HINWEISE FÜR DIE SICHERE BESEITIGUNG DES PRODUKTES UND SEINER VERPACKUNG

Reste des Biozidprodukts sind unter Beachtung der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) und der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Biozidprodukt in Originalbehälter belassen. Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Nicht restentleerte Behälter sind der Chemikalie entsprechend zu behandeln.

ZULASSUNGSNUMMER: DE-0010460-14 - Inhaber der Zulassung: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Italien – Tel. +39 049 9597785

BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.

Passion for Farming

MS Agro Pest Control

Verw. bis:

Charge:

Inhalt: 5 Kg

Vertrieb durch:



SCHIPPERS GmbH

Kölner Straße 62

47647 Kerken (D)

Tel: 02833 – 923 60

Fax: 02833 – 923 611

13-07-2015/F



BAUA Reg.Nr.: N-28085