

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di crema

2409858

IT: Indicazioni di pericolo: H360D Può nuocere al feto. H373 Può provocare danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **Consigli di prudenza:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti protettivi. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 Smaltire contenuto e contenitore nei rifiuti speciali secondo le normative nazionali. **NL: Gevarenaanduidingen:** H360D Kan het ongeboren kind schaden. H373 Kan schade aan organen <bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. **Veiligheidsaanbevelingen:** P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft - P280 Beschermende handschoenen dragen. P308+P313 NA blootstelling of mogelijke blootstelling: een arts raadplegen P501 Inhoud/verpakking volgens de nationale voorschriften afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

Pericolo
Gevaar

Brodimax Crema uso professionale

Interno ed esterno, intorno case ed edifici

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 Brodifacoum (CAS: 56073-10-0) 0,005 g
 Denatonium Benzoate 0,001 g
 Sostanze appetibili e coformulanti q.b a g 100

USO RISTRETTO AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI.

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della Salute n.
 IT/2017/00419/AUT

Titolare dell'autorizzazione

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l., Via Brigata
 Marche, 129 - 31030 Carbonera (TV) - Tel. + 39
 0422 445455 - Fax +39 0422 398244 - e-mail:
 question@mayerbraun.com

Prodotto, confezionato, controllato e distribuito da:

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l. - Via Brigata
 Marche, 129 - 31030 Carbonera (TV)

Confezioni: vedi a lato

Validità: 24 mesi

Lotto n. del

vedi a lato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MECCANISMO D'AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitor antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti.

SINTOMI: a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'inibizione massiva della vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi.

TERAPIA: in caso di ingestione di quantità rilevanti di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se l'attività protrombinica risulta ridotta somministrare vitamina K. Concordare il protocollo terapeutico

con un Centro Antiveneni.

CONTROINDICAZIONI: anticoagulanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BRODIMAX CREMA è un'esca pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante efficace per il controllo di topi e ratti di ogni specie. L'ingestione di una piccola quantità di esca causa la morte di ogni animale intossicato nel volgere di qualche giorno, anche dopo una singola ingestione, senza creare allarme o destare sospetto negli altri componenti della colonia. Grazie alla sua appetibilità e forma fisica **BRODIMAX CREMA** è efficace anche dove altre forme di esca non hanno ottenuto successo.

BRODIMAX CREMA contiene una sostanza amariante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

ORGANISMO TARGET/S

Topolino domestico (Mus musculus)
 Ratto grigio (Rattus norvegicus)

MODALITÀ APPLICATIVE

BRODIMAX CREMA è particolarmente indicato in presenza di forti infestazioni in ambienti dove si ha la presenza di alimenti particolarmente attrattivi, per esempio mangimifici, allevamenti, stalle, scuderie e aziende agricole. Può essere usato all'interno ed intorno a edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini.

INDICAZIONI PER L'USO

Il prodotto è pronto all'uso sottoforma di crema e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati.

Confezionamento in secchio

Nel caso di confezionamento in secchio erogare la crema tramite l'apposito dosatore presente nel coperchio del secchio direttamente nell'appropriato contenitore evitando ogni forma di contatto del prodotto con l'operatore. La crema deve essere erogata all'interno di un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza.

La consistenza del prodotto è sensibile alla temperatura, si consiglia di conservarlo a temperatura ambiente. In caso di basse temperature si consiglia di tenere il prodotto a temperatura ambiente per almeno 2 ore prima dell'applicazione per facilitarne l'estrusione.

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Uso #1 interno per topi e ratti

Esca in pasta pronta all'uso che deve essere usata per la derattizzazione all'interno di ogni ambiente domestico, civile (abitazioni, cantine, garage, ripostigli, edifici rurali e giardini di proprietà), rurale, edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi) e ambienti dove si ha la presenza di alimenti particolarmente attrattivi per esempio mangimifici, allevamenti, stalle, scuderie e aziende agricole

Uso #2 esterno, intorno edifici per topi e ratti

Esca in pasta pronta all'uso che deve essere usata per la derattizzazione all'esterno ed intorno agli edifici di ogni ambiente domestico, civile (abitazioni, cantine, garage, ripostigli, edifici rurali e giardini di proprietà), rurale, edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi) e ambienti dove si ha la presenza di alimenti particolarmente attrattivi per esempio mangimifici, allevamenti, stalle, scuderie e aziende agricole

DOSI DI APPLICAZIONE

Le dosi consigliate sono:

• Per i ratti usare fino a 100 g di esca. Posizionare i punti esca distanziati di 10 m e ridurli a 5 per infestazione maggiori (60-100 g x 10 mq). Non muovere o disturbare i punti esca per diversi

giorni dopo aver piazzato le esche.

• Per i topi usare 10-20 g di esca. Piazzare i punti esca ogni 5 metri riducendoli a 2 m in caso di infestazioni maggiori (40 g x 10 mq).

AVVERTENZE

Le esche devono essere posizionate in siti sicuri e non accessibili, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinare via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante. Non riutilizzare la confezione vuota e non disperderla nell'ambiente ma eliminarla in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un Centro Antiveneni. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o l'etichetta.

ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità ritardata di azione, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere da 4 a 10 giorni per essere efficaci dopo il consumo effettivo dell'esca.

I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude, utilizzare i guanti o usare utensili come le pinze quando li disponete.

Questo prodotto contiene un agente amariante e un colorante.

Batch number/ numéro de lot/
 Chargennummer/ número de lote/
 numero di lotto/ Batchnummer

Date of production/
 Productiedatum/ Datum der
 Herstellung/ fecha de fabricación/
 data di produzione/
 Produktionsdato

21 LV 04

