TOMCAT® BLOX HAWK® BLOX

NOTRAC® BLOX™

Bromadiolon | Bromadiolone
0,05 g/kg (0,005% w/w)
28g Blox

NL BE

Aanvullende folder
Aanvullende instructies voor gebruik en gebruiksbeperkingen

BE

Dépliant supplémentaire
Instructions supplémentaires d'utilisation et restrictions d'utilisation

DK

Ekstra brochure
Yderligere instruktioner i brug og begrænsninger for brug

SE

Ytterligare broschyr
Ytterligare instruktioner för användning och begränsningar för användning

NO

Ekstra brosjyre
Tilleggsinstruksjoner for bruk og begrensninger for bruk

6794-2 051923

TOMCAT® BLOX HAWK® BLOX

NOTRAC® BLOX™

Bromadiolon | Bromadiolone
0,05 g/kg (0,005% w/w)
28g Blox

NL BE

Aanvullende folder
Aanvullende instructies voor gebruik en gebruiksbeperkingen

BE

Dépliant supplémentaire
Instructions supplémentaires d'utilisation et restrictions d'utilisation

DK

Ekstra brochure
Yderligere instruktioner i brug og begrænsninger for brug

SE

Ytterligare broschyr
Ytterligare instruktioner för användning och begränsningar för användning

NO

Ekstra brosjyre
Tilleggsinstruksjoner for bruk og begrensninger for bruk

6794-2 051923

NL - TOMCAT BLOX | HAWK BLOX

LEES VOOR GEBRUIK HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.

TOMCAT BLOX | HAWK BLOX is een kant-en-klaar paraffineblok lokaas (PT 14) voor de bestrijding van huismuizen (*Mus musculus*) en bruine ratten (*Rattus norvegicus*) binnen, en bruine ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen, en in riolen.

Gebruik biociden veilig en duurzaam.

Niet te koop voor het grote publiek

Uitsluitend bestemd voor opgeleide professionele gebruikers.

TOMCAT BLOX | HAWK BLOX is een kant-en-klaar lokaas voor de professionele bestrijding van:

1) **Bruine ratten (*Rattus norvegicus*) / Huismuizen (*Mus musculus*) – binnenshuis.**
2) **Bruine ratten (*Rattus norvegicus*) – om gebouwen en voedselopslagplaatsen.**
3) **Bruine ratten (*Rattus norvegicus*) – in riolen**

Gebruiksvoorschrift:

Gebruik van dit product is uitsluitend toegestaan als onderdeel van een IPM-systeem zoals omschreven in de laatste versie van het 'Handboek IPM Knaagdierbeheersing', door (agrarische) bedrijven en instellingen die gecertificeerd zijn voor IPM Knaagdierbeheersing.

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).

Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.

Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden.

Lokdozen moeten met de volgende informatie geëtiketteerd worden: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een knaagdierenverdelgingsmiddel"; "productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof(fen)" en "na (mogelijke) blootstelling een arts of dierenarts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)".

Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaasdoos.

Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (EN norm 374 1:2003).

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.

De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen inzicht van de gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.

Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaasdozen naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet- bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

Indien u ratten heeft gesignaleerd, meld dit op www.rivm.nl/rattenmonitor

Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.

Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

Bestrijding van huismuizen en ratten binnen:

Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen.

Gebruik tegen muizen: Plaats 5 - 28 g lokaas per lokaasdoos met een tussenafstand van 2 tot 4 meter.

Gebruik tegen ratten: Plaats 4 tot 10 blokken van 28 g per lokaasdoos met een tussenafstand van 5 tot 10 meter.

Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

Bestrijding van ratten buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen:

Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in manipulatiebestendige lokaasdozen.

Gebruik tegen ratten: Plaats 4 tot 10 blokken van 28 g per lokaasdoos met een tussenafstand van 5 tot 10 meter.

Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

Vervang lokaas in lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.

Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen.

Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

Dit product niet direct in de holen toepassen.

Wanneer lokaasdozen dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

Bestrijding van bruine ratten in riolen:

Kant-en-klaar lokaas om vast te leggen of toe te passen in lokaasdozen om te voorkomen dat het lokaas in contact komt met afvalwater.

Gebruik tegen ratten: Plaats 4 tot 10 blokken van 28 g per mangat.

Lokaas moet zodanig worden toegepast dat het niet in contact komt met water en niet weggespoeld wordt.

Plaats lokaas alleen in rioolstelsels die verbonden zijn met de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

Risicobeperkende maatregelen:

Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan worden vermoed.

Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.

Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel.

Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water.

Dode knaagdieren in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural).

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen:

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

Tegengif: vitamine K_1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

- **Blootstelling via de huid:** de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
- **Blootstelling van de ogen:** ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
- **Blootstelling via de mond:** de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen.

Neem contact op met een dierenarts in geval van inslikken door een huisdier. ◆

NL0523

BE - TOMCAT BLOX | HAWK BLOX

LEES VOOR GEBRUIK DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN.

Voor professioneel gebruiker en professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid.

TOMCAT BLOX / HAWK BLOX is een lokmiddel klaar voor gebruik. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bruine ratten (*Rattus norvegicus* en muizen (*Mus musculus*) binnenshuis, en buitenshuis rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen, en voor bruine ratten (*Rattus norvegicus*) in open gebieden buiten, op vuilstortplaatsen en/of riolen.

Gebruiksinstructies:

Bestrijding van muizen en bruine ratten binnen en rondom gebouwen

Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasdozen.

Muizen: 28g lokaas per lokaasdoos, om de 2 à 4 meter.

Ratten: 2-8 28g lokaas per lokaasdoos, om de 5 à 10 meter.

Bestrijding van bruine ratten in open gebieden buiten en bij vuilstortplaatsen

Dit gebruik is gereserveerd voor professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid.

Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde aasstations.

Ratten: 2-8 28g lokaas per lokaasdoos, om de 5 à 10 meter.

Bestrijding van bruine ratten in riolen

Dit gebruik is gereserveerd voor professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid.

Kant-en-klaar lokaas om vast te leggen of toe te passen in lokaaskisten op overdekte en beschermde lokaaspunten om te voorkomen dat het lokaas in contact komt met afvalwater.

Ratten: 2-8 28g lokaas per mangat.

Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.

Specifieke gebruiksinstructies:

Bestrijding van muizen en bruine ratten binnen, en buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen een bruine ratten in open gebieden buiten en bij vuilstortplaatsen

Bescherm het aas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. Regen, sneeuw, enz.). Plaats aasstations in gebieden die waarschijnlijk niet worden overstroomd.

Muizen: lokaasstations moeten ten minste elke 2 tot 3 dagen aan het begin van de behandeling worden geïnspecteerd, daarna ten minste eenmaal per week, om te controleren of het aas is geaccepteerd en de posten er wordt niet geknoeid met knagen en het verwijderen van lijken van knaagdieren. Laad zo nodig het aasstation opnieuw.

Ratten: Lokaasstations moeten alleen worden geïnspecteerd binnen 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling, daarna ten minste eenmaal per week daarna, om te controleren of aas wordt geaccepteerd en of aasstations niet worden gemanipuleerd. Verwijder lijken van knaagdieren. Laad zo nodig het aasstation opnieuw.

Houd rekening met alle aanvullende instructies die door de relevante praktijkcode worden verstrekt.

Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode.

Vervang aas in de lokaasstations als het is veranderd door water of vervuild is met vuil.

Voor gebruik rond gebouwen en voedselopslagplaatsen moeten lokaaspunten worden afgedekt en op strategische plaatsen worden geplaatst om de blootstelling aan niet-doelsoorten tot een minimum te beperken.

Bestrijding van bruine ratten in riolen

Lokaas moet zodanig worden toegepast dat het niet in contact komt met water en niet weggespoeld wordt.

Algemene aanwijzingen voor professionele gebruikers en professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.

Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.

Waar mogelijk moeten lokaasstations aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.

Lokaasstations moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden.

Het lokaas dient te worden vastgemaakt zodat het niet kan worden weggesleept van het aasstation.

Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen.

Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (Norm EN 374-1 :2003).

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

Als de inname van het lokaas relatief laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van lokaasstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve bestrijdingsmaatregel.

Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

Lokaasstations dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).

Algemene aanwijzingen, specifiek voor professionele gebruikers:

Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.

Algemene aanwijzingen, specifiek voor professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.

Risicobeperkende maatregelen voor professionele gebruikers en professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders over de knaagdierbestrijdingscampagne.

De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.

Was de aasstations niet met water tussen behandelingen door.

Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming.

Risicobeperkende maatregelen, specifiek voor professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.

Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel.

Risicobeperkende maatregelen, specifiek voor professionele gebruikers:

Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (bijv. ten minste twee keer per week) dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

Gebruik lokaas dat werkzame bloedverdunnende stoffen bevat niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Met behulp van dit product zouden knaagdieren binnen 35 dagen geëlimineerd moeten zijn. De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

Specifieke risicobeperkende maatregelen:

Bestrijding van muizen en bruine ratten binnen, en buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen een bruine ratten in open gebieden buiten en bij vuilstortplaatsen

Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.

Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Gebruik het product niet in gepulseerde lokaasbehandelingen.

Dit product niet direct in de holen toepassen.

Wanneer aaspunten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

Bestrijding van bruine ratten in riolen

Gebruik het product niet in gepulseerde lokaasbehandelingen.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen:

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

Tegengif: vitamine K_1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen.

Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "Tomcat Blox/Hawk Blox"; "bromadiolon" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum (+32 (0)70 245 245)."

Gevaarlijk voor dieren in het wild. ◆

BE - TOMCAT BLOX | HAWK BLOX

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.

Pour les professionnels et utilisateurs professionnels ayant des compétences avancées démontrées.

TOMCAT BLOX / HAWK BLOX est un appât rodenticide prêt à l'emploi, sous forme de blocs. Uniquement autorisé pour lutter contre les rats bruns (*Rattus norvegicus*) et les souris (*Mus musculus*). Pour utilisation à l'intérieur, à l'extérieur autour des bâtiments, dans les zones extérieures ouvertes, les décharges et les égouts.

Instructions d'emploi :

Utilisation dans et autour des bâtiments

Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Points d'appâts couverts et protégés.

Souris : Déposer 28 g d'appât par point d'appât tous les 2 à 4 mètres.

Rats : Déposer 2-8 28g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres à 10 mètres.

Utilisation dans les zones ouvertes extérieures et les décharges

Pour professionnels ayant des compétences avancées démontrée seulement

Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Points d'appâts couverts et protégés.

Rat : Déposer 2-8 28g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres à 10 mètres.

Utilisation dans les égouts

Pour professionnels ayant des compétences avancées démontrée seulement

Appât prêt à l'emploi à fixer ou appliquer dans des postes d'appâtage pour empêcher l'appât d'entrer en contact avec les eaux usées. Points d'appâts couverts et protégés.

Rat : Déposer 2-8 28g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres à 10 mètres.

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.

Consignes d'utilisation spécifiques :

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (Norme EN 374-1 :2003).

Utilisation dans et autour des bâtiments et dans des zones ouvertes extérieures et décharges

Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

Souris: les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Rats: les stations d'appâtage doivent être inspectées seulement dans les 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

Remplacer tout appât dans les points d'appât s'il a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites stratégiques pour minimiser l'exposition aux espèces non cibles

Utilisation dans les égouts

Les appâts doivent être appliqués de façon à ne pas entrer en contact avec l'eau et à ne pas être emportés.

Consignes d'utilisation pour utilisateurs professionnels et professionnels ayant des compétences avancées démontrées :

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.

Avant de placer un appât, mener un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.

Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.

Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.

Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts.

L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.

Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés.

Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.

Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.

Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appât à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.

Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de lutte alternative.

Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

Le produit doit être placées à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée précédemment (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).

Consignes d'utilisation pour utilisateurs professionnels :

Envisagez la mise en oeuvre de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.

Retirer tout appât restant ou les postes d'appât au terme de la période de traitement.

Consignes d'utilisation pour les professionnels ayant des compétences avancées démontrées :

L'utilisateur détermine lui-même la fréquence des inspections de la zone traitée, à la lumière des résultats de l'étude réalisée au début du traitement. Cette fréquence doit être compatible avec les recommandations contenues dans le code de bonnes pratiques applicable.

Mesures de gestion des risques pour utilisateurs professionnels et professionnels ayant des compétences avancées démontrées :

Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.

Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans procéder à une évaluation préalable du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

Ne pas nettoyer les postes d'appâtage à l'eau entre deux applications. Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale. Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée.

Mesures de gestion des risques pour les professionnels ayant des compétences avancées démontrées :

Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.

Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.

Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage couverts et protégés, entre les applications.

Mesures de gestion des risques pour professionnels utilisateurs :

Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement (par exemple, au moins deux fois par semaine).

Ne pas utiliser d'appâts contenant des substances actives anticoagulantes en guise d'appâts permanents pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants: Le produit ne doit pas être fourni au grand public (par exemple, «à usage professionnel uniquement»).

L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.

Mesures spécifiques de gestion des risques :

Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.

Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.

Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

Ne pas utiliser ce produit directement dans les terriers.

Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité d'eaux de surface (par exemple, de rivières, d'étangs, de cours d'eau, de digues ou de canaux d'irrigation) ou de systèmes d'évacuation des eaux, assurez-vous que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

Utilisation dans les égouts

N'utilisez pas le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement :

Ce produit contient une substance anticoagulante (Bromadiolone). En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

Antidote : Administration de vitamine K_1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

En cas :

- d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;
- d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes;
- d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette.

Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

En cas d'incident, contacter le centre antipoison [+32 (0)70 245 245]..

Dangereux pour la faune. ◆

DK - NOTRAC BLOX

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) og husmus (*Mus musculus*) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter fra en bygning samt til bekæmpelse af brun rotte i kloakker. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fungerer som kilde til rotter i bygninger.

Det biocidholdige produkt må kun bruges af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med enten en R1 eller R2 autorisation. Brug i kloakker er dog kun tilladt for personer med en R1 autorisation.

Ved kildebekæmpelse skal betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt.

Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af mus og rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 28 g pr. udlægningssted for brug mod mus og 225 g pr. udlægningssted for brug mod rotter af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

For brug i og omkring bygninger og til kildebekæmpelse: Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr udenfor målgruppen ikke kan komme i kontakt med giften.

For brug i kloakker: Det biocidholdige produkt skal fastgøres i kloakken, så det ikke kan skylles væk.

Døde mus og rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes som dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfuglie og rovdyr.

Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen.

Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse.

Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på dem, som udfører bekæmpelsen.

Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger.

Ved anbringelse af foderstationer tæt på overfladevand eller afløbssystemer skal det sikres, at det biocidholdige produkt ikke kommer i kontakt med vand.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Generelle anvisninger til brug:

Vejledning til brug:

Læs og følg etiketten samt alle andre oplysninger, som ledsager produktet eller udleveres på salgsstedet, inden produktet tages i brug.

Foretag en vurdering af skadedyrsangrebet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger inden produktet anvendes.

Fjern fødevarer, som skadedyr let kan få fat i (f.eks. spildt korn eller madaffald). Bortset fra dette skal det inficerede område ikke rengøres umiddelbart inden behandlingen, da dette kun forstyrrer skadedyrene og gør det sværere at få gnaverne til at spise af produktet.

Produktet bør kun anvendes som led i en overordnet bekæmpelsesstrategi.

Produktet bør anbringes i umiddelbar nærhed af steder, hvor der tidligere har været gnaveraktiviteter (f.eks. stier, reder, indhegninger, huller og huler mv.).

Om muligt bør foderstationerne fastgøres til jorden eller andre konstruktioner.

Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området og at de ikke må flyttes eller åbnes.

Stiksenheder skal mærkes med følgende oplysninger: "Flyt ikke eller åben"; "indeholder et rodenticid"; "Notrac Blox - BPR-reg. nr. 413-2"; "Bromadiolone "og" i tilfælde af hændelse, kalder et giftcenter tlf. 82 12 12 12".

Produktet bør fastgøres, så det ikke kan trækkes væk fra foderstationen.

Anbring produktet utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr, husdyr og andre dyr, som produktet ikke er rettet mod.

Anbring produktet i sikker afstand af fødevarer, drikkevarer og foderstoffer samt redskaber eller overflader, som har kontakt med disse.

Bær beskyttelseshandsker, som beskytter mod kemiske stoffer, under håndteringen af produktet (EN 374).

Undgå at spise, drikke eller ryge under anvendelse af produktet. Vask hænder og direkte eksponeret hud efter brug af produktet.

Hyppigheden af besøg i det behandlede område bør vurderes af bekæmperen i lyset af den undersøgelse, som blev foretaget ved behandlingens start. Denne hyppighed bør være i overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Hvis produktet optages langsomt i forhold til angrebets tilsyneladende størrelse, overvejes det at flytte foderstationerne til andre steder og eventuelt skifte til et produkt baseret på et andet aktivstof.

Hvis produktet efter en behandlingsperiode på 35 dage fortsat indtages, og der ikke observeres nogen nedgang i gnaveraktiviteten, skal den sandsynlige årsag bestemmes. Hvis andre elementer er blevet udelukket, er der sandsynligvis tale om resistens, og det bør overvejes at anvende et ikke-antikoagulerende rodenticid, hvor dette er muligt, eller et stærkere rodenticid med antikoagulerende effekt. Overvej også at bruge fælder som alternativ bekæmpelsesforanstaltning.

Beskyt produktet mod vejrforhold. Anbring foderstationerne i områder, der ikke oversvømmes.

Udskift produktet i en station, som er beskadiget af vand eller forurenet af jord.

Overvej præventive kontrolforanstaltninger (tilstop huller, og fjern så vidt muligt potentielle føde- og drikkevarer) for at øge indtagelsen af produktet og mindske sandsynligheden for nye angreb.

Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse.

På grund af den forsinkede virkningsmekanisme tager rodenticider med antikoagulerende effekt fra fire til 10 dage om at virke efter indtagelse.

Gnavere kan være sygdomsbærere. Rør ikke ved døde gnavere med bare hænder; brug handsker eller redskaber, såsom en tang, til at fjerne dem.

Brugsanvisningen:

Brun rotte og/eller husmus indendørs og udendørs omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter fra en bygning.

Mus: Placer én 28 g blok pr foderstationer. Hvis der er behov for mere end én foderstationer, bør der være mindst 2 til 4 meters afstand mellem hver station.

Rotter: Placer 225 g produkt (2 til 10 stk. 28 g blokke) pr. station. Hvis der er behov for mere end én lokkemadsstation, bør der være mindst 5 til 10 meters afstand mellem hver station.

Må kun anvendes i omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fra bygninger fungerer som kilde til rotter i bygninger. Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr udenfor målgruppen ikke kan komme i kontakt med gifen.

Anvend ikke dette produkt direkte i rottegange.

Må ikke bruges ved intervaludlægning.

Brun rotte i kloakker - tilladt for personer med en R1 autorisation:

Placer 225 g produkt (2 til 10 stk., 28 g blokke) skal fastgøres eller anvendes i foderstationer per mandehul.

Skal fastgøres eller anvendes i foderstationer, så produktet ikke kommer i kontakt med spildevand.

Skal fastgøres i kloakken, så det ikke kan skylles væk.

Må ikke bruges ved intervaludlægning.

Risiko reducerende foranstaltninger:

Informer om muligt eventuelle brugere af det behandlede område og omgivelser om bekæmpelsen inden den indledes [i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger].

Må ikke anvendes i områder, hvor der kan være mistanke om resistens over for aktivstoffet.

Skift ikke mellem forskellige antikoagulerende midler med sammenlignelig eller svagere styrke med henblik på resistensstyring. Ved skift mellem produkter bør det overvejes at anvende et ikke-antikoagulerende rodenticid, hvor dette er muligt, eller et stærkere antikoagulerende middel.

Vask ikke foderstationer eller redskaber med vand mellem anvendelserne.

Gnavere kan være sygdomsbærere. Rør ikke ved døde gnavere med bare hænder; brug handsker eller redskaber, såsom en tang, til at fjerne dem.

Bortskaf døde skadedyr som dagrenovation.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

For at mindske risikoen for sekundær forgiftning skal døde skadedyr findes og fjernes med hyppige intervaller under bekæmpelsen i overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Brug ikke rodenticider med antikoagulerende effekt som permanent lokkemad (f.eks. til forebyggelse af gnaverangreb eller sporing af gnaveraktivitet). ◆

12-20

SE - NOTRAC BLOX

Anvisningar för säker hantering av:

För inomhus användning och användning utomhus omkring byggnader, vid återvinningsplatser (sorteringsstationer) samt för att skydda infrastruktur så som konstruktioner och system för energiförsörjning och kommunikation. Produkten får även användas mot råttor i kvartersparker och andra liknande områden där allmänheten uppehåller sig samt vid högfrekventerade gångvägar i stadsmiljön. Ej för annan användning i parker, på öppna områden, utomhusbelägna avfallsanläggningar och deponier.

Färdig att användas BETESBLOCK MOT Brunråtta (*Rattus norvegicus*) och Husmus (*Mus musculus*). Endast för Yrkesmässig användare med utbildning. Det är olagligt att använda denna produkt för användning eller på annat sätt än det som föreskrivs på denna etikett.

Läs och följ produktinformationen liksom all information som följer med produkten eller som tillhandahålls vid försäljningstillfället innan produkten används.

Följ alla ytterligare anvisningar som ges i relevanta riktlinjer för god praxis.

Genomför en förbetesundersökning av det angripna området och en bedömning på plats för att identifiera gnagararten, dess aktivitetsplatser och avgör den troliga orsaken till angreppet och dess omfattning.

Avlägsna livsmedel som är lätta att nå för gnagare (t.ex. utspillt sädeskorn eller livsmedelsavfall). Bortsett från detta, undvik att städa det angripna området direkt inför behandlingen, då detta bara stör gnagarpopulationen och gör det svårare att få dem att acceptera betet.

Produkten får bara användas som del av ett integrerat bekämpningssystem (IPM-system), inbegripet bland annat hygienåtgärder och, där så är möjligt, fysiska metoder.

Produkten ska placeras i omedelbar närhet av platser där gnagaraktivitet tidigare har noterats (t.ex. gångstigar, boplatser, uppfödningsplatser, hål, jordhålor osv.).

Endast för användning i överkansskära betesstationer, förutom om täckta och skyddade betespunkter kan användas på ett sådant sätt att de ger samma skyddsnivå för ickemålorganismer och människor som överkanssäkra betesstationer.

Där så är möjligt måste betesstationerna fästas i marken eller i andra objekt.

Betesstationer måste märkas med följande information: "får inte flyttas eller öppnas"; "innehåller en rodenticid"; "produktnamn eller registreringsnummer"; "verksamt ämne eller verksamma ämnen" och "vid olycksfall, kontakta giftinformationscentralen".

När produkten används på offentliga platser ska platserna märkas under behandlingstiden och ett meddelande sättas upp intill betet som förklarar risken för primär eller sekundär förgiftning av det antikoagulerande medlet och som anger de första åtgärderna att vidta vid förgiftning.

Betet ska säkras så att det inte kan dras bort från betesstationen.

Placera produkten oåtkomligt för barn, fåglar, sällskapsdjur, livsmedelsproducerande djur och andra icke-måldjur.

Placera produkten åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder, samt från föremål eller ytor som kommer i kontakt med dessa.

Bär kemiskt beständiga skyddshandskar när produkten hanteras (EN374). Undvik att äta, dricka och röka när du använder produkten. Tvätta händerna och direktexponerad hud efter användning av produkten.

Hur ofta den behandlade platsen besöks ska bestämmas av saneringsteknikern med bakgrund av undersökningen som utfördes vid behandlingens inledning. Frekvensen bör överensstämma med de rekommendationer som ges i relevanta riktlinjer för god praxis.

På grund av att antikoagulerande rodenticider har en fördröjd verkningsmekanism tar det 4–10 dagar efter det att betet konsumerats innan det har effekt.

Vid liten åtgång av bete jämfört med angreppets synbara storlek, överväg att flytta betesstationerna till andra platser och att eventuellt byta till en annan betesformulering.

Om beten fortsätter att förtäras efter 35 dagars behandling och ingen nedgång ses i gnagaraktiviteten måste den troliga orsake bestämmas. Om andra orsaker har uteslutits är det troligt att det finns resistenta gnagare. Överväg i så fall att använda en ickeantikoagulerande rodenticid, om detta finns, eller en starkare antikoagulerande rodenticid. Överväg även att använda fällor som en alternativ åtgärd.

Bruksanvisning:

Färdig att användas BETESBLOCK MOT Brunråtta (*Rattus norvegicus*) och Husmus (*Mus musculus*). Endast för Yrkesmässig användare med utbildning. Det är olagligt att använda denna produkt för användning eller på annat sätt än det som föreskrivs på denna etikett.

Gnagare kan vara sjukdomsbärare. Vidrör inte döda gnagare med bara händer, utan använd handskar eller verktyg såsom tänger när du bortskaffar dem.

Möss: Placera 5 28 g av färsk bete med 2m till 4m intervaller per placering, där möss eller deras tecken har observerats.

Råttor: Upp till 225 g av färsk bete med 5m till 10m intervaller per placering, där röttor eller deras tecken har observerats.

Överväg förebyggande åtgärder (t.ex. täpp igen hål, avlägsna potentiella livsmedel och drycker så långt möjligt) för att förbättra produktintaget och minska risken för nya angrepp.

För att minska risken för sekundär förgiftning, sök efter och avlägsna döda gnagare regelbundet under behandlingen, i linje med rekommendationerna i relevanta riktlinjer för god praxis.

Vid placering av betespunkter nära ytvatten (t.ex. åar, dammar, vattenkanaler, fördämningar, bevattningsdiken) eller vattendräneringssystem, se till att kontakt mellan betet och vatten undviks. Skydda betet mot vädermässiga faktorer. Placera betespunkterna på platser som inte riskerar att översvämmas.

Ersätt alltbete i en betespunkt där betet har skadats av vatten eller förorenats av smuts.

Inte för applicering direkt i jordhålor.

Använd inte produkten vid pulsbehandlingar.

Avlägsna rester av produkten vid behandlingstidens slut.

För permanent betningsbehandling:

Där så är möjligt rekommenderas det att den behandlade platsen besöks minst var fjärde vecka för att undvika utveckling av resistenta populationer. Permanent betningsbehandling är strikt begränsat till platser med hög potential för nya angrepp när andra metoder har visat sig otillräckliga.

Den permanenta betningsstrategin ska regelbundet ses över inom ramen för integrerade bekämpningssystem (IPM) och bedömningen av risken för nytt angrepp.

Produkten får även användas mot råttor i avloppssystem:

Färdig att användas betesblock mot Råttor (*Rattus norvegicus*).

Bruksfärdigt bete som förankras eller appliceras i betesstationer som förhindrar att betet kommer i kontakt med avloppsvatten.

Använd inte produkten vid pulsbehandlingar.

Upp till 225 g per manhål.

Beten måste appliceras så att de inte kommer i kontakt med vatten och inte spolas bort.

Riskbegränsande åtgärder:

Där så är möjligt, informera berörd allmänhet före behandlingen (t.ex. de som använder den behandlade platsen och dess omgivning) om gnagarbekämpningen.

Använd inte produkten i områden där resistens mot det verksamma ämnet kan misstänkas.

Produkterna får inte användas längre tid än 35 dagar utan att angreppets omfattning och behandlingens effekt utvärderas. (såvida permanent betningsbehandling).

Varva inte användning av olika antikoagulerande medel med jämförbar eller svagare styrka för att undvika resistensutveckling. För varvad användning, överväg att använda en rodenticid utan antikoagulerande effekt, om sådan finns, eller en kraftfullare antikoagulant.

Rengör inte betesstationer eller verktyg som används i täckta eller skyddade betespunkter med vatten mellan applikationerna.

Gör dig av med döda gnagare i enlighet med lokala regler. ◆

12-20

NO - NOTRAC BLOX

Notrac Blox er en åte klar-til-bruk (blokk) til bekjempelse av mus og rotter innendørs og utendørs rundt bygninger og, bare for rotter, i avløpssystemer.

Biocidproduktet må innendørs kun brukes i solide åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn/kjæledyr eller utendørs i i solide, værbestandige åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn/kjæledyr. I avløpssystemer skal åtet festes, eventuelt plasseres i åtestasjoner, slik at åtet ikke kommer i kontakt med avløpsvann.

Innendørs og utendørs rundt bygninger må biocidproduktet kun brukes av godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon. I avløpssystemer må det kun brukes av godkjente skadedyrbekjempere.

Packningsvedlegg:

Notrac Blox er en åte klar-til-bruk (blokk) til bekjempelse av mus og rotter innendørs og utendørs rundt bygninger og, bare for rotter, i avløpssystemer.

Biocidproduktet må innendørs kun brukes i solide åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn/kjæledyr eller utendørs i i solide, værbestandige åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn/kjæledyr.

I avløpssystemer skal åtet festes, eventuelt plasseres i åtestasjoner, slik at åtet ikke kommer i kontakt med avløpsvann.

Innendørs og utendørs rundt bygninger må biocidproduktet kun brukes av godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon.

I avløpssystemer må det kun brukes av godkjente skadedyrbekjempere.

Bruksanvisning:

Les og følg produktinformasjonen, og annen informasjon som følger med produktet eller gis på utsalgsstedet, før produktet tas i bruk.

Før behandlingen påbegynnes skal det infiserte området undersøkes for å lokalisere hvor gnagerne er aktive, fastslå gnagerart, omfanget av angrepet og eventuelle årsaker.

Fjern mat som gnagerne lett kan få tak i (f.eks. matavfall eller notter/frø/korn). Utover dette skal det infiserte området ikke rengjøres, for å unngå å forstyrre gnagerne slik at de ikke spiser åtet.

Produktet skal kun brukes som en del av en integrert bekjempelsesstrategi der også hygienerutiner og fysisk bekjempelse inngår.

Åtestasjoner bør plasseres på steder der det tidligere har vært gnaveraktivitet (f.eks. stier, bol, innheninger, hull og huler).

Åtestasjoner bør festes til underlaget hvis mulig.

Åtestasjoner skal være tydelig merket med at de inneholder gnagergift og at de ikke skal fjernes eller åpnes (se avsnitt «Førstehjelpstiltak for å se hvilke opplysninger som skal stå på etiketten).

Åtet må festes i åtestasjonen slik at det ikke kan flyttes av gnagerne.

Plasser produktet slik at det er utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr, husdyr og andre dyr som åtet ikke er beregnet på.

Ikke plasser åtet i nærheten av mat, drikke eller fôr, eller redskap/overflater som kommer i kontakt med mat, drikke eller fôr.

Bruk hansker som beskytter mot kjemikalier ved håndtering av produktet.

Unngå å spise, drikke eller røyke ved håndtering av produktet. Vask hender og direkte eksponert hud etter håndtering av produktet.

Hyppigheten av inspeksjon av behandlede områder avgjøres av godkjent skadedyrbekjemper basert på vurderingen som ble foretatt før oppstart av bekjempelsen. Hyppigheten bør følge god etablert praksis.

Dersom det spises lite av åtet sammenlignet med angrepets antatte omfang, bør det vurderes å flytte åtestasjonen og eventuelt bytte til en annen åteformulering.

Dersom det fortsatt spises av åtet etter en behandlingstid på 35 dager og gnaveraktiviteten ikke går ned, skal årsaken til dette fastslås.

Dersom andre årsaker kan utelukkes er det sannsynlig at årsaken er resistens i gnagerbestanden. Det bør da vurderes å bruke et ikke-antikoagulant gnagermiddel eller hvis mulig, et sterkere antikoagulant middel. Vurder også bruk av feller som alternativ bekjempelsesstrategi.

Dosering:

Indendørs og udendørs rundt bygninger:

Mus: 28 g åte per åtestasjon plassert 2 til 4 meter fra hverandre

Rotte: Inntil 225 g åte per åtestasjon plassert 5 til 10 meter fra hverandre

I avløpssystemer mot rotter: Inntil 225 g per kum

Brukksspesifikke anvisninger og beskyttelsestiltak:

Bruksanvisning innendørs:

For mus: Åtestasjonene bør inspiseres 2–3 dager etter oppstart av behandlingen og ukentlig deretter, for å kontrollere om åtet har blitt spist og om åtestasjonene er intakte. Døde gnagere skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig og kastes i restavfallet. Erstatt oppspist åte.

For angrep av rotte: Åtestasjonene bør inspiseres 5–7 dager etter oppstart av behandlingen og ukentlig deretter, for å kontrollere om åtet har blitt spist og om åtestasjonene er intakte. Døde gnagere skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig og kastes i restavfallet. Erstatt oppspist åte.

Følg eventuell ytterligere anvisninger som følger god etablert praksis.

Tiltak for å beskytte miljøet: Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom åtestasjonen plasseres nær overflatevann (f.eks. elver, dammer, kanaler, diker eller grøfter) eller avløpssystemer.

Bruksanvisning utendørs rundt bygninger:

Beskytt åtet mot været. Plasser åtestasjonene på steder som ikke oversvømmes.

Bytt ut åte som har blitt vått eller forurenset.

Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes.

Beskyttelsestiltak:

Informer om mulig naboer og andre som berøres av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter.

Vurder forebyggende tiltak (tetting av hull, fjerning av potensielle kilder til mat og drikke) for å øke gnagernes inntak av åte og for å redusere sannsynligheten for nye angrep.

For å redusere risiko for sekundærforgiftning må døde gnagere fjernes regelmessig mens bekjempelsen pågår etter intervaller i tråd med god etablert praksis.

Bruk ikke antikoagulanter som permanent åte for å hindre angrep eller for å overvåke gnaveraktivitet.

Bruk ikke åtet til intervallutlegging.

Tiltak for å beskytte miljøet: Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom åtestasjonen plasseres nær overflatevann (f.eks. elver, dammer, kanaler, diker eller grøfter) eller avløpssystemer.

Bruksanvisning i avløpssystemer:

I avløpsrør skal åtet plasseres i åtestasjoner for å hindre at åtet kommer i kontakt med avløpsvann.

Beskyttelsestiltak: Bruk ikke åtet til intervallutlegging.

Generelle tiltak for å beskytte mennesker og miljø:

Informer om mulig naboer og andre som berøres av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter [i overensstemmelse med god etablert praksis].

Må ikke brukes i områder der det er mistanke om resistens mot det aktive stoffet i produktet.

Produktene må ikke brukes i mer enn 35 dager uten å evaluere angrepets status og behandlingens effekt.

Resistensstatus for målpopulasjonen bør tas med i beregningen ved valg av rottemidlet som skal brukes. Unngå bruk av aktive ingredienser i områder der det er mistanke om tegn på resistens mot disse. For å unngå resistensutvikling, anbefales det å veksle mellom åte som inneholder forskjellige aktive antikoagulerende stoffer.

Ikke vask åtestasjoner eller redskaper med vann mellom behandlingene.

Døde gnagere skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig og kastes i restavfallet.

Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak:

Dette produktet inneholder et antikoagulerende stoff. Ved inntak kan det forekomme forsinkede symptomer, som neseblod og blødende tannkjøtt. I alvorlige tilfeller kan blodutredelser/blåmerker eller blod i urin/avføring forekomme.

Motgift: Vitamin K1; må kun gis av lege/veterinær.

Dersom produktet:

- kommer i kontakt med huden; vaskes huden med vann og deretter med såpevann.
- kommer i kontakt med øynene; skyll med øyeskyllevæske eller vann. Skyll mens øynene holdes åpne i minst 10 minutter.
- kommer inn i munnen; skyll munnen grundig med vann.

Gi aldri en bevisstløs person mat eller drikke.

Oppsøk straks lege dersom produktet svelges. Vis produktets emballasje eller etikett til legen.

Kontakt veterinær, dersom et kjæledyr har spist produktet.

Åtestasjoner skal merkes med følgende informajson: "Mwå ikke fjernes eller åpnes", "Inneholder muse- eller rottegift", "Notrac Blox , NO-2014-0087 ", "Bromadiolone", og "Ved mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00."

Farlig for dyreliv.

Avfallshåndtering:

Når bekjempelsen avsluttes skal resterende åte og emballasje leveres til godkjent avfallsmottak.

Emballasje uten rester av muse-/rottegift kan leveres til resirkulering.

Bruk hansker som beskytter mot kjemikalier.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares tørt og kjølig på et sted med god ventilasjon. Hold beholderen lukket og vekk fra direkte sollys.

Oppbevares utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr og husdyr.

Annen informasjon:

På grunn av den forsinkede virkemekanismen tar det 4-10 dager etter inntak av det antikoagulante gnagermidlet for å oppnå effekt.

Gnagere kan være sykdomsbærere. Berør ikke døde gnagere med bare hender; bruk hansker eller redskap som f.eks. tang eller klype til å fjerne dem. ◆