

MS MEGADES NOVO

MS MegaDes Novo est un désinfectant universel pour une utilisation dans les bâtiments d'élevage et les véhicules de transport de bétail. MS MegaDes Novo est un allié incontournable pour la biosécurité de chaque élevage.

- Contient des tensio-actifs pour permettre au produit une action en profondeur
- Efficace contre les bactéries, les levures, les moisissures et les virus
- Efficace contre la peste porcine africaine à un dosage de 0,25 % (tue 99 %)
- Action rapide - efficacité totale en 5 minutes
- Température minimale d'action : 10°C



Substances actives : Alkyl (C12-16) chlorure de diméthylbenzylammonium : 9,8%
Glutaraldéhyde : 14,7%*

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour une hygiène optimale



Le bon protocole

- 1 Enlevez les grosses accumulations ou matériels organiques (paille, reliquats de jouets ou d'aliment) en utilisant une pelle ou un balai. Assurez un trempage suffisant des salles.
- 2 Moussez toutes les surfaces avec un détergent MS TopFoam. Laissez le produit agir sans le laisser sécher.
- 3 Décapez toutes les surfaces préalablement moussées avec un nettoyeur à haute pression. Laissez la zone sécher complètement. L'eau résiduelle dilue le désinfectant et réduit son efficacité.
- 4 Tous les 6 mois, éliminez les dépôts calcaires, de fer et de manganèse avec le MS TopFoam LC Acid.
- 5 Désinfectez la salle avec MS MegaDes Novo pour tuer tous les germes restants.
- 6 Rincez le désinfectant à l'eau basse pression et laissez la zone sécher complètement.

Une efficacité prouvée !

MS MegaDes Novo a été approuvé par le Conseil européen pour l'autorisation des produits phytopharmaceutiques et des biocides, qui évalue la sécurité et la fonction des produits. Efficace contre les bactéries, micro-organismes, virus et levures/ moisissures. Les tests ont été effectués avec une concentration de 0,75 %, avec un temps de contact de 5 minutes.

- Dosage : 0,75%
- Temps de contact : 5 minutes
- Température minimale : 10°C
- TP03 et TP04
- Enregistrement : 44960 et 61445
- Agréé contre la PPA et la grippe aviaire

Bactéries :

• Avibacterium paragallinarum (anciennement H paragallinarum) • Bordetella avium • Campylobacter jejuni • Corynebacterium pseudotuberculosis • Escherichia coli • Haemophilus parasuis • Glassers • Klebsiella pneumonia • Listeria monocytogenes • Mycoplasma gallisepticum • Mycoplasma hyopneumoniae • Mycoplasma synoviae • Ornithobacterium rhinotracheale • Pseudomonas aeruginosa • Salmonella enterica (anciennement S. Pullorum • Salmonella enterica (anciennement S. choleraesuis) • Salmonella enterica (anciennement S. enteritidis) • Salmonella enterica (anciennement S. typhimurium) • Staphylococcus aureus • Streptococcus suis • Proteus vulgaris • Enterococcus hirae

Virus :

• Laryngotrachéite infectieuse aviaire • Réovirus aviaire (souche Spafas) • Influenza aviaire (souche Turkey/Wis/66 - H9N2) • Influenza aviaire (H5N1) • Influenza humaine A (H1N1) • Influenza porcine A (H1N1) • Maladie de Marek (souche Spafas) • Maladie de Newcastle (souche Spafas) • Bursite infectieuse (Gumboro) (souche Spafas 2512) • Circovirus porcine, type II (PCV2, cellule PT-1) • Pseudo-rage (laboratoires American BioResearch) • Syndrome respiratoire et reproducteur porcine (SRRP) • Virus de la diarrhée épidémique porcine (VDEP) • Coronavirus delta du porc (CVDP) • Gastro-entérite transmissible (GET) • Virus de la peste porcine africaine • Peste porcine classique

Levures et

champignons : • Fusarium dimerum • Penicillium expansum • Trichophyton mentagrophytes • Candida Albicans

Schippers France SARL

ZA La Retaudais - Rue du Domaine | CS 10 009 - 35137 Bédée
sales@schippers.fr | www.schippers.fr | 02 99 61 40 40

Distribué par

MS Schippers