

MS

DI-O-CLEAN

LIQUID A



CLEAN DRINKING
WATER

EN

Product to combat bacteria (excluding spore-forming bacteria and mycobacteria), yeasts / fungi in drinking water and drinking water systems for livestock. Read enclosed conditions and directions for use carefully before use. For professional use only.

NL

Middel ter bestrijding van bacteriën (excl. sporevormende bacteriën en mycobacteriën), gisten en schimmels in drinkwater en drinkwatersystemen in de veehouderij. Voor gebruik het bijgevoegde gebruiksvorschrift en de gebruiksaanwijzing lezen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

DE

Produkt zur Bekämpfung von Bakterien (exkl. sporenbildenden Bakterien und Mykobakterien), Hefen und Pilzen in Trinkwasser und Trinkwassersystemen in der Viehhaltung. Vor Gebrauch gesetzliche Anhangsvorschrift und Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Das Mittel ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung vorgesehen.

FR

Produit pour combattre les bactéries (excepté les bactéries qui produisent des spores et les mycobactéries), les levures et les moisissures dans l'eau potable et les réseaux d'eau dans l'élevage. Lire attentivement le mode d'emploi et les conditions avant utilisation. Le produit est strictement réservé à une utilisation professionnelle.

ES

Adecuado para combatir bacterias (excl. bacterias que forman esporas y micobacterias), levaduras y hongos en agua potable y circuitos de agua en ganadería. Lea las especificaciones y las instrucciones de uso antes de usar. El producto ha sido concebido exclusivamente para el uso profesional.

IT

Prodotto per combattere i batteri (esclusi spore e micobatteri) muffe e funghi nell'acqua da bere e nelle reti idriche negli allevamenti di bestiame. Leggere attentamente le condizioni e le istruzioni per l'uso incluse prima dell'uso. La soluzione liquida è destinata esclusivamente ad un utilizzo professionale.

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BÉDÉE (F)
Tel. 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia S.r.l.
Via Belvedere 64
24022 Alzano
Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Danmark:
Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

Canada:
Schippers Canada Ltd.
T20 - 27211 Highway 12
Lacombe County, AB T4L 0E3
1-866-995-7771

United Kingdom:
Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049

Brasil:
Schippers Brasil
Palmares, Ribeirão Preto - SP,
14092-440, Brazil
(16) 3329-3053



ES: Indicaciones de peligro: EUH032: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. H290 Met. Corr. 1: Puede ser corrosiva para los metales. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Consejos de precaución:** P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P533: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto con cuidado. Si persisten y pueda haberse producido un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P310: Llámarlo inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P311: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación nacional/regional/internacional. **IT: Indicazioni di pericolo:** EUH032: A contatto con acidi libera gas molto tossici. EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie. H290 Met. Corr. 1: Può essere corrosivo per i metalli. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **Consigli di prudenza:** P280: Indossare guanti, indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P303+P361+P533: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENE o un medico. P311: Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA: Fareskiltninger:** EUH032: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. EUH071: Åtsende for luftvejene. H290 Met. Corr. 1: Kan ætse metaller. H314 Skin Corr. 1: Får sår på huden. H318 Eye Dam. 1: Forårsager svære øjenlæsioner af huden. **Fareskiltninger:** P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsesbrille, øjenbeskyttelse, åndedrætsudrustning. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. P303+P361+P533: Ved KONTAKT MED VEDKØBT: Ved KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlenser, hvis dette kan gøres let. FORTSÆT skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P311: Indholdet/beholderen bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

BE-NL: Werksame stof: Natriumchlorid 1,3% **Aard van het preparaat:** Combi-verpakking vloeibaar/vloeibaar

Vervaldatum: (2 jaar na de productiedatum)

A. Wettelijk gebruikvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik:
- als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriësporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en virussen in drinkwatersystemen in de veehouderij;

- als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriësporen en mycobacteriën), gisten, schimmels in drinkwater in de veehouderij. De actieve stof (chloroïdioxide) dient te worden bereid door uit te gaan van de twee precursoren Di-o-clean liquid (A natriumchloriet) en Di-o-clean liquid B (natriumsulfiet), en die met elkaar een gecontroleerde reactie te laten aangaan in een hiervoor geschikte doosinstallatie. De toepasser dient de gebruiksaanwijzingen voor de doosinstallatie van de leverancier te volgen. Het middel is effectief tegen Bacteriën (EN 1276: Enterococcus hirae - E.coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus), fungicide/gistdodend middel (EN 1650: Aspergillus brasiliensis, Candida albicans) en virucide (EN 14766: norovirus, rotavirus, hepatitis A-virus) met een vermindering van 1% (1,5% voor virussen). Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten gelosd te worden op de meststapel of op de gemeentelijke riolering. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Di-o-clean liquid bestaat uit twee precursoren, Di-o-clean liquid A (natriumchloriet) en Di-o-clean liquid B (natriumsulfiet), die uitsluitend in combinatie met elkaar gebruikt mogen worden. Het middel mag uitsluitend worden toegepast met daarvoor geschikte doserapparaat voor het desinfecteren van leidsystemen in drinkwater in de veehouderij. Het te desinfecteren water wordt grondig geroerd. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel (tezamen met de vervulling) goed weggspoelen met schoon water en vervolgens het systeem vullen met Di-o-clean liquid. Voeg de inhoud van precursor B (witte vloeistof) toe aan precursor A (blauwe jerrycan) en sluit de jerrycan onmiddellijk. Naam hierbij geschikte afbescherming. Deeg 60 minuten reactietijd in acht en het product is klaar voor gebruik. De aldus bereide gebruiksplossing heeft een houdbaarheid van 30 dagen mits opgelagen in de originele verpakking op een koele plaats.

Ontsmetten van drinkwatersystemen in de veehouderij. Dosering: 100 ml gebruiksplossing (vloeibaar Di-o water, invertekt) 60 minuten. Ter bestrijding van virussen. Dosering: 150 ml gebruiksplossing (+A+B) per 10 L water. Invertekt: 60 minuten

Tijdens de ontsmetting het leidsysteem ontlichten. Na het verstrijken van de invertekt tijd leidingskracht door de spoelwaterleiding toevoeren. Het leidsysteem spoelen met leidingwater tot het gehalte aan chloroïdioxide in het laatste spoelwater niet hoger is dan de wettelijk toegestane norm (0,2 ppm). Het gehalte aan chloroïdioxide in het spoelwater dient gecontroleerd te worden met bijv. chloroïdioxide teststrips of d.m.v. een colorimeter.

Ontsmetten van drinkwater voor dieren Dosering (continue): 55 ml gebruiksplossing (+A+B) per 1000 liter water, zodanig dat de hoeveelheid chloroïdioxide in het drinkwater op het eerste tappunt beneden de wettelijk toegestane norm (0,2 ppm) blijft. Het gehalte aan chloroïdioxide in het drinkwater dient gecontroleerd te worden met bijv. chloroïdioxide teststrips of d.m.v. een colorimeter. Waarschuwing: Gebruik het product niet in combinatie met orale vaccinatie via het drinkwater. Voor de behandeling met Di-o-clean liquid vanaf 24 uur na toediening van het vaccin tot 24 uur na toediening van het vaccin.

ES: Contiene: Clorito sólido 1,3%

IT: Prodotto preparato: Paquete combinado liquido/liquido

Fecha de caducidad: 2 año desde la fecha de producción

A. Especificación legal de uso
Autorizado su uso como medio de control de bacterias (excl. esporas de bacterias y micobacterias), levaduras, mohos y virus en sistemas de agua potable de explotaciones ganaderas. Autorizado su uso como medio de control de bacterias (excl. esporas de bacterias y micobacterias), levaduras, mohos y en agua potable de explotaciones ganaderas. El principio activo (dióxido de cloro) se prepara a partir de los dos precursores Di-o-clean liquid A (clorito sólido) y Di-o-clean líquido B (bisulfito sódico), y dejando que estos inicien una reacción controlada en una instalación de dosificación adecuada para tal fin. Es preciso que el usuario siga las instrucciones de uso de proveedor de la instalación de dosificación. Se deberán observar las instrucciones de uso tal como se recogen en B. Para evitar una reducción en el funcionamiento de un tratamiento individual de aguas residuales al utilizar este producto en la explotación, es preciso desaguar los restos de desechos contenidos en el producto al sótano de deyecciones o al sistema de saneamiento municipal. El producto ha sido concebido exclusivamente para el uso profesional.

B. Instrucciones de uso
Información general
Di-O-Clean liquid está compuesto por dos precursores, Di-O-Clean liquid A (clorito sódico) y Di-O-Clean liquid B (bisulfito sódico), los cuales solo pueden ser utilizados combinándolos entre sí. El producto solo puede ser aplicado con los instrumentos de dosificación adecuados para tal fin, para desinfectar el interior de los sistemas de tuberías y de agua potable en las explotaciones ganaderas. En primer lugar, limpiar a fondo el sistema a desinfectar. Eliminar totalmente el producto de limpieza utilizado (junto con la suciedad) utilizando agua limpia y, a continuación, llenar el sistema con Di-O-Clean liquid. Agregar el contenido del precursor B (frasco blanco) al precursor A (bidón azul) y cerrar el bidón inmediatamente. Para ello, llevar un equipo de protección respiratoria adecuada. Respetar los 60 minutos del tiempo de reacción y el producto estará listo para su uso. La solución así preparada puede utilizarse hasta 30 días, siempre que se guarde en un lugar fresco en su envase original.

Desinfección de sistemas de agua potable en la ganadería. Dosificación: 100 ml de solución (+A+B) por cada 10 l de agua. Tiempo de activación: 60 minutos. Purgar el aire del sistema de tuberías durante la desinfección. Una vez transcurrido el tiempo de activación, aclarar las tuberías con fuerza utilizando agua del grifo, de modo que la suciedad desprendida sea eliminada. Aclarar el sistema de tuberías con agua del grifo hasta que el contenido de dióxido de cloro del agua del último aclarado no supere el máximo permitido de 0,2 ppm (límite legal 2 ppm). El contenido de dióxido de cloro en el agua de aclarado debe ser controlado, p. ej. mediante bandas indicadoras de dióxido de cloro o por medio de un colorímetro.

Desinfección del agua potable para los animales Dosificación (continua): 55 ml de solución (+A+B) por cada 1000 litros de agua, de modo que la cantidad de dióxido de cloro en el agua potable en el primer punto de toma de agua quede por debajo de lo que indica la norma legalmente autorizada (0,2 ppm). El contenido de dióxido de cloro en el agua potable debe ser controlado, p. ej. mediante bandas indicadoras de dióxido de cloro o por medio de un colorímetro. Advertencia: No utilizar el producto en combinación con vacunación oral a través del agua potable. Detenga el tratamiento con Di-O-Clean liquid a partir de las 24 horas previas a la administración de la vacuna hasta 24 horas tras la administración de la vacuna.

IT: Contiene: clorito di sodio 1,3% **100 g di prodotto contengono:** clorito di sodio (CAS 7758-19-2) 1,3% acqua q.b.a. 100

Natura del preparato: Combi-pack liquido/liquido

Scadenza del prodotto: 2 anno dalla data di produzione

Leggere attentamente le condizioni e le istruzioni per l'uso inclusa prima dell'uso. La soluzione liquida è destinata esclusivamente ad un utilizzo professionale. Validità del prodotto: 2 anni dalla data di produzione

Da usare esclusivamente in combinazione con Di-O-Clean Liquid B

DA: Indeholder: Natriumchlorit 1,3 % **Præparatets beskaffenhed:** Combi-pack væske/væske

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato

A. Retningslinjer for tilladt brug
Godkendt udelukkende til brug som middel til kontrol af:

- bakterier (undtagen bakteresporer og mykobakterier), gær, svampe og viri i drikkevandssystemer anvendt på kvægbrug.
- bakterier (undtagen bakteresporer og mykobakterier), gær, og svampe i drikkevand anvendt på kvægbrug.

Det aktive stof (chloroïdioxide) skal klargøres ved at tage de to forgængere Di-o-clean væske A (natriumchloriet) og Di-o-clean væske B (natriumhydrogensulfiet), og blande dem sammen i en kontrollet reaktion i et egnet doseringssystem. Brugeren skal følge anvisningerne for brug fra producenten af doseringssystemet.

Anvisningerne under B skal følges nøje.

Ved brug af dette præparat på kvæget skal man, for at undgå reduktion af effektivitet af et individuelt spildevandsbehandlingsanlæg (IWT), bortskaffe afbøvsder, der indeholder produktet, i gylletanken eller i det kommunale spildevandssystem.

Produktet er kun beregnet til professionel brug.

B. Brugervejledning
Generelt
Di-o-clean væske består af to forgængere, Di-o-clean væske A (natriumchloriet) og Di-o-clean væske B (natriumhydrogensulfiet), som kun må anvendes sammen. Produktet skal anvendes sammen med egnet doseringssystem til desinfectering af rørstinstallationer og drikkevand på gårde med husdyrbesætninger. Det system, som skal desinfecteres, skal først rengøres grundigt. Det anvendte rengøringsmiddel (sammen med afbøvsder og kontaminant) skal skylles ud med rent drikkevand, hvorefter systemet skal fyldes med Di-o-clean væske.

Tilsæt indholdet af forgænger B (hvid flaske) til forgænger A (blå dunk), og luk dunken med det samme. Brug et ægget åndedrætsapparat. Gv produktet en reaktionstid på 60 minutter, hvorefter produktet er klar til brug. Den brugsklare opløsning kan holde sig i 30 dage, hvis den opbevares koldt i den originale emballage.

Bakterier, gær og svampe
Dosering: 100 ml af klug til brug opløsning (+A+B) per 10 L vand.
Kontakt tid: 60 minutter
Vira
Dosering: 150 ml af klug til brug opløsning (+A+B) per 10 L vand.
Kontakt tid: 60 minutter
Alfyt rørstinstallationer under desinfectering.
Når gennemløbsperioden er afsluttet, skal man skylle rørene kraftigt med vandværk vand. Af fjerne løsnede aflejringer og kontaminant. Skyl rørsystemet med vandværk vand, indtil chloroïdioxid-indholdet i det sidst anvendte skillevand ligger inden for de grænser, der kræves af lovgivningen (0,2 ppm). Chloroïdioxid-indholdet i skillevandet skal kontrolleres via testmateriale som f.eks. teststrips til chloroïdioxide eller et colorimeter.

Dokumentation af drikkevand til dyr
Dosis (konstant): Du skal bruge 55 ml brugsklar opløsning (+A+B) pr. 1000 liter vand, med forbehold for at chloroïdioxid-indholdet i drikkevandet ved det første afbøvsningsholder sig under den lovlige grænse (0,2 ppm). Chloroïdioxid-indholdet i skillevandet skal kontrolleres via testmateriale som f.eks. teststrips til chloroïdioxide eller et colorimeter.
Advarsel: Brug ikke produktet i kombination med orale vacciner, der tilsættes til drikkevandet. Stop Di-o-clean-behandlingen fra 24 timer inden tilsætning af vaccinen og indtil 24 timer efter.

Registratienummer/Registration number:	Luxembourg: 314/L
Netherlands: 14124N	Italy: 20804
Belgium: BE-REG-01504	Spain: Approved
Denmark: 2448336	Sweden: Approved
Finland: 429139/429140	Brazil: A: 2506026
France: 48943	Kuwait: Liquid A
Germany (BAUA): N-68673	Poland: 8385/21
Ireland: 98561	Finland: 429139
	Hungary: 9878/2022/KBKHF

2506022-COMP-A

Danger | Gevaar
Gefahr | Peligro
Pericolo | Fare
Perigo Pericol
Veszély
Perigo
Vaara
Fara | Nebezpečí
Niebezpieczeństwo
Nevarno | Perikulo
Κίνδυνος | опасно

Made in Belgium

24 LV 03

