


Placez un bolus dans l'applicateur, l'extrémité arrondie vers le haut, en le poussant à fond de manière à ce qu'il ne puisse tomber.



Plaats een bolus met de ronding aan de bovenkant in de applicator. Goed duwen zodat de bolus er niet uit kan vallen.

Placez-vous à côté de la vache, saisissez sa mâchoire supérieure d'une main, soulevez sa tête et maintenez-la vers le haut et légèrement face à vous.



Plaats u naast de koe en houd haar bovenkaak vast. Houd de kop van de koe omhoog en een beetje naar u toe gedraaid.

Introduisez l'applicateur muni du bolus dans la gueule. Lorsque vous sentez une résistance à la base de la langue, enfoncez l'applicateur lentement au-delà de celle-ci.



Breng de applicator met bolus in de mond van de koe. Bij het voelen van een lichte weerstand aan de basis van de tong, duwt u de applicator voorzichtig nog verder.

Dès que l'applicateur se trouve enfoncé au maximum, poussez le piston afin de libérer le bolus. Retirez ensuite l'applicateur.



Zodra de applicator volledig in de mond zit, op de stamper duwen zodat de bolus vrijkomt. De applicator terug uit de mond van de koe halen.

Objectif nutritionnel particulier : Réduction du risque de fièvre vitulaire et de l'hypocalcémie subclinique.

Caractéristiques nutritionnelles essentielles : Teneur élevée en calcium sous la forme de sels de calcium à haute disponibilité. Bovikalc[®] contient du chlorure de calcium, qui se dissout immédiatement dans la panse et du sulfate de calcium, qui ne se dissout qu'après dégradation par la microflore.

Composition : Chlorure de calcium (71 %), sulfate de calcium (29 %), mono- et diglycérides d'acides gras estérifiés à l'acide acétique

Additifs :

Information disponible chez le distributeur.

Constituants analytiques : Calcium (22,2 %), eau (32,0 %)

Chaque bolus contient 43 g de calcium. Bovikalc[®] ne contient ni sodium, ni phosphore, ni magnésium.

Durée d'utilisation recommandée

Dès les premiers signes de la parturition et jusqu'à deux jours après celle-ci.

Administration

Bovikalc[®] s'administre par voie orale, au moyen de l'applicateur prévu à cet effet.

Dosage recommandé : 4 boli

- Bolus 1 : à l'apparition des premiers signes de vêlage
- Bolus 2 : immédiatement après le vêlage
- Bolus 3 : 12 - 24 h après le vêlage
- Bolus 4 : 24 - 48 h après le vêlage

Dosage minimal : 2 boli

- Bolus 1 : immédiatement après le vêlage
- Bolus 2 : 12 - 24 h après le vêlage

Complément à l'infusion de calcium : 2 boli

- Bolus 1 : 2 à 3 h après l'infusion
- Bolus 2 : 12 - 15 h après le bolus 1

La consultation d'un nutritionniste est recommandée avant utilisation.

Précautions particulières : N'administrer Bovikalc[®] qu'au moyen de l'applicateur adapté.

Ne pas administrer à des vaches présentant des signes cliniques de fièvre vitulaire, étant donné que leur réflexe de déglutition peut être perturbé. Ne pas administrer en cas de parésie. Avant administration, veiller à ce que le bolus soit en parfait état et que son film protecteur soit intact.

Conservation : Conserver Bovikalc[®] dans un endroit sec, à une température inférieure à 30°C. Maintenir chaque bolus dans son emballage original jusqu'au moment de l'administration, car sensible à l'humidité. À utiliser de préférence avant : voir "EXP".

Bijzonder voedingsdoel: Vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcémie.

Essentiële voedingskenmerken: Hoog gehalte aan calcium in de vorm van in hoge mate beschikbare calciumzouten. Bovikalc[®] bevat calciumchloride, dat snel oplost in de pens en calciumsulfaat, dat pas oplost na degradatie door de pensflora.

Samenstelling : Calciumchloride (71 %), calciumsulfaat (29 %), mono- en diglyceriden van vetzuren verestert met azijnzuur

Toevoegingsmiddelen

Informatie te verkrijgen bij de distributeur.

Analytische bestanddelen: Calcium (22,2 %), water (32,0 %)

Iedere bolus bevat 43 g calcium. Bovikalc[®] bevat geen natrium, fosfor of magnesium.

Aanbevolen gebruiksduur

Vanaf de eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven.

Toediening

Bovikalc[®] wordt oraal toegediend met een daarvoor bestemde applicator.

Aanbevolen dosering : 4 boli

- Bolus 1 : bij de eerste tekenen van een naderende kalving
- Bolus 2 : onmiddellijk na het kalven
- Bolus 3 : 12 - 24 u na het kalven
- Bolus 4 : 24 - 48 u na het kalven

Minimum dosering: 2 boli

- Bolus 1 : onmiddellijk na het kalven
- Bolus 2 : 12 - 24 u na het kalven

Als supplement bij calciuminfuus : 2 boli

- Bolus 1 : 2 - 3 u na het infuus
- Bolus 2 : 12 - 15 u na bolus 1

Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoederdeskundige in te winnen.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen: Bovikalc[®] enkel toedienen met een aangepaste applicator. Niet toedienen aan koeien met klinische tekenen van melkziekte omdat hun slikreflex verstoord zou kunnen zijn. Niet toedienen in geval van paresis (verlamming). Alvorens toe te dienen moet u erop letten dat de bolus in goede staat is (de beschermfilm moet intact zijn).

Bewaring : Bewaar Bovikalc[®] op een droge plaats bij een temperatuur beneden 30°C. Elke bolus moet in zijn oorspronkelijke verpakking bewaard blijven tot juist vóór de toediening, aangezien gevoelig voor luchtvochtigheid. Ten minste houdbaar tot : zie "EXP".