

UDDERCARE DUO BASE

NL:

MS UdderCare Duo is een sterk en snel desinfecterend tweecomponenten-tepeldipmiddel op basis van chloordioxide om toe te passen na het melken.

DE:

MS UdderCare Duo ist ein stark und schnell desinfizierendes Zweikomponenten-Zitentauchmittel auf Basis von Chlordioxid zur Anwendung nach dem Melken.

FR:

MS UdderCare Duo est un produit de désinfection puissant et rapide à deux composants pour le trempage des pis, il est conçu sur la base de dioxyde de chlore pour être utilisé après la traite.

DK:

MS UdderCare Duo er et kraftigt og hurtigt virkende to-komponents desinfektionsmiddel til pattedypping baseret på klordioxid, der bruges efter malkningen.

MS Schippers

Passion for farming

2809882

NL: Veiligheidsadviezen: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product han- den grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar de gewaarlijke afvalverwerking. Vormt giftig gas in contact met zuren.

Werkzame stof: Bevat 6 mg/ml natriumchloriet (CAS: 7758-19-2). Het gebruiksklare mengsel met MS UdderCare Duo Activator bevat 0,003 % chloordioxide.

NL: Toepassing: Voor het melken gelijke delen van MS UdderCare Duo Base en MS UdderCare Duo Activator in een schone tepeldipbeker geven en mengen tot de kleur uniform is. De tepels onmiddellijk na het melken tenminste tot 3/4 van hun lengte in de MS UdderCare Duo-oplossing onderdompelen.

Voorzorgsmaatregelen: Alleen met MS UdderCare Duo Activator mengen. Niet verdunnen. Niet met andere chemicaliën mengen. Het liefst alleen een portie voor een melktijd klaar maken. Resten na het melken weggoeden en tepeldipbeker reinigen. Het dragen van handschoenen tijdens het melken wordt aanbevolen. Alleen voor uitwendig gebruik en niet bij vorst toepassen.

Advies voor opslag: Opslaan in gesloten originele verpakking. Beschermen tegen hoge temperaturen, licht en vorst.

Advies voor het verwijderen: Verlopen en niet volledig geleegde verpakkingen alsmede lege containers volgens de geldige voorschriften verwijderen. Niet geheel geleegde containers aan de verkoper teruggeven of als gevaarlijk afval verwijderen.

Gevarenadviezen: Veroorzaakt zware oogirritatie.

Veiligheidsadviezen: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product han- den grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar de gewaarlijke afvalverwerking. Vormt giftig gas in contact met zuren.

Werkzame stof: Bevat 6 mg/ml natriumchloriet (CAS: 7758-19-2). Het gebruiksklare mengsel met MS UdderCare Duo Activator bevat 0,003 % chloordioxide. Verzorgende stoffen: Glycerine, melkzuur (in het kant-en-klare mengsel met MS UdderCare Duo Activator)

Manier van toebereiding: vloeibaar.

Gebruikerskring: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Producttype: PT 3: biozide product voor de hygiëne in de veehouderij. Doelorganismen: Bacteriën.

Benodigde tijd voor de biozide werking: Volgens EN 1276 treedt bij 20°C de biozide werking ook onder hoge belasting na 1 minuut in.

Tijdinterval tussen de toepassingen: Tijd tussen het melken.

Houdbaarheid en chargennummer: Zie print op de voorkant (EXP / LOT).

Desinfectiemiddel voor tepels om onder te dompelen na het melken
BE Gif-alarmering / Antigifcentrum: +32 70 245 245

Batch number/numéro de lot / Chargennummer / número de lote / numero di lotto / Batchnummer

DE: Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Probemabfallentsorgung zuführen. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Wirkstoff: Enthält 6 mg/ml Natriumchlorit (CAS: 7758-19-2). Die gebrauchsfertige Mischung mit MS UdderCare Duo Activator enthält 0,003 % Chloordioxid.

DE: Anwendung: Vor dem Melken gleiche Mengen von MS UdderCare Duo Base und MS UdderCare Duo Aktivator in einen sauberen Zitzentauocher geben und mischen bis die Farbe einheitlich ist. Die Zitzen unmittelbar nach dem Melken mindestens zu 3/4 ihrer Länge in die MS UdderCare Duo-Lösung eintauchen.

Vorsichtsmaßnahmen: Nur mit MS UdderCare Duo Aktivator mischen. Nicht verdünnen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Möglichst nur die Menge für eine Melkzeit anmischen. Reste nach dem Melken werfen und Zitzentauocher reinigen. Das Tragen von Handschuhen während des Melkens wird empfohlen. Nur äußerlich und nicht bei Frost anwenden.

Hinweis zur Lagerung: Im geschlossenen Originalgebinde lagern. Vor hohen Temperaturen, Licht und Frost schützen.

Hinweis zur Entsorgung: Abgelaufene und nicht vollständig entleerte Verpackungen sowie leere Behälter sind gemäß den geltenden Vorschriften einer Entsorgung zuzuführen. Teilentleerte Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder als Sonderabfall entsorgen.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Probemabfallentsorgung zuführen. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Wirkstoff: Enthält 6 mg/ml Natriumchlorit (CAS: 7758-19-2). Die gebrauchsfertige Mischung mit MS UdderCare Duo Activator enthält 0,003 % Chloordioxid.

Pflegestoffe: Glycerin, Milchsäure (in der fertigen Mischung mit MS UdderCare Duo Activator)

Art der Zubereitung: flüssig.

Anwendungsbereich: Ausschließlich für den professionellen Gebrauch. Produkttyp: PT 3 Biozidprodukt für die Hygiene im Veterinärbereich. Zielorganismen: Bakterien.

Benötigte Zeit für die biozide Wirkung: Nach EN 1276 tritt bei 20°C die biozide Wirkung auch unter hoher Belastung nach 1 Min. ein.

Zeitintervall zwischen den Anwendungen: Zeit zwischen den Melkungen.

Halbbarkeit und Chargennummer: Siehe Aufdruck Vorderseite (EXP / LOT)

Zitendeseinfektionsmittel zum Dippen nach dem Melken
BE Gifnotruf: +32 70 245 245

Date of production / Productiedatum / Datum der Herstellung / fecha de fabricación / data di produzione / Produktionsdato

FR: Consignes de sécurité: Conserver hors de la portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Garder sous clef. Contenu/Conteneur de l'élimination des déchets problématique. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Substance active: contient 6 mg/ml chlorite de sodium (CAS: 7758-19-2). Le mélange prêt à l'emploi avec MS UdderCare Duo Activator contient 0,003 % de dioxyde de chlore.

FR: Utilisation: avant de traire, mettre la même quantité de MS UdderCare Duo Base et de MS UdderCare Duo Activator dans un gobelet de trempage des pis propre et mélanger jusqu'à ce que le mélange ait une couleur uniforme. Immédiatement après la traite, tremper au moins les 3/4 des trayons dans la solution MS UdderCare Duo.

Mesures de précaution: mélanger exclusivement avec MS UdderCare Duo Activator. Ne pas diluer. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Si possible, ne mélanger que la quantité nécessaire avant une traite. Jeter les restes après la traite et nettoyer le gobelet de trempage des pis. Il est recommandé de porter des gants pendant la traite. Application externe seulement, ne pas employer en cas de gel.

Recommandation de stockage: conserver dans l'emballage d'origine fermé. Protéger des fortes températures, de la lumière et du gel.

Remarque quand à l'élimination des déchets: les emballages primés mais contenant encore du produit ainsi que les récipients vides doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur pour l'élimination des déchets. Rapporter les récipients partiellement vides ou point de vente où les éliminer en tant que déchets spéciaux.

Risques encourus: provoquer de sérieuses lésions oculaires.

Consignes de sécurité: Conserver hors de la portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Garder sous clef. Contenu/Conteneur de l'élimination des déchets problématique. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Substance active: contient 6 mg/ml chlorite de sodium (CAS: 7758-19-2). Le mélange prêt à l'emploi avec MS UdderCare Duo Activator contient 0,003 % de dioxyde de chlore.

Composants: glycérine, acide lactique (dans le mélange prêt à l'emploi avec Gold-Dip Activateur)

Type de préparation: liquide.

Carde d'utilisateurs: réservé exclusivement à un usage professionnel. Type de produit: PT3: produit biozicide pour l'hygiène à usage vétérinaire. Organismes visés: Bactéries.

Temps nécessaire pour l'effet biozide: selon la norme EN 1276, l'effet biozide intervient à 20°C après 1 minute même en cas de forte infestation.

Intervalle entre les applications: temps entre les traites.
Date de péremption et no du lot: Voir imprimé sur le devant (EXP / LOT)

Produit de désinfection des trayons à tremper après la traite
BE Centre anti-poison: +32 70 245 245

DK: Sikkerhedsvejledning: Opbevares utilgængeligt for børn. Ved henvendelse til læge medbringes etiket eller indpakning. Undgå indånding af tåger/dampe/sprøjtetåger. Vask hænderne grundigt efter brugen af produktet. Anvend beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenskytelse. VED KONTAKT MED ØJENNE: Skyf forsigtigt med vand i flere minutter; fjern om muligt eventuelle kontaktlinser; fortsæt med at skylle. Opbevares i aflåst skab. Indhold/tom emballage skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen. Produktet frigiver giftig gas ved kontakt med syrer.

Virksom stof: indeholder 6 mg/ml natriumklorit (CAS: 7758-19-2). Den brugsklare blanding med MS UdderCare Duo Aktivator indeholder 0,003 % kloridioxid.

DK: Anvendelse: Før malkningen hældes lige store dele af MS UdderCare Duo Base og MS UdderCare Duo Aktivator i et rent bageri til pottedypning, og blandes herefter sammen, indtil farven er ensartet. Umiddelbart efter malkningen dypes mindst 3/4 af pottens længde ned i MS UdderCare Duo-opløsningen.

Førebrydende foranstaltninger: Må kun blandes med MS UdderCare Duo Aktivator. Fortynd ikke. Bland ikke med andre kemikalier. Der bør kun forberedes en portion, der er tilstrækkelig til en malkning. Sidst overskyede væske ud efter malkningen og rengør bageriet. Det anbefales at have handsker på under malkningen. Anvendes kun til udvortes brug og ikke ved temperaturer under frysepunktet.

Opbevaringsvejledning: Opbevares i lukket originalemballage. Beskyttes mod høje temperaturer, lys og frost.

Bortskaffelsesvejledning: Pakker med udløbet holdbarhedsdato, delvist brugte pakker samt tomme beholdere, skal bortskaffes i henhold til gældende regler. Delvist brugte pakker kan returneres til salgsstedet eller bortskaffes som farligt affald.

Føresætning: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedsvejledning: Opbevares utilgængeligt for børn. Ved henvendelse til læge medbringes etiket eller indpakning. Undgå indånding af tåger/dampe/sprøjtetåger. Vask hænderne grundigt efter brugen af dette produkt. Anvend beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenskytelse. VED KONTAKT MED ØJENNE: Skyf forsigtigt med vand i flere minutter; fjern om muligt eventuelle kontaktlinser; fortsæt med at skylle. Opbevares i aflåst skab. Indhold/tom emballage skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen. Produktet frigiver giftig gas ved kontakt med syrer.

Virksom stof: indeholder 6 mg/ml natriumklorit (CAS: 7758-19-2). Den brugsklare blanding med MS UdderCare Duo Aktivator indeholder 0,003 % kloridioxid. Plejende midler: Glycerin, mælkesyre (i den klarjorte blanding med MS UdderCare Duo Aktivator)

Tilberedelsesmetode: Flydende

Type af brugere: Udelukkende til professionelt brug. Produkttype: PT 3: biocidholdigt produkt til desinfektion i husdyrbrug. Målorganismer: Bakterier.

Nødvendig tid for at opnå den biozide virkning: I henhold til EN 1276 begynder den biozide virkning efter 1 minut ved 20 °C, også ved højt bakteriertryk.

Tidsinterval mellem anvendelserne: Tidsrummet mellem malkningerne.

Holdbarhed og batchnummer: Se printet på forsiden (EXP / LOT).

Desinfektionsmiddel til dypning af pletter efter malkning
DK Giflinien: +45 82 12 12 12

Registrationsnummer/Registreringsnummer/numéro d'enregistrement/registrisnummer:
BE: BE-REG-00285
DE: IN-86401
FR: 61742
DK: 4258253

19-05-2020/F

MS Schippers
Passion for farming

Schippers Europe BV
Rond Deal 12
5531 AH Bladl (NL)
Tel: 0497-339771

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: 014-672356

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Karken (D)
Tel: 02833 – 923 60

Schippers France Sarl
La Martinière BP 10
35310 Bréal sous
Montfort (F)
Tel : 02 99 85 47 47

Schippers Danmark
ApS
Rond Deal 12
5531 AH Bladl (NL)
Tel: +4589884187

Download app!
Scan this product



2809882