


EN: Hazard statements: H318 Eye Dam. 1: Causes serious eye damage. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. **Precautionary statements:** P102 Keep out of reach of children. P280 Wear eye protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a doctor. P391 Collect spillage. P501 Dispose of contents/container to be handed over to the person authorized to dispose of waste or by returning to the supplier. **FR: Mentions de danger:** H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves lésions des yeux. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Conseils de prudence:** P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un médecin. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans le remettant à une personne autorisée à éliminer les déchets ou en le retournant au fournisseur.



3106533
Danger

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (zinc glycinate)

EN: Contains:
Zinc Glycinate

Active ingredient:

Zinc amino acid chelate: 230.0 g/l
L-Lysine monohydrochloride: 5.0 g/l
Methionine (DL): 2.0 g/l
Magnesium chloride: 0.3 g/l
Propylene glycol: 1.0 ml/l
Fulvic acid: 4.4 ml/l

List of Excipient ingredients:

1,2,3-Propanetriol, Mono-and diglycerides, Aqua

Dosage form: Liquid

Recommended Use or Purpose:

Helps maintain digestive and gastrointestinal health.

Route of Administration: Oral

Recommended Dose:

Swine, Chickens and Turkeys:
Dose: 100 - 600 ml to 1000 liters drinking water
The product should be added to the drinking water via a dosing pump.

There are two possibilities:

1. Via a dosing pump directly from the can. No stock solution is required. Dosing pump rate is 100 - 600 mL per 1000L. Replace the can when empty.
2. Prepare a stock solution of 1% - 6%. Dosing pump rate is 1L per 100L. Stock solution should be replaced every 1 or 2 days.

Daily intake should not result in the animal receiving more than the maximum nutrient values in animal feeds for zinc as per the Feed Regulations"

Cautions/Contraindications:

Not for long term use, unless directed by a veterinarian
This VHP may not be incorporated into a mixed feed

Warnings

No withdrawal period is required when used according to the label
Keep out of the reach of children

Best before: 24 months after the date of manufacture.

Veterinary Health Product

Notification number: NN.Y1H1

FR: Contient:
Glycinate de zinc

Principe actif:

Chélate d'acides aminés de zinc : 230,0 g/l
Chlorhydrate de L-lysine : 5,0 g/l
Méthionine (DL) : 2,0 g/l
Chlorure de magnésium : 0,3 g/l
Propylène glycol : 1,0 ml/l
Acide fulvique : 4,4 ml/l

Liste des excipients:

1,2,3-propanetriol, mono- et diglycérides, eau

Forme galénique: Liquide

Utilisation ou objectif recommandé:

Contribue au maintien de la santé digestive et gastro-intestinale.

Voie d'administration: Orale

Dose recommandée:

Porcs, poulets et dindes :
Dose : 100 à 600 ml pour 1 000 litres d'eau de boisson
Le produit doit être ajouté à l'eau de boisson à l'aide d'une pompe doseuse.

Deux possibilités s'offrent à vous:

1. À l'aide d'une pompe doseuse directement à partir du bidon. Aucune solution mère n'est nécessaire. Le débit de la pompe doseuse est de 100 à 600 ml pour 1 000 L. Remplacer le bidon lorsqu'il est vide.
2. Préparer une solution mère à 1 % - 6 %. Le débit de la pompe doseuse est de 1 L pour 100 L. La solution mère doit être renouvelée tous les 1 ou 2 jours.

L'apport quotidien ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs maximales de zinc autorisées dans les aliments pour animaux, conformément à la réglementation sur l'alimentation animale.

Précautions/Contre-indications:

Ne pas utiliser à long terme, sauf sur avis d'un vétérinaire
Ce VHP ne doit pas être incorporé dans un aliment composé

Avvertissements

Aucun délai d'attente n'est requis lorsque le produit est utilisé conformément à l'étiquette
Tenir hors de portée des enfants

À utiliser de préférence: avant 24 Mois après la date de fabrication

Produit de santé animale

UFI: 7SP5-Q0KH-T001-PS9A

26 LV 05

