

Complementary dietetic feed for calves and piglets. Stabilisation of water and electrolyte balance to support the physiological digestion

Directions for use

In case of risk of digestive disorders (diarrhea) Do not administer VZ-solution to calves for more than 3 days. Afterwards 1 or 2 feedings should be of milk. Administration of VZ-solution for too long causes weight-loss in the animals and a difficult transition to normal rations. Do not administer as prevention to animals that need to absorb the colostrum of the mother (36-48 hours after birth), because the danger exists that the animals will drink the Electrolytes mix and not or not enough colostrum with its important immuno-globulins.

It is recommended to consult a veterinarian before use.

Aanvullend diervoeder voor kalveren en biggen. Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering.

Gebruiksaanwijzing

In geval van risico op spijsverteringsstoornissen (diarree) Niet langer dan 3 dagen VZ Poeder verstrekken. Daarna moeten bij kalveren 1 à 2 voedingen uit melk bestaan. Te lang verstrekken heeft namelijk als gevolg, dat de dieren te veel gewicht verliezen en moeilijk overschakelen op hun normale rantsoen. Niet preventief verstrekken aan dieren die nog biest moeten opnemen van de moeder (36-48 uur na geboorte), omdat het gevaar bestaat, dat als de dieren VZ Poeder drinken ze geen of weinig biest binnen krijgen en zo belangrijke antistoffen missen.

Aangeraden wordt om voor gebruik een dierenarts te raadplegen

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber und Ferkel. Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

Gebrauchsanweisung

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall). Nicht länger denn 3 Tage VZ-Pulver verabreichen. Danach müssen 1 – 2 Futtergaben aus Milch bestehen. Zu lange Verwendung dieses Mittels kann nämlich zur Folge haben, dass die Tiere zu viel Gewicht verlieren und schlecht auf die normale Ration gebracht werden können. Nicht präventiv bei Tieren anwenden, die noch Biestmilch von der Mutter aufnehmen müssen (36-48 Stunden nach der Geburt), weil die Gefahr besteht, dass die Tiere Elektrolytenmisch trinken und keine oder nur wenig Biest, die die wichtigen Antistoffe enthält.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Aliment complémentaire diététique pour veaux et porcelets. Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique

Mode d'emploi

En cas de troubles digestifs (diarrhée) Ne pas administrer le VZ-poudre aux veaux pendant une période de plus de 3 jours. Après cette période, les repas seront constitués d'un produit d'allaitement. Si on attend trop longtemps avant de commencer le traitement, les animaux auront perdu trop de poids ce qui rend difficile la transition vers la ration normale. Ne pas administrer préventivement aux animaux qui n'ont pas encore reçu le colostrum maternel (36-48 heures après la naissance). Le risque existe que les animaux, ayant bu la solution de VZ-poudre, ne puissent plus ingérer suffisamment le colostrum.

Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant l'utilisation.

Pienso complementario dietético para terneros y lechones. Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico para apoyar la digestión fisiológica

Modo de empleo

En caso de problemas digestivos (diarrea) No se debe administrar a terneros durante un período superior a 3 días. Pasado este período, las comidas deberían ser de leche. La administración de la solución VZ por mucho tiempo causa pérdida de peso y dificultades al pasar a la comida normal. No se debe administrar a animales que aún necesitan el calostro de la madre (36-48 horas después de nacer), pues existe el riesgo de que los animales habiendo bebido la mezcla de electrolitos no puedan ingerir suficientemente el calostro.

Antes de uso, se recomienda consultar a un veterinario.

Calves: Administer instead of artificial milk. Use 30gr VZ-powder in 1 liter lukewarm water. Administer 1 liter solution per 10 kg body weight per day.

Piglets: Use 30 gr VZ-powder in 1 liter lukewarm water per litter. A measuring cup of 20 gram is included in the bucket.

Analytical components

Crude protein	0.0%	Phosphorus	0.0%
Crude fiber	0.0%	Sodium	7.5%
Crude fat	0.0%	Magnesium	0.05%
Crude ashes	25%	Potassium	1.25%
Calcium	0.0%		

Composition

Dextrose, sodium chloride, Sodium bicarbonate, Potassium Chloride, Magnesium sulfate

Kalveren: Te verstrekken in plaats van kunstmelk. Per 10 kg lichaamsgewicht dient 1 liter oplossing per dag verstrekt te worden.

Biggen: 30gr VZ-poeder op 1 liter lauw drinkwater voor 1 toom biggen. In de emmer is een maatbeker voor 20 gram product bijgesloten.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	0%	Fosfor	0,0%
Ruwe celstof	0%	Natrium	7,5%
Ruw vet	0%	Magnesium	0,05%
Ruwe as	25%	Kalium	1,25%
Calcium	0,0%		

Samenstelling:

Dextrose, Natriumchloride, Natrium bicarbonaat, Kaliumchloride, Magnesiumsulfaat

Kälber: Anstelle von Kunstmilch verabreichen. 30 Gramm VZ-Pulver auflösen in 1 Liter lauwarmes Trinkwasser (zirka 40°C). Pro 10 kg Lebensgewicht muss 1 Liter Lösung pro Tag verabreicht werden.

Ferkel: 30 Gramm VZ-Pulver auflösen in 1 Liter lauwarmes Trinkwasser für 1 Wurf Ferkel. Im Eimer befindet sich ein Messbecher für 20 g.

Analytische Bestandteile

Rohprotein	0.0%	Phosphor	0.0%
Rohfaser	0.0%	Natrium	7.5%
Rohfett	0.0%	Magnesium	0.05%
Rohasche	25%	Kalium	1.25%
Calcium	0.0%		

Zusammensetzung

Dextrose, Natriumchloride, Natrium Bikarbonat, Kaliumchloride, Magnesiumsulfaat
Kohlhydrate Quelle: Dextrose

Veaux: A administer au lieu d'un aliment d'allaitement. Diluer 30 grammes de VZ-poudre dans 1 litre d'eau à 40°C. Par 10 kg de poids corporel il faut administrer 1 litre de solution par jour.

Porcelets: 30 grammes de VZ-poudre dans 1 litre d'eau tiède par portée de porcelets. Dans le seau il se trouve une mesure pour 20 grammes.

Constituants analytiques

Protéine brute	0.0%	Phosphore	0.0%
Cellulose brutes	0.0%	Sodium	7.5%
Matières grasses brutes	0.0%	Magnésium	0.05%
Cendres brutes	25%	Potassium	1.25%
Calcium	0.0%		

Composition

Dextrose, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, chlorure de potassium, sulfate de magnésium

Terneros: Administrar como un sustituto de leche. Disolver 30 gramos de Polvos VZ en 1 litro de agua tibia. Para 10 kg de peso corporal es necesario administrar 1 litro de solución al día.

Lechones: Disolver 30 gramos de Polvos VZ en 1 litro de agua tibia. En el cubo se incluye una unidad de medida de 20 gramos.

Componentes analíticos

Proteína bruta:	0.0%	Fósforo:	0.0%
Fibra cruda:	0.0%	Sodio:	7.5%
Grasa cruda:	0.0%	Magnesio:	0.05%
Cenizas brutas:	25%	Potasio:	1.25%
Calcio:	0.0%		

Composición:

Dextrosa, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio.

α BE 4013 Lot N°

Tenminste houdbaar tot/ Best before/Mindestens haltbar bis/ A utiliser de préférence avant/Consumir preferentemente antes de/Da consumarsi preferibilmente el:

21 LO 09

