

**NL: Aanvullend dietvoeder voor kalveren en biggen**

Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering

**Analytische Bestanddelen:**

Ruw eiwit	0,25%	Ruw vet	0,5%
Ruwe vezel	0,0%	Ruwe as	22,0%
Natrium	9,1%	Lysine	0,0%
Methionine	0,0%		

**Toevoegingsmiddelen per kg:**

Zootechnische toevoegingsmiddelen  
1,15 x 1010 KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181) 4b 1708  
(Prebiotische melkzuurbacteriën)

**Samenstelling:** Lactose, Natriumbicarbonaat, Citroenzuur, Natriumcarbonaat, Kaliumchloride

**Gebruiksaanwijzing:****Bij kalveren:**

- **Ter preventie van darmstoornissen of bij aangekochte kalveren:**  
Dagelijks 1 tablet in 1 L lauwwater oplossen. Aanbieden naast de normale voeding tot max 7 dagen.
- **Ter preventie bij de eerste tekenen van darmstoornissen:**  
Dagelijks 2 tabletten in 2 L lauwwater oplossen. Aanbieden naast de normale voeding tot max 7 dagen.
- **Ter compensatie van acuut vochtverlies bij diarree:**  
2 tabletten in 2 L lauwwater oplossen. Tweemaal daags voor tenminste 2 dagen naast de normale voeding.

**Gebruik bij biggen:**

- **Ter preventie en ter compensatie van vochtverlies bij diarree:**  
1 tablet in 1 liter lauwwater oplossen voor 1 toom biggen. Tweemaal per dag, gedurende 2-4 dagen.
- Het wordt aangeraden voor gebruik het advies van een dierenarts in te winnen.
- Buiten bereik van kinderen houden. Koel, droog en in gesloten, originele verpakking bewaren.

**EN: Complementary dietetic feed for calves and piglets**

Stabilisation of water and electrolyte balance to support the physiological digestion

**Analytical Components:**

Crude protein	0,25%	Crude fat	0,5%
Crude fiber	0,0%	Crude ash	22,0%
Sodium carbonate	9,1%	Lysine	0,0%
Methionine	0,0%		

**Additives per kg:**

Zootechnical additives  
1,15 x 1010 KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181) 4b 1708  
(Probiotic lactic acid bacteria)

**Composition:** Lactose, sodium bicarbonate, citric acid, Sodium carbonate, potassium chloride

**Directions for use:****For calves:**

- **For prevention of intestinal problems or for acquired calves:**  
Dissolve 1 tablet in 1 L of warm water daily. Provide additional to normal feed to max 7 days.
- **At first appearance of intestinal problems:**  
Dissolve 2 tablets in 2 L of warm water daily. Provide additional to normal feed to max 7 days.
- **For compensation of acute fluid loss from diarrhea:**  
Dissolve 2 tablets in 2 L of warm water. Twice a day for max 2 days additional to normal feed.

**For piglets:**

- **For prevention and compensation of fluid loss from diarrhea:**  
Dissolve 1 tablet in 1 L of warm water for one litter. Twice a day during 2-4 days.
- It is recommended to consult a veterinarian before using this product.
- Keep out of reach of children. Store in a cool, dry place in the original packaging.

**DE: Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber und Ferkel**

Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

**Analytische Bestandteile:**

Rohprotein	0,25%	Rohfett	0,5%
Rohfaser	0,0%	Rohasche	22,0%
Natrium	9,1%	Lysin	0,0%
Methionin	0,0%		

**Zusatzstoffe je kg:**

Zootechnische Zusatzstoffe  
1,15 x 1010 KBE Enterococcus faecium (NCIMB)11181) 4b 1708  
(Milchsäurebakterien-Probiotikum)

**Zusammensetzung:** Laktose, Natriumbicarbonat, Zitronensäure, Natriumcarbonat, Kaliumchlorid

**Gebruiksaanwijzing:****Für Kälber:**

- **Zur Prävention von Durchfallkrankungen oder als Einstallprophylaxe bei Zukaufkälbern:**  
Täglich 1 Tablette in 1 l lauwarmem Wasser auflösen. Als Zwischentränke bis max. 7 Tage zu verwenden. Milchtränke (morgens/abends) beibehalten.
- **Zur Prävention bei ersten Anzeichen von Durchfall:**  
Täglich 2 Tabletten in 2 l lauwarmem Wasser auflösen. Als Zwischentränke bis max. 7 Tage zu verwenden. Milchtränke (morgens/abends) beibehalten.
- **Zum Ausgleich eines akuten Flüssigkeitsverlustes bei Durchfall:**  
2 Tabletten in 2 l lauwarmem Wasser auflösen. Als Zwischentränke zweimal täglich über mind. 2 Tage zu verwenden. Milchtränke (ggf. reduziert) beibehalten.

**Für Ferkel:**

- **Zur Prävention und zum Ausgleich eines Flüssigkeitsverlustes bei Durchfall:**  
Für einen Wurf: Täglich 1 Tablette in 1 l lauwarmem Wasser auflösen und über 2-4 Tage verabreichen.
- Es wird empfohlen, vor der Fütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.
- Außer Reichweite von Kindern, trocken und kühl im fest verschlossenen Kunststoffeimer (Originalverpackung) aufbewahren.

**FR: Aliment complémentaire diététique pour veaux et porcelets**

Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique

**Composants analytiques :**

Protéines brutes	0,25 %	Matières grasses brutes	0,5 %
Fibres brutes	0,0 %	Cendres brutes	22,0 %
Sodium	9,1 %	Lysine	0,0 %
Méthionine	0,0 %		

**Additifs par kg :**

Additifs zootechniques  
1,15 x 1010 KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181) 4b 1708  
(bactéries lactiques prébiotiques)

**Composition :** lactose, bicarbonate de sodium, acide citrique, carbonate de sodium, chlorure de potassium

**Mode d'emploi:****Utilisation chez les veaux :**

- **En prévention des désordres digestifs ou pour les veaux achetés :**  
1 comprimé dissous dans 1 litre d'eau tiède par jour. À administrer en plus de l'alimentation normale jusqu'à max. 7 jours.
- **En prévention dès les premiers signes de désordres digestifs :**  
2 comprimés dissous dans 2 litres d'eau tiède par jour. À administrer en plus de l'alimentation normale jusqu'à max. 7 jours.
- **Pour compenser la perte de liquide en cas de diarrhée aiguë :**  
2 comprimés dissous dans 2 litres d'eau tiède. Deux fois par jour durant au moins 2 jours en plus de l'alimentation normale.

**Utilisation chez les porcelets :**

- **En prévention et pour compenser la perte de liquide en cas de diarrhée :**  
1 comprimé dissous dans 1 litre d'eau tiède pour 1 portée de porcelets. Deux fois par jour, durant 2 à 4 jours.
- Nous vous recommandons avant utilisation de prendre conseil auprès d'un vétérinaire.
- Tenir hors de portée des enfants. Conserver au frais, au sec et dans l'emballage d'origine fermé.

**ES: Pienso complementario Dietéticos para terneros y lechones**

Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico para apoyar la digestión fisiológica

**Componentes analíticos:**

Proteína cruda	0,25%	Grasa cruda	0,5%
Fibra cruda	0,0%	Cenizas brutas	22,0%
Carbonato de Sodio	9,1%	Lisina	0,0%
Metionina	0,0%		

**Additivos por kg:**

Additivos zootécnicos  
1,15 x 1010 KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181) 4b 1708  
(Bacterias probióticas de ácido láctico).

**Composición:** Lactosa, bicarbonato de sodio, ácido cítrico, Carbonato de Sodio, Cloruro de potasio.

**Instrucciones de uso:****Para TERNEROS:**

- **Para prevención de problemas intestinales y para problemas intestinales:**  
Diluir 1 comprimido en 1 litro de agua tibia diariamente. Añadir al pienso normal durante un máximo de 7 días.
- **Primeros síntomas de problemas intestinales:**  
Disolver 2 comprimidos en 2 litros de agua. Añadir al pienso normal dos veces al día durante máximo 2 días.

**Para LECHONES:**

- **Para prevención y compensación de pérdida de líquidos por diarrea:**  
Diluir 1 comprimido en 1 litro de agua tibia. Administrar dos veces al día durante 2-4 días.
- Se recomienda consultar con un veterinario antes de utilizar este producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar fresco y seco en el envase original.

**IT: Mangime complementare dietetici per vitelli e suinetti**

Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica

**Componenti analitici:**

Proteine crude	0,25%	Grassi crudi	0,5%
Fibre grezze	0,0%	Ceneri grezze	22,0%
Carbonato di Sodio	9,1%	Lisina	0,0%
Metionina	0,0%		

**Additivi per kg:**

Additivi zootecnici  
1,15 x 1010 KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181) 4b 1708  
(Batteri probiotici dell'acido lattico)

**Composizione:** Lattosio, Bicarbonato di sodio, Acido citrico, Carbonato di Sodio, Cloruro di potassio

**Istruzioni per l'uso:****Per vitelli:**

- **Per la prevenzione di problemi intestinali o per vitelli acquisiti:**  
Sciogliere una compressa in 1 Lt di acqua calda ogni giorno. Aggiungere l'integratore al mangime normale per massimo 7 giorni.
- **Alla prima comparsa di problemi intestinali:**  
Sciogliere 2 compresse in 2 Lt di acqua calda ogni giorno. Aggiungere integratore al mangime normale per massimo 7 giorni.
- **Per compensare perdite acute di liquido a causa della diarrea:**  
Sciogliere 2 compresse in 2 Lt di acqua calda ogni giorno. Da integrare al mangime normale due volte al giorno per massimo 2 giorni.

**Per suinetti:**

- **Per la prevenzione e la compensazione di perdite di liquidi a causa della diarrea:**  
Sciogliere una compressa in 1 Lt di acqua calda per ogni nidata. Somministrare due volte al giorno per 2-4 giorni.
- Si raccomanda di consultare un veterinario prima di utilizzare questo prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco e asciutto, nella sua confezione originale.

