

# MS

# FIT2GO

## MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

### EN

Complementary dietetic feed for calves and piglets.

**Stabilisation of water and electrolyte balance to support the physiological digestion.**

### FR

Aliment complémentaire diététique pour veaux et porcelets.

**Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique.**

### NL

Aanvullend dietvoeder voor kalveren en biggen.

**Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering**

### ES

Pienso complementario Dietéticos para terneros y lechones.

**Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico para apoyar la digestión fisiológica.**

### DE

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber und Ferkel.

**Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.**

### IT

Mangime complementare dietetici per vitelli e suinetti.

**Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica.**

## HYDRO-TAB



POWERED BY

**DENKAVIT**  
GROWING TOGETHER

[www.schippers.eu](http://www.schippers.eu)

**NL: Analytische Bestanddelen:**

Lactose	48,7%
Ruw wit	0,1%
Ruwe celstof	0,0%
Ruw vet	0,6%
Ruwe as	25,8%
Natrium	9,2%

**Toevoegingsmiddelen per kg:**

- Conservemiddelen  
Citroenzuur (1a330) 138.000 mg  
- Aromatische stoffen  
2b Mengsel van aromatische stoffen 343 mg  
Darmflora stabilisatoren  
Enterococcus lactis (NCIMB 10415) (4b1705)  
16.333MCFU

- Antioxi-danten  
Butylhydroxytoluëen (BHT)(E321) 5.9 mg

**Samenstelling:** Lactose, Natriumbicarbonaat, Natriumcarbonaat, Kaliumchloride, Aardappelzetmeel, Raapzaadolie (geraffineerd), Dextrose. Door splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren (palm, palmpit)

**Gebruiksaanwijzing:**

In geval van risico op spijsverteringsstoornissen (diarree), tijdens en na die stoornissen. Aangeraden wordt het vóór gebruik of voor verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. Dieren met een leemaag moeten niet tegelijkertijd melk gevoed worden.

Het gekijldig gebruik van verschillende organische zuren, waarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

**Bij kalveren:**

• **Ter preventie van darmstoornissen of bij aangekochte kalveren:**

Dageelijks 1 tablet in 1 L lauwwarm oplossen. Aanbeiden naast de normale voeding tot max 7 dagen.

• **Ter preventie bij de eerste tekenen van darmstoornissen:**

Dageelijks 2 tabletten in 2 L lauwwarm oplossen. Aanbeiden naast de normale voeding tot max 7 dagen.

• **Ter compensatie van acuut vochtverlies bij diarree:**

2 tabletten in 2 L lauwwarm oplossen. Tweemaal daags voor tenminste 2 dagen naast de normale voeding.

**Gebruik bij biggen:**

• **Ter preventie en ter compensatie van vochtverlies bij diarree:**

1 tablet in 1 liter lauwwarm oplossen voor 1 toom biggen.

Tweemaal per dag, gedurende 2-4 dagen

Buiten bereik van kinderen houden. Koel, droog en in gesloten, originele verpakking bewaren.

26 LV 04

Batch no.:  
See imprint on the front label

Production date:  
See imprint on the front label

**EN: Analytical Components:**

Lactose	48,7%
Crude protein	0,1%
Crude fibre	0,0%
Crude fats	0,6%
Crude ash	25,8%
Sodium	9,2%

**Additives per kg:**

- Preservatives  
Citric acid (1a330) 138.000 mg  
- Flavouring compounds  
2b Mixture of aromatic substances 343 mg  
Gut flora stabilisers  
Enterococcus lactis (NCIMB 10415) (4b1705)  
16.333MCFU

- Antioxidants  
Butylated hydroxytoluene (BHT) (E321) 5.9 mg

**Composition:** Lactose, Sodium bicarbonate, Sodium carbonate, Potassium chloride, Potato starch, Rapeseed oil (refined), Dextrose, Pure distilled fatty acids obtained by splitting (palm, palm kernel)

**Directions for use:**

In case of risk of, during periods of, or recovery from digestive disturbance (diarrhoea), it is recommended that advice from a veterinarian be sought before use and before extending the period of use. Simultaneous feeding of milk should be avoided in animals with abomasum

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

**For calves:**

• **For prevention of intestinal problems or for acquired calves:**

Dissolve 1 tablet in 1 L of warm water daily. Provide additional to normal feed to max 7 days.

• **At first appearance of intestinal problems:**

Dissolve 2 tablets in 2 L of warm water daily. Provide additional to normal feed to max 7 days.

• **For compensation of acute fluid loss from diarrhoea:**

Dissolve 2 tablets in 2 L of warm water. Twice a day for max 2 days additional to normal feed.

**For piglets:**

• **For prevention and compensation of fluid loss from diarrhoea:**

Dissolve 1 tablet in 1 L of warm water for one litter.

Twice a day during 2-4 days

Keep out of reach of children. Store in a cool, dry place in the original packaging.

**DE: Analytische Bestandteile:**

Laktose	48,7%
Rohprotein	0,1%
Rohfaser	0,0%
Rohöl	0,6%
Rohasche	25,8%
Natrium	9,2%

**Zusatzstoffe je kg:**

- Konservierungsmittel  
Zitronensäure (1a330) 138.000 mg  
- Aromastoffe  
2b Gemisch aus aromatischen Stoffen 343 mg  
Darmflora stabilisatoren  
Enterococcus lactis (NCIMB 10415) (4b1705)  
16.333MCFU

- Antioxi-dationsmittel  
Butylhydroxy-Toluol (BHT)(E321) 5.9 mg

**Zusammensetzung:** Lactose, Natriumbicarbonat, Natriumcarbonat, Kaliumchlorid, Kartoffelstärke, Rapsöl (raffiniert), Trauben Zucker, Durch Spaltung gewonnene reine destillierte Fettsäuren (Palm, Palmkern)

**Gebrauchs-anweisung:**

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall), Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Die gleichzeitige Verfütterung von Milch sollte bei Tieren mit Labmagern vermieden werden.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

**Für Kalber:**

• **Zur Prävention von Durchfallkrankungen oder als Einstallprophylaxe bei Zukaufkalbern:**

Täglich 1 Tablette in 1 lauwwarm Wasser auflösen. Als Zwischen-tränke bis max. 7 Tage zu verwenden. Milch-tränke (morgens/abends) beibehalten.

• **Zur Prävention bei ersten Anzeichen von Durchfall:**

Täglich 2 Tabletten in 2 lauwwarm Wasser auflösen. Als Zwischen-tränke bis max. 7 Tage zu verwenden. Milch-tränke (morgens/abends) beibehalten.

• **Zum Ausgleich eines akuten Flüssigkeitsverlustes bei Durchfall:**

2 Tabletten in 2 lauwwarm Wasser auflösen. Als Zwischen-tränke zweimal täglich um mind. 2 Tage zu verwenden. Milch-tränke (ggf. reduziert) beibehalten.

**Für Ferkel:**

• **Zur Prävention und zum Ausgleich eines Flüssigkeitsverlustes bei Durchfall:**

Für einen Wurf: Täglich 1 Tablette in 1 lauwwarm Wasser auflösen und über 2-4 Tage verabreichen.

Außer Reichweite von Kindern, trocken und kühl im fest verschlossenen Kunststoffeimer (Originalverpackung) aufbewahren.

**FR: Composants analytiques :**

Lactose	48,7%
Protéine brute	0,1%
Celulose brute	0,0%
Matières grasses brutes	0,6%
Rohasche	25,8%
Sodium	9,2%

**Additifs par kg :**

- Conservateurs  
Acide citrique (1a330) 138.000 mg  
- Substances aromatiques  
2b Mélange de substances aromatiques 343 mg  
Stabilisateurs de la flore intestinale  
Enterococcus lactis (NCIMB 10415) (4b1705)  
16.333MCFU

- Antioxygènes  
Butylhydroxy-Toluol (BHT)(E321) 5.9 mg

**Composition :** Lactose, Bicarbonate de sodium, Carbonate de sodium, Chlorure de potassium, Amidon de pomme de terre, Huile de colza (raffinée), Dextrose, Acides gras distillés purs obtenus par fractionnement (palmes, palmist)

**Mode d'emploi:**

En cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), durant et après ceux-ci, il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d'utilisation. L'apport simultané de lait devrait être évité chez les animaux pousés d'une caillotte.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

**Utilisation chez les veaux :**

• **En prévention des désordres digestifs ou pour les veaux achetés :**

1 comprimé dissous dans 1 litre d'eau tiède par jour. À administrer en plus de l'alimentation normale jusqu'à max. 7 jours.

• **En prévention dès les premiers signes de désordres digestifs :**

2 comprimés dissous dans 2 litres d'eau tiède par jour. À administrer en plus de l'alimentation normale jusqu'à max. 7 jours.

• **Pour compenser la perte de liquide en cas de diarrhée :**

2 comprimés dissous dans 2 litres d'eau tiède. Deux fois par jour durant au moins 2 jours en plus de l'alimentation normale.

**Utilisation chez les porcelets :**

• **En prévention et pour compenser la perte de liquide en cas de diarrhée :**

1 comprimé dissous dans 1 litre d'eau tiède pour 1 portée de porcelets. Deux fois par jour, durant 2 à 4 jours.

Tenir hors de portée des enfants. Conserver au frais, au sec et dans l'emballage d'origine fermé.

**ES: Componentes analíticos:**

Lactosa	48,7%
Proteína bruta	0,1%
Fibra bruta	0,0%
Grasa bruta	0,6%
Ceniza bruta	25,8%
Sodio	9,2%

**Additivos por kg:**

- Conservantes  
Ácido cítrico (1a330) 138.000 mg  
- Aromatizantes  
2b Mezcla de sustancias aromáticas 343 mg  
Estabilizadores de la flora intestinal  
Enterococcus lactis (NCIMB 10415) (4b1705)  
16.333MCFU

- Antioxidantes  
Butilhidroxitolueno (BHT)(E321) 5.9 mg

**Composición:** Lactosa, Bicarbonato de sodio, Carbonato de sodio, Cloruro de potasio, Almidón de patata, Aceite de colza (refinado), Dextrosa, Ácidos grasos destilados puros obtenidos por hidrólisis (palmes, palmist)

**Instrucciones de uso:**

En caso de riesgo de trastornos digestivos (diarrea), durante los mismos y durante la recuperación. Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Debería evitarse la alimentación simultánea con leche en animales con cuajar.

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

**PAR TERNEROS:**

• **Para prevención de problemas intestinales y para problemas intestinales:**

Diluir 1 comprimido en 1 litro de agua tibia diariamente. Añadir al pienso normal durante un máximo de 7 días.

• **Primeros síntomas de problemas intestinales:**

Diluir 2 comprimidos en 2 litros de agua. Añadir al pienso normal dos veces al día durante un máximo de 7 días.

• **PAR LECHONES:**

• **Para prevención y compensación de pérdida de líquidos por diarrea:**

Diluir 1 comprimido en 1 litro de agua tibia. Administrar dos veces al día durante 2-4 días.

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar fresco y seco en el envase original.

Made in the Netherlands  
NL01979

Net weight 1.584 kg

**IT: Componenti analitici:**

Lattosio	48,7%
Proteina grezza	0,1%
Cellulosa grezza	0,0%
Grassi grezzi	0,6%
Ceneri grezze	25,8%
Sodio	9,2%

**Additivi per kg:**

- Conservanti  
Acido citrico (1a330) 138.000 mg  
- Aromatizzanti  
2b Miscela di sostanze aromatiche 343 mg  
Stabilizzatori della flora intestinale  
Enterococcus lactis (NCIMB 10415) (4b1705)  
16.333MCFU

- Antiossidanti  
Butilossitoluene (BHT)(E321) 5.9 mg

**Composizione:** Lattosio, Bicarbonato di sodio, Carbonato di sodio, Cloruro di potassio, Amido di patate, Olio di colza (raffinato), Dextrosio, Acidi grassi puri distillati ottenuti per scissione (palma, palmist)

**Istruzioni per l'uso:**

In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea), nei periodi nei quali tali disturbi sono presenti e nei periodi di convalescenza successivi. Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. In animali con abomaso la somministrazione simultanea di latte andrebbe evitata.

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

**Per vitelli:**

• **Per la prevenzione di problemi intestinali o per vitelli acquistati:**

Sciogliere una compressa in 1 Lt di acqua calda ogni giorno. Aggiungere l'integratore al mangime normale per massimo 7 giorni.

• **Alla prima comparsa di problemi intestinali:**

Sciogliere 2 compresse in 2 Lt di acqua calda ogni giorno. Aggiungere l'integratore al mangime normale per massimo 7 giorni.

• **Per compensare perdite acute di liquido a causa della diarrea:**

Sciogliere 2 compresse in 2 Lt di acqua calda ogni giorno. Da integrare al mangime normale due volte al giorno per 2-4 giorni.

**Per suinetti:**

• **Per la prevenzione e la compensazione di perdite di liquidi a causa della diarrea:**

Sciogliere una compressa in 1 Lt di acqua calda per ogni nidata. Somministrare due volte al giorno per 2-4 giorni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco e asciutto, nella sua confezione originale.

3109662

Schippers Export  
EU BV  
SchippersAfrica BV  
Schippers APAC BV  
Schippers LATAM BV  
Schippers ME BV  
Tel: +31(0)497-339774

All located in:  
Schippers Europe BV  
Smardagweg 60  
5527 LB Hapert  
Tel: +31(0)497-339 779

België:  
Schippers BV  
Grens 114  
2370 Arendonk (BE)  
Tel: 014-672356

Deutschland:  
Schippers GmbH  
Kölner Straße 62,  
47547 Kerker (D)  
Tel: 02833-92360

France:  
Schippers France Sarl  
ZA de la Retaudais -  
CS 10009  
35137 BEDEE (FR)  
Tel: 02 99 61 40 40

España:  
Schippers Agrícola SL  
Ctra. Montmeil 76  
CS 10009  
Barcelona - España  
Tel. 935 689 128

Italia:  
Schippers Italia Srl.  
Via Belvedere 84,  
08403 Alzano  
Lombardo (BG)  
Tel: 035-4490369