MS Schippers — MS STRAW BRICKETS 25 kg

3409835

EN: Complementary feed for pigs and poultry

Directions for use
40 g / animal / day The daily ration may not contain more than 1,5% of this feed supplement.

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

Total quantity of clinoptilolite of sedimentary origin from all sources shall not exceed the maximum content of 10 000 mg.

Composition
Spelled husks

Analytical constituents

Crude protein	0,0%
Crude fibre	30%
Crude fats	0,0%
Crude ash	18,0%
Lysine	0,0%
Methionine	0,0%
Calcium	0,05%
Sodium	0,0%
Phosphorus	0,15%

Additives per kg:
- Preservatives
Propionic acid (1k280) 242 mg
Ammonium propionate (1k284) 263 mg
- Binders
Lignosulphonates (1g565) 81 mg
Clinoptilolite of sedimentary origin (1g568) 68.560 mg

Storage
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

NL: Aanvullend diervoeder voor varkens en pluimvee

Gebruiksaanwijzing
40 g/ dier/ dag Het dagrantsoen mag voor maximaal 1,5% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

De totale hoeveelheid clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong van alle bronnen mag niet meer bedragen dan 10 000 mg.

Samenstelling
Speltschillen

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	0,0%
Ruwe celstof	30%
Ruw vet	0,0%
Ruwe as	18,0%
Lysine	0,0%
Methionine	0,0%
Calcium	0,05%
Natrium	0,0%
Fosfor	0,15%

Toevoegingsmiddelen per kg:
- Conserveermiddelen
Propionzuur (1k280) 242 mg
Ammoniumpropionaat (1k284) 263 mg
- Bindmiddelen
Lignosulfonaten (1g565) 81 mg
Clinoptiloliet
van sedimentaire oorsprong (1g568) 68.560 mg

Opslag
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

DE: Ergänzungsfuttermittel für Schweine und Geflügel

Gebrauchsanweisung
40 g / Tier/ Tag Die Tagesration darf höchstens 1,5% dieses Futterergänzungsmittels enthalten.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Die Gesamtmenge an Klinoptilolit sedimentären Ursprungs aus allen Quellen darf den Höchstgehalt von 10 000 mg nicht überschreiten.

Zusammensetzung
Dinkelspelzen

Analytischen Bestandteile und Gehalte

Rohprotein	0,0%
Rohfaser	30%
Rohöle	0,0%
Rohasche	18,0%
Lysin	0,0%
Methionin	0,0%
Calcium	0,05%
Natrium	0,0%
Phosphor	0,15%

Zusatzstoffe pro kg:
- Konservierungsmittel
Propionsäure (1k280) 242 mg
Ammoniumpropionat (1k284) 263 mg
- Bindemittel
Ligninsulfonate (1g565) 81 mg
Klinoptilolit sedimentären Ursprungs (1g568) 68.560 mg

Lagerung
Kühl (5 - 25°C), trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

FR: Aliment complémentaire pour porcs et volailles

Mode d'emploi
40 g /animal / jour La ration quotidienne peut contenir au maximum 1,5% de ce supplément aliment complémentaire.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

La quantité totale de clinoptilolite d'origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.

Composition
Coques d'épeautre

Composition analytique

Protéine brute	0,0%
Cellulose brute	30%
Matières grasses brutes	0,0%
Cendres brutes	18,0%
Lysine	0,0%
Méthionine	0,0%
Calcium	0,05%
Sodium	0,0%
Phosphore	0,15%

Additifs par kg:
- Conservateurs
Acide propionique (1k280) 242 mg
Propionate d'ammonium (1k284) 263 mg
- Liants
Lignosulphonates (1g565) 81 mg
Clinoptilolite d'origine sédimentaire (1g568) 68.560 mg

Stockage
Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

ES: Pienso complementario para cerdos y aves de corral

Instrucciones de uso
40 g / animal / día La ración diaria puede estar compuesta como máximo por un 1,5% de este pienso complementario.

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

La cantidad total de clinoptilolita de origen sedimentario procedente de todas las fuentes no excederá del contenido máximo de 10 000 mg.

Composición
Cáscaras de espelta

Componentes analíticos

Proteína bruta	0,0%
Fibra bruta	30%
Grasa bruta	0,0%
Ceniza bruta	18,0%
Lisina	0,0%
Metionina	0,0%
Calcio	0,05%
Sodio	0,0%
Fósforo	0,15%

Aditivos por kg:
- Conservantes
Ácido propiónico (1k280) 242 mg
Propionato de amonio (1k284) 263 mg
- Ligantes
Lignosulfonatos (1g565) 81 mg
Clinoptilolita de origen sedimentario (1g568) 68.560 mg

Almacenamiento
Fresco (5 - 25°C),seco y fuera de la luz directa del sol.

IT: Mangime complementare per suini e pollame

Istruzioni per l'uso
40 g / animale / giorno La razione giornaliera può contenere al massimo l'1,5% di integratore alimentare.

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg.

Composizione
Pule di farro

Componenti analitici

Proteina grezza	0,0%
Cellulosa grezza	30%
Grassi grezzi	0,0%
Ceneri grezze	18,0%
Lisina	0,0%
Metionina	0,0%
Calcio	0,05%
Sodio	0,0%
Fosforo	0,15%

Additivi per kg:
- Conservanti
Acido propionico (1k280) 242 mg
Propionato di ammonio (1k284) 263 mg
- Leganti
Lignosolfati (1g565) 81 mg
Clinoptilolite di origine sedimentaria (1g568) 68.560 mg

Conservazione
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

DA: Tilskudsfoder til svin og fjerkræ

Brugsanvisning
40 g / dyr / dag Den daglige ration må maksimalt indeholde 1,5% af dette fodertilskud.

Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimalt tilladte indhold.

Den samlede mængde clinoptilolit af sedimentær oprindelse fra alle kilder må ikke overstige maksimumsindholdet på 10 000 mg.

Sammensætning
Speltskaller

Analytiske bestanddele

Råprotein	0,0%
Træstof	30%
Råfedt	0,0%
Råaske	18,0%
Lysin	0,0%
Methionin	0,0%
Calcium	0,05%
Natrium	0,0%
Fosfor	0,15%

Tilsætningsstoffer pr kg:
- Konserveringsmidler
Propionsyre (1k280) 242 mg
Ammoniumpropionat (1k284) 263 mg
- Bindemidler
Ligninsulphater (1g565) 81 mg
Clinoptilolit af sedimentær oprindelse (1g568) 68.560 mg

Opbevaring
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Batch number/ numéro de lot/Chargennummer/ número de lote/ numero di lotto/ Batchnummer

Ten minste houdbaar tot/ best before/ Mindestens haltbar bis/ à utiliser de préférence avant/ utilizar preferentemente antes del/ da consumarsi preferibilmente entro/ Skal helst anvendes inden

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Netherlands:
Schippers Bladel BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: 014-672356

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

25 LV 01

MS Schippers
One-stop-shop for livestock farmers

α CH 31914
GMP028601

Download app!
Scan this product

3409835

MS Schippers — MS STRAW BRICKETS 25 kg

3409835

EN: Complementary feed for pigs and poultry
Directions for use
40 g / animal / day The daily ration may not contain more than 1,5% of this feed supplement.
The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.
Total quantity of clinoptilolite of sedimentary origin from all sources shall not exceed the maximum content of 10 000 mg.
Composition
Spelled husks
Analytical constituents
Crude protein 0,0%
Crude fibre 30%
Crude fats 0,0%
Crude ash 18,0%
Lysine 0,0%
Methionine 0,0%
Calcium 0,05%
Sodium 0,0%
Phosphorus 0,15%
Additives per kg:
- Preservatives
Propionic acid (1k280) 242 mg
Ammonium propionate (1k284) 263 mg
- Binders
Lignosulphonates (1g565) 81 mg
Clinoptilolite of sedimentary origin (1g568) 68.560 mg
Storage
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

NL: Aanvullend diervoeder voor varkens en pluimvee
Gebruiksaanwijzing
40 g/ dier/ dag Het dagrantsoen mag voor maximaal 1,5% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.
Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.
De totale hoeveelheid clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong van alle bronnen mag niet meer bedragen dan 10 000 mg.
Samenstelling
Speltschillen
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 0,0%
Ruwe celstof 30%
Ruw vet 0,0%
Ruwe as 18,0%
Lysine 0,0%
Methionine 0,0%
Calcium 0,05%
Natrium 0,0%
Fosfor 0,15%
Toevoegingsmiddelen per kg:
- Conserveermiddelen
Propionzuur (1k280) 242 mg
Ammoniumpropionaat (1k284) 263 mg
- Bindmiddelen
Lignosulfonaten (1g565) 81 mg
Clinoptiloliet
van sedimentaire oorsprong (1g568) 68.560 mg
Opslag
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

DE: Ergänzungsfuttermittel für Schweine und Geflügel
Gebrauchsanweisung
40 g / Tier/ Tag Die Tagesration darf höchstens 1,5% dieses Futterergänzungsmittels enthalten.
Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.
Die Gesamtmenge an Klinoptilolit sedimentären Ursprungs aus allen Quellen darf den Höchstgehalt von 10 000 mg nicht überschreiten.
Zusammensetzung
Dinkelspelzen
Analytischen Bestandteile und Gehalte
Rohprotein 0,0%
Rohfaser 30%
Rohöle 0,0%
Rohasche 18,0%
Lysin 0,0%
Methionin 0,0%
Calcium 0,05%
Natrium 0,0%
Phosphor 0,15%
Zusatzstoffe pro kg:
- Konservierungsmittel
Propionsäure (1k280) 242 mg
Ammoniumpropionat (1k284) 263 mg
- Bindemittel
Ligninsulfonate (1g565) 81 mg
Klinoptilolit sedimentären Ursprungs (1g568) 68.560 mg
Lagerung
Kühl (5 - 25°C), trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

FR: Aliment complémentaire pour porcs et volailles
Mode d'emploi
40 g /animal / jour La ration quotidienne peut contenir au maximum 1,5% de ce supplément aliment complémentaire.
L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.
La quantité totale de clinoptilolite d'origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.
Composition
Coques d'épeautre
Composition analytique
Protéine brute 0,0%
Cellulose brute 30%
Matières grasses brutes 0,0%
Cendres brutes 18,0%
Lysine 0,0%
Méthionine 0,0%
Calcium 0,05%
Sodium 0,0%
Phosphore 0,15%
Additifs par kg:
- Conservateurs
Acide propionique (1k280) 242 mg
Propionate d'ammonium (1k284) 263 mg
- Liants
Lignosulphonates (1g565) 81 mg
Clinoptilolite d'origine sédimentaire (1g568) 68.560 mg
Stockage
Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

ES: Pienso complementario para cerdos y aves de corral
Instrucciones de uso
40 g / animal / día La ración diaria puede estar compuesta como máximo por un 1,5% de este pienso complementario.
El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.
La cantidad total de clinoptilolita de origen sedimentario procedente de todas las fuentes no excederá del contenido máximo de 10 000 mg.
Composición
Cáscaras de espelta
Componentes analíticos
Proteína bruta 0,0%
Fibra bruta 30%
Grasa bruta 0,0%
Ceniza bruta 18,0%
Lisina 0,0%
Metionina 0,0%
Calcio 0,05%
Sodio 0,0%
Fósforo 0,15%
Aditivos por kg:
- Conservantes
Ácido propiónico (1k280) 242 mg
Propionato de amonio (1k284) 263 mg
- Ligantes
Lignosulfonatos (1g565) 81 mg
Clinoptilolita de origen sedimentario (1g568) 68.560 mg
Almacenamiento
Fresco (5 - 25°C),seco y fuera de la luz directa del sol.

IT: Mangime complementare per suini e pollame
Istruzioni per l'uso
40 g / animale / giorno La razione giornaliera può contenere al massimo l'1,5% di integratore alimentare.
L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.
La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg.
Composizione
Pule di farro
Componenti analitici
Proteina grezza 0,0%
Cellulosa grezza 30%
Grassi grezzi 0,0%
Ceneri grezze 18,0%
Lisina 0,0%
Metionina 0,0%
Calcio 0,05%
Sodio 0,0%
Fosforo 0,15%
Additivi per kg:
- Conservanti
Acido propionico (1k280) 242 mg
Propionato di ammonio (1k284) 263 mg
- Leganti
Lignosolfati (1g565) 81 mg
Clinoptilolite di origine sedimentaria (1g568) 68.560 mg
Conservazione
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

DA: Tilskudsfoder til svin og fjerkræ
Brugsanvisning
40 g / dyr / dag Den daglige ration må maksimalt indeholde 1,5% af dette fodertilskud.
Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimalt tilladte indhold.
Den samlede mængde clinoptilolit af sedimentær oprindelse fra alle kilder må ikke overstige maksimumsindholdet på 10 000 mg.
Sammensætning
Speltskaller
Analytiske bestanddele
Råprotein 0,0%
Træstof 30%
Råfedt 0,0%
Råaske 18,0%
Lysin 0,0%
Methionin 0,0%
Calcium 0,05%
Natrium 0,0%
Fosfor 0,15%
Tilsætningsstoffer pr kg:
- Konserveringsmidler
Propionsyre (1k280) 242 mg
Ammoniumpropionat (1k284) 263 mg
- Bindemidler
Ligninsulphater (1g565) 81 mg
Clinoptilolit af sedimentær oprindelse (1g568) 68.560 mg
Opbevaring
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Batch number/ numéro de lot/Chargennummer/ número de lote/ numero di lotto/ Batchnummer

Ten minste houdbaar tot/ best before/ Mindestens haltbar bis/ à utiliser de préférence avant/ utilizar preferentemente antes del/ da consumarsi preferibilmente entro/ Skal helst anvendes inden

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774
All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779
Netherlands:
Schippers Bladel BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771
België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: 014-672356
Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360
France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40
España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128
Italia:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

25 LV 01

MS Schippers
One-stop-shop for livestock farmers

α CH 31914
GMP028601

Download app!
Scan this product

3409835