

Aanvullend diervoeder voor biggen

Samenstelling:

Plant aardige olie (soja), ei producten, gedroogd

Aanwijzing voor correct gebruik:

Alleen voor biggen, ten minste 0.1% en ten hoogste 4.0% van het dagelijks rantsoen. Toedienen op kamertemperatuur.

Complementary feed for piglets

Composition:

Vegetable oil (soy), egg products, dried

Instruction for correct use:

Only for piglets with at least 0.1% and at most 4.0% of the daily ration. Use Pig Pusher at room temperature.

Ernährungsfuttermittel, flüssig, für Ferkel

Zusammensetzung:

Pflanzenöl (Soja), Ei produkte, getrocknet

Anweisung für die ordnungsgemäße

Verwendung:

Nur an Ferkel mit mindestens 0,1% und bis zu 4,0% der Tagesration verfüttern. Pig Pusher verabreichen bei Raumtemperatur.

Aliments complémentaires pour porcelets, liquide

Composition:

Huile végétale (soja), produits d'œuf, séché

Indication pour l'utilisation réglementaire:

A donner seulement à porcelets au moins 0,1% et allant jusqu'à 4.0% pour le ration journalière. Administrer le produit à température ambiante.

Alimentación complementaria para cerdas. 3709810

Composición:

Aceite vegetal (soja), polvos secos a base de yema de huevo

Modo de empleo:

Sólo para lechones con una ración diaria de al menos un 0,1% y un máximo de 4%. Administrar el producto a temperatura ambiente.

Toevoegingsmiddelen per kg:

Vitaminen:

Vitamine A (E 672 Vitamine A) 665.000 IE
Vitamine D (E 671 Vitamin D₃) 66.500 IE
Vitamine E 665 IE

Micro organismes:

Enterococcus faecium
NCIMB 11181 (E 1708) 500 x 10⁹ KVE

Antioxidanten:

propylgallaat, BHT, BHA

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit 8.60% Ruw vet 84.50%
Ruw celstof 0.00% Ruw as 1.55%
Lysine 0.50% Methionine 0.30%

Dosering:

2 pompslagen per big op dag 1, 1 pompslag per big op dag 2 en 3.

Donker bewaren. Goed schudden voor gebruik!

Eens geopend, zo snel mogelijk opgebruiken!

Additives per kg:

Vitamins:

Vitamin A from E 672 Vitamin A 665.000 IU
Vitamin D from E 671 Vitamin D₃ 66.500 IU
Vitamin E 665 IU

Micro organisms:

Enterococcus faecium
NCIMB 11181 (E 1708) 500 x 10⁹ CFU

Antioxidant:

propyl gallat, BHT, BHA

Analytical components:

Crude protein 8.60% Crude fat 84.50%
Crude fibre 0.00% Crude ash 1.55%
Lysine 0.50% Methionine 0.30%

Dosage:

2 pumps per piglet on day 1, 1 pump per piglet on day 2 and day 3.

Keep out of light. Shake well before using!

Once opened consume as soon as possible!

Zusatzstoffe je kg:

Vitaminen:

Vitamin A aus E 672 Vitamin A 665.000 IE
Vitamin D aus E 671 Vitamin D₃ 66.500 IE
Vitamin E 665 IE

Mikroorganismen:

Enterococcus faecium
NCIMB 11181 (E 1708) 500 x 10⁹ KBE

Antioxidationsmittel:

Propylgallat BHT, BHA

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 8.60% Rohfett 84.50%
Rohasche 1.55% Rohfaser 0.00%
Lysin 0.50% Methionin 0.30%

Fütterungsempfehlung:

2 Hube pro Ferkel am 1. Lebenstag, 1 Hub pro Ferkel am 2. und 3. Lebenstag.

Lichtgeschützt lagern. Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Nach Anbruch schnellstmöglich aufbrauchen!

α DE HB 100001

Additifs par kg:

Alimentaires physiologiques:

Vitamin A de E 672 Vitamin A 665.000 UI
Vitamin D de E 671 Vitamin D₃ 66.500 UI
Vitamin E 665 UI

Micro-organisme:

Enterococcus faecium
NCIMB 11181 (E 1708) 500 x 10⁹ UFC

Ressource d'anti oxydation:

propyl gallat, BHT, BHA

Constituants analytique:

Protéin brute 8.60% Graisse brute 84.50%
Fibre brute 0.00% Cendre brute 1.55%
Lysine 0.50% Méthionine 0.30%

Dosage:

2 pompages par porcelets une journée le première jour de vivre, 1 pompage par porcelet sur le deuxième et troisième jour.

Tenir à l'abri de la lumière! Bien agiter avant l'emploi!

Une fois ouverte, utiliser entièrement le plus rapidement possible!

Aditivos por kg:

Vitaminas:

Vitamin A from E 672 Vitamin A 665.000 UI
Vitamin D from E 671 Vitamin D₃ 66.500 UI
Vitamin E 665 UI

Microorganismos:

NCIMB 11181 (E 1708) 500 x 10⁹ CFU

Antioxidantes: Galato de propilo, BHT, BHA

Componentes analíticos:

Proteína bruta 8,6% Fibra cruda 0,00%
Materia grasa bruta 84,50% Lisina 0,50%
Cenizas brutas 1,55% Metionina 0,30%

Modo de empleo:

Sólo para lechones con una ración diaria de al menos un 0,1% y un máximo de 4%. Administrar el producto a temperatura ambiente.

Dosis:

2 dosis por lechón el primer día; 1 dosis por lechón el segundo y tercer día.

Mantener fuera de la luz. Agitar bien antes de usar!

Una vez abierto, consumir lo antes posible.

Made in Germany

23 LV 03

