



Boarmate™ est un aérosol contenant une odeur synthétique appelée "odeur de verrat" (5 α -androst-16-en-3-one).

Ce composant a une odeur identique à celle produite par les glandes sous-maxillaires des verrats. Cette odeur fait réagir les truies en les faisant « cambrer » lorsqu'elles sont prêtes pour l'accouplement.

Boarmate™ a été développé pour aider les éleveurs à identifier plus facilement les truies et cochettes prêtes pour l'insémination.

Boarmate™ est utilisé pour stimuler les truies et cochettes à montrer leur réflexe de « cambrer » qui indique qu'elles sont prêtes à recevoir le verrat. Cela correspond à la période optimale pour la conception.

Utilisé selon les instructions ci-dessous, Boarmate™ permet d'éliminer efficacement les problèmes de détection de chaleurs chez les truies et cochettes en l'absence de verrat. L'efficacité de l'insemination artificielle (IA) sera améliorée.

Bénéfices de Boarmate™

- Augmentation du taux de réussite des IA, particulièrement dans les petits troupeaux
- Réduction de la période allant du sevrage à la reproduction
- Réduction du nombre de jours avant le premier accouplement
- Augmentation de la portée
- Identification facilitée des truies sans cycles et des "chaleurs silencieuses"

- Suppression du besoin de verrat
- Augmentation de la production annuelle des truies

Rentabilité de Boarmate™

Boarmate™ est très rentable. Si une seule application sur 100 permet d'éviter de passer à côté de chaleurs, alors Boarmate™ est déjà rentabilisé.

N.B. une seule chaleur manquée coûte au minimum 21 jours de nourriture et de perte de production.

Applications de Boarmate™

Vaporiser Boarmate™ sur le groin de la cochette ou de la truie pendant 2 secondes à une distance d'environ 60 centimètres. Puis appliquer à l'arrière de la truie. Si la truie répond au test, procéder à l'insémination. Une bombe de Boarmate™ suffit pour 40 (80 ml) ou 125 (250 ml) applications.

Pour maximiser le taux de conception, l'éleveur utilisant l'insémination artificielle devra vérifier les signes de chaleur (oestrus) suivants : 1. la vulve devient rose et gonflée 2. après 24 ou 48h, la vulve s'élargit et du mucus apparaît 3. dans les 24 ou 48h suivants ces signes diminuent. C'est pendant cette période que l'accouplement doit avoir lieu et que la truie aura son réflexe de « cambrer ». Les cochettes ont leurs premières chaleurs (oestrus) au 7ème mois. L'éleveur décidera quand l'inséminer pour la première fois. Les chaleurs interviennent habituellement 4-6 jours après le sevrage.



Autres utilisations de Boarmate™

Utilisé par des éleveurs confirmés, Boarmate™ a montré d'autres avantages :

- Signes accentués des chaleurs chez les truies
- Stimulation des chaleurs
- Stimulation des élevages de reproduction inexpérimentés
- Identification individuelle des chaleurs dans des groupes de truies

L'utilisation et l'agrément de Boarmate™ peuvent varier selon les pays.

Réf.	Contenu	pour	
2290	80 ml	DE, EN	1/12
22139	250 ml	DE, FR, EN, IT	1/12
22156	250 ml	ES, NL, DA, PL	1/12
22157	80 ml	FR, ES	1/12
22158	80 ml	DA, PL	1/12

Votre distributeur :